

IV 永 年 作 物

凡 例

受	粉	♀	
摘	蕾(花)	⊗	
摘	果	⊗	
袋	掛	□	
誘	引	└	
芽	かき	×	
摘	心	×	
せん	定	♂	
防	寒	◐	
中	耕	△△△	
深	耕	▽▽▽	
除	草(草狩)	△	
棚	しばり	#	
整	枝	ꝝ	
収	穫	[]	
ハウス	(終)	▲	(▲)
マルチ	(終)	❖	(❖)
施	肥	●	
定	植	◎	

1 茶

チャの特性と環境保全型施肥技術

(1) 施肥に対する考え方

亜熱帯原産の常緑永年性植物である茶樹の生育は、気温の影響を受けやすく、4月から10月の期間において、摘採に伴い年4回程度新芽が生育する。このため茶樹の養分吸収は生育周期に対応した吸収特性を示す。

茶樹は摘採により新芽を収穫して茶園から持ち出すため、新芽に移行した養分は摘採によって奪われる。新芽中には窒素等の主要な養分が多く含まれるので、新芽の収穫によりほ場の外に持ち出される肥料成分の量が多い。このため、窒素を中心とした施肥成分の補給は、茶樹の健全な生育を維持し、良質な新芽を生産するために重要である。

茶樹の施肥は、環境への負荷を考慮し、新芽の摘採により茶樹から奪われる養分を樹体に戻すことを基本としている。基準となる施肥量は摘採（収穫）量と良質な生葉中の肥料成分含有率から肥料成分量を求め、吸収利用率を考慮して算出している。また、環境負荷を考慮して土壤改良を目的とした有機物施用や品質向上を目的とした葉面散布等によってほ場に投入される肥料成分についても施肥量に換算する必要がある。生葉の年間摘採量については、窒素の年間吸収量、茶樹や土壤の持つ生産能力と良質生葉の安定生産を考慮して1,800 kg/10aとしている。

茶園に肥料を施用する場合、肥料の種類や施肥時期、土壤の種類や物理性、化学性等によって、肥料の分解や溶出、土壤中での施肥成分の吸着や移動が異なる。また、土づくりによる地力の違いも想定される。このため、茶樹の施肥管理は、茶樹の生育状況、養分吸収特性、施用する肥料や茶園土壤の特性を十分把握して行うことが大切である。

生産を損なうことなく環境への負荷を考慮した施肥管理を行うためには、定期的な土壤診断を行い、養分含有量をはじめとする土壤の理化学性の変化を監視し、健全な養分吸収・生育に必要な土壤の物理性、化学性、生物性を維持することが必要である。




図1 茶園への窒素投入量の違いが茶樹の吸収量及び茶園圏外への排出量に及ぼす影響
(渡部ら (2002) 及び静岡茶試 (1980) ライシメーター試験結果より作図)

茶樹が1年間に吸収する施肥由来の窒素量は10a当たり概ね20kg程度であり、窒素施肥量を増やしても茶樹の窒素吸収量はあまり増加しない。また、茶園から溶脱した施肥窒素由来の硝酸性窒素の濃度が環境基準（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素濃度が10mg/L以下）を超過しないために、窒素施肥量は40kg/10a以下まで低減する必要がある（図1）。

施肥管理技術の改善により窒素肥料の吸収利用率を50%まで高めることができれば、窒素施肥量を40kg/10aに削減しても茶樹が吸収する窒素量は20kgを維持でき、これまでの収量と品質を維持することが可能である。ここで示す環境基準に対応した施肥量は、肥効調節型肥料の活用や吸収時期に合わせた適正な肥培管理により良質茶の安定生産が可能な施肥量と考えられる。

なお、静岡県茶園施肥適正化推進会議（平成18年～21年度）では、4年間にわたって、県内24カ所の地域で茶園施肥低減実証展示場を設定し、茶園の適正な施肥量について検討した。その結果に基づき、「平成22年度以降、チャの施肥基準における年間窒素施肥量は40kg/10aとする。ただし、地域ごとに土壤条件、気象条件及び栽培体系が異なるため、窒素施肥量低減により茶品質が低下する地域では、環境基準に配慮した上で、年間窒素施肥量54kg/10aを上限とする（2010年3月31日通知）」とした。

（2）養分吸収の特徴

ア 養分吸収量

摘採生葉中の成分含有率を表1に示す。施肥量は摘採生葉中の成分含有率、

表1 生葉中の成分含有率

成分名	含有率(生葉現物%)
窒素 (N)	0.75～1.50
リン酸 (P_2O_5)	0.10～0.25
カリ (K_2O)	0.25～0.75
石灰 (CaO)	0.05～0.20
苦土 (MgO)	0.05～0.13

収量から収奪成分量を算出し、肥料利用効率から施肥量を算出する。

(ア) 窒素：新芽中の窒素含有率は生育の程度によって異なり、一般に若い芽ほど高く、生育が進むにつれて低下する。また、茶期によって異なり一番茶の新芽の窒素含有率は生葉中の1.2~1.4%を占めるが、二番茶や三番茶では1%程度と低くなり、一般に生葉中の窒素含有率は0.75~1.5%程度である。生葉100kg当たりの窒素量は0.75~1.50kgであるため、吸収利用率を40%とすると窒素施用量は生葉100kg当たり1.88~3.75kgとなる。年間の施肥窒素から樹体が吸収する窒素量は、施用窒素量が増加してもあまり増加せず概ね10a当たり20kg程度である。吸収利用率は土壌の種類や地形及び気象条件に左右されるが、窒素施用量が10a当たり54kgの場合では約40%である。

(イ) リン酸：生葉中のリン酸含有率は0.10~0.25%程度で窒素含有率の約6分の1である。リン酸は窒素やカリと異なり土壌中を移動することはほとんどなく、また茶樹の吸収利用率は20~30%程度で窒素やカリに比べて低い。生葉100kg当たりのリン酸量は0.10~0.25kgであるため、吸収利用率を20%とすると、リン酸施用量は生葉100kg当たり0.50~1.25kgとなる。このため、リン酸施用量はおおよそ窒素施用量の3分の1とすると良い。

(ウ) カリ：生葉中のカリ含有率は0.25~0.75%程度で窒素含有率の約2分の1であり、吸収利用率は窒素と同程度である。生葉100kg当たりのカリ量は0.25~0.75kgであるため、吸収利用率を40%とするとカリ施用量は生葉100kg当たり0.63~1.88kgとなる。このため、カリ施用量はおおよそ窒素の2分の1とすると良い。

茶葉中の成分含有量や茶樹の現状の吸収利用率から、生葉100kgを生産するのに必要な施肥量は、窒素:3.0kg、リン酸:1.0kg、カリ:1.5kgとなり、年間10a当たり生葉1,800kgを目標生産量とする普通成木園における必要な施肥肥料成分は窒素で54kg、リン酸で18kg、カリで27kgである。

イ 養分吸収パターン

肥料成分を効率良く茶樹に吸収させるためには、茶樹の養分吸収の時期と割合を把握し、養分吸収状況に合わせて分施することが必要である。図2に茶樹の時期別肥料成分吸収割合を示す。

窒素の吸収は3月~11月まで行われるが、4月~9月にかけての生育の盛んな時期に吸収が多く、吸収




図2 茶樹の時期別肥料成分吸収割合

された窒素は春夏期には主に葉に集中し、10～2月には幹や根に蓄積される。リン酸の吸収は4～6月と9月の時期に多く、夏は極めて少ない。吸収されたリン酸は7～8月には根に集中する。カリの吸収も窒素と同様に生育の盛んな時期に多いが、窒素と比較して9月にやや多いのが特徴である。吸収されたカリは4～8月には葉に、10～11月には根に蓄積される。

(3) 施肥方法

ア 施肥窒素の吸収

一番茶芽の生育に利用されている窒素の割合をみると、一般に当年の春肥と芽出し肥から合わせて20%程度、前年の夏肥と秋肥からも合わせて20%程度、そして残りの60%が前年春肥以前に施用された窒素に由来している。また、茶樹に吸収された施用窒素の行方は、新葉や古葉などの部位により異なる。例えば、一番茶摘採後に10a当たり窒素換算で10.8kgの硫安を施した場合では、この施用窒素は施肥8日後には一番茶摘採後の残葉に2.7%、古葉に0.5%の割合で含まれる。さらに、施肥47日後の二番茶では13%の割合で含まれ、施肥してから1年後の翌年の一番茶にも6%含まれる。

イ 施肥のポイント

深根性で永年性作物である茶樹では、吸収できる時期に施した肥料成分は直ちに吸収され次に摘採する新芽に取り込まれるだけではなく、成葉に蓄積されて以後の摘採葉に移行したり、土壤に残存して徐々に吸収されたりすることが判っている。このことに留意し、茶樹が施肥成分を吸収できる時期に効率的に施肥を行うことが必要である。また、永年性作物である茶樹は、新芽の生育に対する樹体内養分の寄与率が高いことから、年間を通して吸収を高めることができる施肥方法が有効である。

施用された窒素肥料は、緩効性肥料や分解の遅い有機質肥料等でない限り容易に土壤中で分解される。分解された窒素のうち茶樹に吸収されなかつた窒素は降雨等により溶脱する。これに対し、リン酸、カリは土壤中でかなりの期間保持される。特にリン酸は土壤中で不溶性となるため溶脱することは少ない。

肥効発現の早い肥料を用いる場合、土壤中の肥料成分の変化と茶樹の養分吸収特性を考慮して窒素は年4～5回に分けて施し、リン酸、カリは春秋の2回に分けて施すのが一般的である。施肥時期と分施割合を表2に示した。肥効発現の早い有機質肥料や化成肥料などはこの施肥時期、施肥割合で使用することが望ましい。また、肥料の分解や溶出パターンがわかっている有機質肥料や肥効調節型肥料を用いる場合は、地温や土壤条件などから求めた肥効発現予測に基づいて施肥時期や施肥量を決定する。速効性肥料と肥効調節型肥料、肥効発現の時期が異なる複数の肥効調節型肥料を組み合わせることによって施肥回数を削減し効率的に施肥することができる。なお、有機質肥料を用いる場合、web上で公開されている「有機質資材の肥効見える化アプリ」を活用することで簡便に窒素肥効の発現を予測できる。

表2 時期別の分施割合（肥効発現の早い有機質肥料や化成肥料）

分施時期 施肥成分	秋 肥 9月上旬	春 肥 3月上旬	夏肥1 一番茶後	夏肥2 二番茶後	計
窒 素	30%	30%	20%	20%	100%
リ ン 酸	50%	50%	—	—	100%
カ リ	50%	50%	—	—	100%

(4) 環境保全型施肥技術

茶園から溶脱した施肥成分による環境負荷量の増加が指摘され、茶園施肥に伴う環境への負荷を最小限にした効率的な肥培管理技術が強く求められている。そこで品質・収量を保ちながら環境負荷に配慮した取り組みを積極的に進めていく必要がある。チャの品質は生葉中の窒素成分と密接に関係するため窒素吸収利用率を向上させることが重要である。肥料成分の吸収利用率を向上させる方法として、以下の取り組みが必要である。

①土壤改良による土壤の適正化（第2部Ⅲ土壤の改良方法を参照のこと）

②土壤診断に基づく適切な肥培管理技術の活用

土壤診断に基づく適切な肥培管理技術として、土壤埋設型ECセンサーで測定された土壤窒素濃度を基に、施肥時期、肥料の種類及び施肥量から推定する土壤窒素濃度を勘案し、適正な肥培管理を行う。この方法は各種肥料の肥効発現のシミュレーションが可能であるため施肥設計に活用できる。

③肥効調節型肥料（被覆肥料、化学合成緩効性肥料、硝化抑制剤入り肥料等）の有効活用

肥効調節型肥料は、肥料成分が徐々に溶出するため、肥料成分による根の濃度障害を回避でき、また、チャの窒素吸収特性に見合った溶出特性を示す各種タイプの肥効調節型肥料を使用することにより利用率が向上する。硝化抑制剤を用いることでアンモニア態窒素の硝酸化成が抑制され、茶樹による窒素の吸収利用率の向上が期待できる。

石灰窒素も硝化抑制効果を有するため、窒素肥効が持続することが報告されており、施肥削減や収量の増加が期待される。加えて、石灰窒素の活用により酸度矯正資材の施用を省略できることから、施肥労力の軽減に対しても有効である。また、年間窒素施用量の24%以上を石灰窒素由来の窒素で置き換えることで、J-クレジットの方法論「茶園土壤への硝化抑制剤入り化学肥料又は石灰窒素を含む複合肥料の施肥」に基づくJ-クレジットの取引が可能となることや、農産物の環境負荷低減に関する評価・表示の対象でもあることから、石灰窒素を活用することで、環境負荷の低減に寄与するとともに、茶業経営に資する取組を併せて実施することも可能である。

④施肥位置（幅広、樹冠下、深層、局所）、肥料形態（液肥等）を考慮した新しい施肥技術の活用

施肥位置として幅広施肥、樹冠下施肥、深層施肥、局所施肥等がある。また、肥料形態を考慮した施肥技術として液肥施肥、ペースト施肥などがある。樹冠下への施肥は、樹冠下の吸収根を利用することにより吸収利用率が向上する。

樹冠下土壤の水分環境は複雑であるが、樹冠下かん水同時施肥法は、液肥等を利用して確実に土壤及び吸収根へ肥料成分と水分を供給することができ、効率的な施肥方法として期待されている。現在、実用化にむけての試験研究が行われている（平成 25 年度版静岡県成果情報より）。

また、肥効調節型の被覆肥料を雨落ち部分に円筒状に埋設する局所施肥は、肥料成分を直接、茶の根に吸収させる施肥方法であり、専用の施肥機を利用することにより、効率的な施肥が可能である。

⑤堆肥の活用について

牛ふん堆肥中のリンとカリウムの茶園土壤における肥効は、化成肥料と同程度であるため、リン酸カリウムの供給を牛ふん堆肥で代替することが可能である。また、石灰の含有量も多いことから、石灰供給と酸度矯正にも寄与する。ただし、牛ふん堆肥による 3 年間の肥料代替試験の結果、年間窒素施用量の全量を牛ふん堆肥に代替すると、堆肥施用量は 6.7 t /ha となり、土壤 pH が改善基準以上に高まり、茶の収量も低下した。このため、茶園における牛ふん堆肥の施用量の目安として、2 t /ha までが適切であると考えられる。なお、リン及びカリウムの含有量 1 kg 当たりの価格は、化成肥料に比べて牛ふん堆肥の方が安価であるため、肥料費削減の観点からも重要である。（平成 24 年度版静岡県成果情報より）。

⑥「静岡の茶草場」農法について

「静岡の茶草場」農法は、茶生産と生物多様性を両立させる農法として、国連食糧農業機関（FAO）の世界農業遺産認定を受けた。そこで、現地の茶草の肥料成分を調べたところ、全窒素は 0.76%、全リン酸は 0.25%、全カリは 1.35%、C/N 比は 62 であった。茶草は稻わらと同等の有機物特性を持つと推察され、稻わら施用試験等の過去の試験データが、茶草施用効果の参考となる。

また、茶草施用現地ほ場の土壤物理性を調査した結果、土壤の孔隙率の増加や透水性の改善など、土壤物理性の改善効果が確認できた（平成 25 年度版静岡県成果情報より）。

⑦局所施肥を活用した生産性の高い管理技術

局所施肥法は、樹冠下雨落ち部の土壤中に専用の施肥機を用いて被覆肥料を埋め込む施肥方法である。専用の施肥機は、雨落ち部へ深さ 25cm の穴を 2 か所同時に掘り、粒状の被覆肥料を穴に直接施用する。施肥位置へ根を集中的に誘導することにより、窒素吸収率の向上が図られ、窒素施肥 40kg N/10a の場合、慣行の施肥方法に比べて生産性が高まる（年間収量 20% 増）。また、本施肥法（40kg N/10a）は、地下浸透水の窒素濃度が年間を通して環境基準を超える可能性は少なく、環境負荷が少ないため、持続可能な茶生産が可能である（平成 26 年度版静岡県成果情報より）。

(1) チヤ(育苗)

1. 対象地域 県下主要茶産地
2. 土 壤 沖積土壌(灰色低地土)、洪積土壌(赤色土、黄色土)、黒ボク土、褐色森林土
3. 栽植本数 10,000 本／10 a
(育苗床：うね幅 180cm、育苗床幅 120cm、挿し穂間 5×5cm)
4. 栽培型と主な作業
(普通挿し：夏挿し)
挿木時期：挿木時期は、品種によっても多少異なるが、一番茶芽の伸長が停止し、枝条の下半分が黄褐色に変わる 6 月上・中旬頃が適期である。
5. 施肥基準 (kg/a)

施肥時期		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	対応
1年目	挿し木前	0.4	0.2	0.2	菜種油粕または鶏ふん(挿し木前)。
	8月上旬	0.8	0.4	0.5	有機質肥料、肥効調節型肥料、緩効性肥料などを主体に行う。
	9月上旬	0.8	0.6	1.0	
	計	2.0	1.2	1.7	速効性肥料を用いる場合は分施回数を多くする。
2年目	3月上旬	0.8	1.2	0.8	有機質肥料、肥効調節型肥料、緩効性肥料などを主体に行う
	6月上旬	0.8		0.8	
	7月中旬	0.8		0.8	
	9月上旬	0.8	1.4	0.8	
	計	3.2	2.6	3.2	

6. 施用上の留意事項

- (1) 育苗床は、土壤消毒した保水性と通気性が良好なほ場を利用する。土壤は、1.5cm のふるいで小石や土の固まりを取り除き均一にする。挿し木後の発根を良好するため、菜種油粕または鶏ふんを挿し木前の3月に施し、土壤とよく混和して肥沃化しておく。
- (2) 施肥は有機質肥料、肥効調節型肥料、緩効性肥料などを主体に行い、速効性肥料を用いる場合は分施回数を多くする。
- (3) 挿し木後の発根は、20~30 日後から始まり、1.5 ヶ月後になるとほぼ一次根が出揃う。施肥は 2~3 次根が形成される 8 月上~中旬から行う。
- (4) 挿し木 1 年目には、かん水を兼ねて液肥を 7~10 日おきに施すのもよい。
- (5) ビニール被覆挿し(秋挿し)の場合、施肥は挿し木 2 年目の 3 月から普通挿しに準じて行う。
- (6) ポット育苗の場合も、基本的な技術は、普通挿しあるいはビニール挿しと同様である。ポットに詰める土は通気性・保水性のよい肥沃な土壤が好ましい。ポット内の土を軽量化するためには、もみがらん炭やピートモスなどを混合して使用すると良い。挿し木後の施肥は、各ポットに均一になるように注意して施す。

(2) チヤ(定植年)

1. 対象地域

県下主要茶産地

2. 土 壤

沖積土壌(灰色低地土)、洪積土壌(赤色土、黄色土)、黒ボク土、褐色森林土

3. 栽植本数

1,850 本/10a (单条植え: うね幅 180cm、株間 30cm)

(千鳥植え: うね幅 180cm、株間 60cm、条間 50cm)

4. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	
	▽▽▽	◎	△△△	△△△	△△△	△△△	▽▽▽	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	茶
主要作業名	整地	植え 鶏ふん 溝掘り 堆きゆう肥	定植	施肥I (下旬以降)		施肥II	施肥III	深耕	秋肥 (上旬以前)				防寒・防風

5. 施肥基準 (kg/10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	対応
定植前 (2月～3月)	10.0	14.0	7.0	堆肥、鶏ふん、重焼リンの肥料成分を含む
定植後				
施肥I (4月)	2.0	1.0	1.0	各種資材の肥効発現を考慮して有効に活用する
施肥II (6月)	2.0	1.0	1.0	
施肥III (7月)	2.0	1.0	1.0	
秋肥 (8～9月)	4.0	3.0	4.0	
計	20.0	20.0	14.0	

6. 施用上の留意事項

(1) 定植前 (2月～3月)

定植1ヶ月前までに、单条植えでは深さ 30cm、幅 30～40cm、複条植えでは深さ 30cm、条間に 10～30cm 足した幅の植え溝を掘り、堆肥 (3～5t/10a) と、鶏ふん (500～600kg/10a) または重焼リン (100kg/10a) を施用して土と混合する。

(2) 定植後

ア 定植直後の幼木は、根が浅く肥料障害を受けやすいため、窒素成分量が少ない配合肥料、肥効が長い肥効調節型肥料や緩効性肥料を用いる。

イ 施肥位置は、株元から 20cm 程度離れた位置とする。

ウ 干ばつ時はかん水を行う。かん水と兼ねた液肥の施用も有効である。

エ 雑草抑制及び乾燥防止のため、マルチが有効である。伐採した樹木をチップ化し、1年以上野積みしたものをマルチとして 30m³/10a 程度うね間に施用しても、同様の効果が期待できる。

(3) チャ（定植後2～5年の幼木園）

1. 対象地域 県下主要茶産地
2. 土 壤 沖積土壌(灰色低地土)、洪積土壌(赤色土、黄色土)、黒ボク土、褐色森林土
3. 栽植本数 1,850本／10a (单条植え：うね幅180cm、株間30cm)
(千鳥植え：うね幅180cm、株間60cm、条間50cm)

4. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	△△△	△△△	□ △△△	□ △△△	▽▽▽	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	
主要作業名		● ●	●		●		●		●				
		春肥	芽出し肥	摘採夏肥I	摘採夏肥II	苦土石灰	深耕	秋肥	整枝			防風・防寒	

5. 施肥基準 (kg／10a)

定植2年目以降の施肥量は、成木園を基準（次ページ参照）として下表のような年次別の施肥割合で行う。

年次肥料 項目	2年目	3年目	4年目	5年目
成木園に対する割合	50%	70%	90%	100%

6. 施用上の留意事項

- (1) 雨の多い山間傾斜地など肥料成分が溶脱しやすい地域では、肥効調節型肥料を用いたり、分施回数を多くして施肥効率を高めるとともに、肥料による濃度障害を回避する。
- (2) 植付け3年目以降は根がうね間全域に分布するので、肥料はうね間全域に施用し、施肥後は肥効を促すため耕起を行い土壤とよく混和する。
- (3) 幼木園では、最終施肥時期が遅れないように注意する。特に裂傷型凍害が発生しやすい地域では、最終施肥を9月上旬頃までに行う。

(4) チヤ(成木園)

1. 対象地域 県下主要茶産地
2. 土 壤 沖積土壌(灰色低地土)、洪積土壌(赤色土、黄色土)、黒ボク土、褐色森林土
3. 栽植本数 1,850 本／10 a (单条植え：うね幅 180cm、株間 30cm)
(千鳥植え：うね幅 180cm、株間 60cm、条間 50cm)
4. 目標収量 1,800kg／10 a

5. 栽培型と主な作業

栽培型 月 間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	△△△	△△△	□	△△△	□	△△△□	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△
主要作業名	●	●	●		●		●		●				防風・防寒
	春肥	芽出し肥	摘採夏肥I		摘採夏肥II	摘採	苦土石灰	深耕	秋肥	整枝			

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	対応
春 肥	8.0(～10.0)	7.0(～9.0)	10.0(～13.0)	肥効調節型肥料を有効に活用する
芽出し肥	4.0(～ 6.0)			*括弧内の数値は上限とする
夏 肥 I	8.0(～11.0)			
夏 肥 II	8.0(～11.0)			
秋 肥	12.0(～16.0)	7.0(～9.0)	10.0(～14.0)	
計	40.0(～54.0*)	14.0(～18.0)	20.0(～27.0)	

7. 施用上の留意事項

- (1) チヤの施肥基準における年間窒素施肥量は 40kg/10a とする。ただし、地域ごとに土壤条件、気象条件及び栽培体系が異なるため、窒素施肥量低減により茶品質が低下する地域では、環境基準に配慮した上で、年間窒素施肥量 54kg/10a を上限とする(平成 22 年 3 月 31 日付 農茶第 236 号)。
- (2) 土壤診断結果に基づき、窒素、リン、カリの施肥量を削減するなど、合理的な施肥に努める。
- (3) 幅広施肥、施肥後の中耕、pH調整、乾燥時のかん水などの基本技術を徹底することにより、吸収力の高い細根を施肥部位に十分確保し、施肥効率の向上を図る。また、表層(0～20cm)だけでなく、下層土の物理性(ち密度)や根の分布状況を定期的に診断し、堆肥の投入や深耕などにより有効土層の拡大を図る。
- (4) 堆肥は物理性の改善だけでなく、リン、カリの供給源として利用できる。また、連年施用することにより、地力の向上が図られる。
- (5) 地域ごとに土壤条件、気象条件及び栽培体系が異なるため、肥料成分の溶出シミュレーションなどを基に、地域に合った肥料の種類、肥料の分施方法などを検討し、施肥設計を立てる。また、栽培期間中には、ECセンサー等測定機器を活用して、施肥部位のECや窒素量を定期的にチェックし、肥料の種類や施肥時期を調整する。

2 果樹

果樹の特性と環境保全型施肥技術

(1) 施肥に対する考え方

施肥設計にあたっては、土壤や樹種、品種による違いに応じて、施肥量と施肥時期を決める。永年作物であることから、樹齢に応じた果実生産やせん定・落葉による損耗、樹体の肥大を考慮する。また、施肥成分が環境に及ぼす影響が懸念されることから、果実の収量や品質だけでなく、環境に対する負荷にも留意することが必要である。

ア 土壤

県内の果樹園土壤は種類や土層の深さが幅広いことから、肥沃度は大きく異なっている。ウンシュウミカンの産地をみると、西部地域に分布する古生層土壤は比較的痩せた土壤であるのに対し、東部地域の黒ボク土壤は腐植質に富む肥沃な土壤である。中部の第三紀土壤も比較的肥沃であり、中・西部に分布する洪積土壤は中程度の肥沃度である。

カキの産地をみると、西部地域の洪積（鉱質）土壤と東部地域の黒ボク（腐植質）土壤では肥沃度は大きく異なる。このため、施肥量は肥沃度の高い土壤では、低い土壤よりも少なくする。また、砂質土壤のように肥料が溶脱しやすい園地では、分施するなどにより、肥効を高める工夫が必要である。

イ 樹種

本県に栽培される樹種は多いが、栽培面積の約7割と最も多いのがウンシュウミカンである。施肥量はウンシュウミカンを基準とすると、甘ナツ等中晩柑類が多く、モモ等核果類が少ない。また、開花から収穫までの期間が著しく異なることや、養分の過剰や欠乏が果実の収量や品質に影響することから、樹種ごとに施肥時期を設定することが必要である。

ウ 品種

品種によっても生育期間や成熟時期が異なることから、施肥時期も異なる。また、早生品種は果実の生育期間が短いことと果実を早く成熟させたいため、晩生品種よりも窒素施肥量は少ない。

エ 樹齢

幼木、若木、成木、老木で1樹当たりの養分吸収力は異なり、若木では果実以外の枝葉の伸長や幹の肥大に用いられる割合が高く、成木では果実の割合が高い（表1）。

表1 ウンシュウミカンの樹齢別吸収養分量の推定（1樹当たり）

成分	肥大(g)		落葉(g)			果実(g)			推定吸収養分量(g)		
	4~10年	10~50年	4年	10年	50年	4年	10年	50年	幼木4年	若木10年	老木50年
窒素	44	35	8	23	69	11	27	102	63	90	206
リン酸	6.3	5.3	0.6	1.9	4.6	2.8	6.4	24	9.7	14.1	33.9
カリ	22	15	5	13	31	14	32	120	41	64	166
石灰	15	80	6.4	21	54	6.3	14	54	27.7	83	188
苦土	10	6.6	0.6	2.1	5.4	1.4	3.2	12	12	13.6	24.0

(中間, 1967)

(2) 養分吸収の特徴

ア 地温の影響

根の養分吸収は地温の影響を大きく受ける。地温が低い場合は、ほとんど吸収しないが、地温の上昇に伴い吸収は増加する。ウンシュウミカンの場合では、養分の吸収を始める地温は10°C前後で、15°C以上になると吸収が旺盛になるとされている。

イ 転流

吸収された窒素は果実や枝葉の生育が旺盛な部位に最も多く移行し、生育停止期には幹等に移行し、貯蔵窒素として蓄積される。

ウ 貯蔵養分

果樹は永年性作物であることから一年生の作物と異なり、貯蔵養分の役割が大きい。春の発芽期から生育初期は貯蔵窒素が主に使われるが、その後は当年に吸収した窒素の役割が大きくなる。秋以降に吸収した窒素は貯蔵窒素として蓄積される割合が高く、翌春の生育に使われる。

エ 葉中窒素と果実収量・品質

窒素の吸収状況は、葉の窒素状態で判断することができる。ウンシュウミカンの葉中窒素と果実の収量や品質との関連をまとめると、品種による違いはあると考えられるが、概ね図1のとおりであり、一般的に、2.9~3.4%が適量範囲である。




図1 葉中窒素濃度と果実収量・品質（果樹の栄養生理、石原を一部改変）

(3) 環境保全型施肥管理技術

施肥された肥料がすべて樹体に吸収されるわけではない。ウンシュウミカンの場合、施肥した窒素の吸収率はほぼ50%と考えられる。残存窒素は一部が土壤に保持される以外は、硝酸態窒素として雨水とともに地下に浸透するか、地表面を流れて園外に流去する。この時、施肥量が多くなるほど樹体の吸収率が低下し、地下浸透の割合が増加する。

また、階段畠の山なり園化による基盤整備や、改植などによる園内道の設置により、裸地面積が拡大することから、表土流亡とともに肥料成分が流亡することによる周辺環境への影響も懸念されている。環境への負荷を軽減する技術として、草生栽培と有機物マルチ栽培等がある。

ア 草生栽培

草生栽培は園内的一部または全面に草を生育させて園地の表面を被覆する土壤管理の方法である。土壤浸食の防止や過剰な養分吸収の防止に効果がある。ミカン園では、土壤流亡を防止するための土留め植物として、リュウノヒゲが多く用いられている。雑草草生は種等が不要で簡便であるが、つる性や草丈の高い雑草の混入もあることから、果樹の生育を阻害する等管理しにくい。このため、秋から翌初夏にかけて生育するナギナタガヤやクローバーが、園地全面を被覆する草種として挙げられる。

草生栽培は、果樹との養水分の競合や、草丈の高いものでは遮光等による幼木の生育阻害の恐れもあるため、樹冠下は清耕とするなど、園地の状況に応じた工夫が必要である。

イ 有機物マルチ栽培

有機物で園地の表面を被覆する土壤管理法である。刈り草や樹木チップを有機物マルチの材料として用いれば、土壤流亡を軽減するだけでなく、腐植の供給源ともなることから土壤の物理性の改善にも効果がある。ただし、未熟有機物である樹木チップはモモ・ナシ・イチジク等の落葉果樹では紋羽病の伝染源になる恐れがあるため、完熟堆肥にして施用する。

ウ 葉面散布

葉面散布は、微量要素成分が欠乏したときの応急的対策として行われるだけでなく、窒素養分等の補給としても、一般的に行われている。ホウ素のように欠乏と過剰の症状が類似する場合があるので、養分欠乏で散布する場合は、症状を十分確認した上で行う必要がある。

窒素資材の葉面散布では、尿素は吸収効率が高く、繰り返し散布することで吸収量を増加させることができる(図2)。散布濃度は高い方が吸収量が多くなるが、濃度障害を生じる場合があるので、尿素では200~500倍、市販の資材では使用方法に基づいて散布する。

葉面散布は、即効的に葉に養分補給できる特徴があるが、吸収量は施肥に比べ少ないとから、あくまで応急的措置として活用する。




図2 散布回数と散布濃度の違いが葉面散布窒素の吸収に及ぼす影響
(上段:濃度、下段:回数)

(H11 土肥学会中部支部講演要旨、吉川、1999)

エ 堆肥等の有機物を活用した施肥技術

堆肥は、土壤改良資材としての利用だけでなく、肥料資材としても活用が可能である。中晩生カンキツの‘不知火’を用い、堆肥による代替を検討した結果、牛ふん堆肥2回施用（窒素代替率35%・5.7 t/10a）（施肥時期と施肥量は表2）では、葉中窒素はやや低いものの、収量（図3）や果実品質、経費はほぼ同等であった。

なお、堆肥はリン酸とカリの含有率が高いことや肥料成分の溶出が化成肥料とは異なることから、連年、肥料の代替として用いる場合には、その特徴を踏まえた施用が前提となる。このため、土壤診断を行い土壤中含量に応じて、施用量を減らすこと必要である。

表2 牛ふん堆肥による代替施肥試験の施肥時期と施用成分量（堆肥2回区）

	3月	5月	6月	9月	11月
施用肥料	牛ふん堆肥	化成肥料	尿素	尿素	牛ふん堆肥
施用成分量 (窒素-リン酸-カリ:kg/10a)	6-10-10	6-4-5	10-0-0	6-0-0	6-10-10

オ 土壤診断によるリン酸・カリ施肥量の削減

県内の果樹園の土壤には、これまで施用してきたリン酸やカリが蓄積し、土壤診断で過剰と診断される園地が多くなっている（図4）。このような園地で通常どおりの施肥を行うことは、余分な肥料コストをかけるだけでなく、土壤中成分のアンバランスにより他の肥料成分の吸収に悪影響を及ぼし、土壤流亡により周




図3 堆肥施用が‘不知火’の樹容積当たり収量に及ぼす影響

辺環境への負荷を増やすことも懸念される。




図4 カンキツ園土壌の可給態リン酸及び交換性カリ含量別比率(鉱質土壌)

これらのことから、土壌診断を活用し、土壌状態に応じて施肥量を減らすことは、土壌やカンキツ栽培だけでなく、経営にも環境にもやさしい施肥法である。土壌診断によるリン酸やカリの含量毎の施肥削減程度については、表3と表4のとおりである。減肥により次第に土壌中含量が減少する。交換性カリの方がリン酸よりも減少しやすく、土壌の種類によっても減少の程度は異なる。このため、毎年土壌診断によって園地の土壌中含量を確認し、次年度の減肥割合を判断することが望ましい。

表3 土壌診断によるリン酸含量に応じた施肥量の削減

土壌タイプ	土壌中可給態リン酸含量 (mg/乾土 100g、truog 法)		
鉱質土壌	80 以下	81~200	201 以上
腐植質土壌	100 以下	101~200	201 以上
リン酸施肥量の削減程度	基準どおり	50%減肥	100%減肥

表4 土壌診断による交換性カリ含量に応じた施肥量の削減

土壌タイプ	土壌中交換性カリ含量 (mg/乾土 100g)		
腐植質土壌	50 以下	51~100	101 以上
	基準どおり	50%減肥	100%減肥
鉱質土壌			
カリ施肥量の削減程度			

力 肥効調節型肥料を利用した環境負荷軽減、施肥軽労化技術

カンキツ栽培における施肥では、養分を効率的に吸収するために年間施用量を各生育時期の樹体要求量に応じて数回に分けて施用する。しかし、他の作業との関係で適期施用できず、樹勢低下を招く場合がある。

そこで、従来と同様の肥料効果が期待できる、肥効調節型肥料を利用した年1回施肥技術について以下に記述する。年1回施肥は、年4回以上行われる施肥を年1回で実施する栽培法で、栽培する品種の特性や栽培地域の土壤・気象条件を考慮し、肥効調節型肥料や土壤改良資材など粒状資材を配合した年1回施肥用肥料をウンシュウミカンでは11月から1月、中晩柑類では3月に施用する。本方法では、樹体の養分吸収量の多い夏季に肥料溶出量が多くなるように配分を設計

(表5) することで樹勢を維持した上、慣行の施肥以上に環境負荷軽減効果も期待できる。成分溶出速度が異なる資材を組み合わせることで、窒素施用量が慣行施肥の80%、リン酸、カリが50%程度でも従来と同様の肥料効果が得られ、地下浸透水への成分溶脱量を窒素は慣行施肥の60%、カリは30%に抑制できる(図5)。なお、リン酸は施肥法に関係なく溶脱しないが、年1回施肥では土壤への蓄積が抑制される。

また、肥効調節型肥料に粒状の石灰資材を組み合わせることで、土壤改良効果も期待できる。石灰10kg/10aを加えた年1回用肥料の施用により、黄色土壤園地ではpH低下を抑制できる(図6)。しかし、黒ボク土壤など腐植の多い園地ではpH矯正効果を得にくいので、別に石灰資材の投入が必要である。慣行と同程度の着果数と果実品質が得られ、施肥作業時間は、30~60%程度短縮できる(図7)。

表5 年1回施肥用肥料の配合例(影山ら、2020)

肥料の種類	溶出日数	配合割合 (%)	成分量(%)			
			N	P	K	Mg
肥効調節型NPK肥料①	40、70	21	14	11	13	0
肥効調節型NPK肥料②	140	14	20	5	10	0
肥効調節型NPK肥料③	100	7	14	11	13	0
肥効調節型N肥料①	70、100	12	40	0	0	0
肥効調節型N肥料②	40、140	3	41	0	0	0
肥効調節型NK肥料	70、100	10	2	0	38	0
有機石灰質肥料	—	16	0	0	0	7
苦土質肥料	—	10	0	0	0	33
リン酸質肥料	—	7	0	35	0	0




図5 年1回施肥による累積溶脱量への影響
(H25年3月～H26年2月)




図6 石灰資材を含む年1回用肥料の連年施用による土壤pH矯正効果




図7 年1回施肥による着果数への影響

(4) 高品質化や低コスト化栽培に対応した施肥技術

ア ウンシュウミカンの周年マルチ点滴かん水同時施肥法（マルドリ方式）

本方法は、かん水同時施肥（養液土耕）栽培と類似した栽培法である。透湿性マルチシートを周年で敷き、点滴かん水設備で施肥とかん水を同時に使う。この方法では、多雨年においても高糖度が維持され、品質の良い果実が生産されるとともに、干ばつ年の樹勢維持にも効果がある。また、透湿性マルチシートの張替は3年に1度に軽減され、施肥量も慣行栽培の60%に軽減できる。

本システムは、水源、導水管、バルブ、フィルター、液肥タンク、液肥混入機、電磁弁、点滴かん水チューブ、透湿性マルチシートで構成される（図8）。




図8 周年マルチ点滴かん水同時施肥法（マルドリ方式）

施肥管理は表6のとおり、4～11月のかん水時に液肥を150ppmになるよう混合し施肥する。

表6 周年マルチ点滴かん水同時施肥法における栽培管理の基本（極早生・早生）

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
かん水時期	上中下	中	上中下	上中			下	下	上			上中下
回数	6	3	9	6			2	2	2			6
量(L)/樹/回	10	5	10	10			10	10	20			10
月間水量(L)	60	15	90	60			20	20	40			60
かん水同時施肥時期				中下	上中下	上中下	上中			上中下	上中下	
回数				6	19	30	20			12	13	
量(L)/樹/回				10	5	5	5			5	5	
月間水量(L)				60	95	150	100			60	65	
(窒素g)				(9)	(14.5)	(22.5)	(15)			(8)	(9.5)	

注 小樹冠樹(196本/10a)での基準。液肥濃度150ppmNで79.5g/樹/年(15.6kgN/10a/年)、水量895L/樹/年、総水量175t/10a/年

広樹冠樹(65本/10a)では、同一液肥濃度で約240g/樹/年、水量2700L/樹/年、総水量・N施肥量/10a/年は同じ。5月中旬までは週3回程度、5月下旬～7月中旬までは毎日、10月上旬～11月末までは週3回のかん水・施肥、8月下旬から減酸かん水、量は年次の天候による。8月は極力乾燥させるが、樹体の状況に応じて樹勢維持かん水を行う。

(森永邦久、農業技術大系 果樹編カンキツより)

(1) 普通温州 I (肥沃土壤)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壤 (褐色森林土、赤色土、黄色土)
 腐植質土壤 (黒ボク土)
 3. 栽植本数 60本／10a
 4. 目標収量 4,000kg／10a
 5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	青島温州 寿太郎温州
	●	⊗	⊗	⊗	⊗								
主要作業名	苦土石 有機物 投入 定 施肥用	春肥			夏肥	摘果剤散布	前期 摘果	後期 摘果		秋收穫		貯藏管理	

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	4.0	4.0	3.0	1,000～2,000
6月上～中旬	12.0	4.0	12.0	
11月上旬	6.0	4.0	3.0	
計	22.0	12.0	18.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が深く (約 30cm 以上) 、保肥力や保水性の高い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a 当たり栽植本数 50 本、目標収量 3,000kg、年間N18kg、P₂O₅9kg、K₂O14kg とする。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH 6.0 (H₂O) を目標として算出する。施用時期は 1 ～ 2 月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(2) 普通温州 II (普通土壤)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壤 (褐色森林土、赤色土、黄色土)
 3. 栽植本数 75本／10a
 4. 目標収量 4,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 青島温州
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	●			⊗			⊗	⊗			●		
主要作業名			●		●						●		
	苦土石灰投入用	有機物定	春肥			夏肥	摘果剤散布		前期摘果	後期摘果		秋肥収穫	貯藏管理

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	8.0	4.0	5.0	1,000～2,000
6月上～中旬	12.0	4.0	12.0	
11月上旬	10.0	4.0	7.0	
計	30.0	12.0	24.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が浅く (約 30cm 以下) 、保肥力や保水性が比較的低い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a 当たり栽植本数 50 本、目標収量 3,000kg、年間 N 26kg、P₂O₅ 9kg、K₂O 20kg とする。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH 6.0 (H₂O) を目標として算出する。施用時期は 1 ～ 2 月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(3) 普通温州 III (マルチ栽培・肥沃土壤)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壌(褐色森林土、赤色土、黄色土)
 腐植質土壌(黒ボク土)
 3. 栽植本数 60本／10a
 4. 目標収量 4,000kg／10a
 5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	青島温州 寿太郎温州
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
主要作業名	苦土石 有機物 投入 せん定 施肥用	春肥			夏肥	摘果剤散布	前期摘果	マルチシート被覆	後期摘果		マルチ 収穫 除去、 秋肥		貯藏管理

6. 施肥基準(kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	4.0	4.0	3.0	1,000～2,000
6月上～中旬	12.0	4.0	12.0	
11月上旬	6.0	4.0	3.0	
計	22.0	12.0	18.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が深く(約30cm以上)、保肥力や保水性の高い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量3,000kg、年間N18kg、P₂O₅9kg、K₂O14kgとする。
- (3) マルチシート除去が遅れ11月に施肥できない場合は、マルチシート除去後ただちに施肥し、かん水する、もしくは4月と5月に分施する。
- (4) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (5) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(4) 普通温州IV(マルチ栽培・普通土壤)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壤(褐色森林土、赤色土、黄色土)
 3. 栽植本数 75本/10a
 4. 目標収量 4,000kg/10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	青島温州
	●			⊗	⊗	⊗	⊗	⊗		●			
主要作業名	苦土石灰投入 有機物定定 春肥				夏肥	摘果剤散布		前期摘果	マルチシート被覆	後期摘果		● 収穫 マルチ除去、秋肥	貯藏管理

6. 施肥基準(kg/10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	8.0	4.0	5.0	1,000~2,000
6月上~中旬	12.0	4.0	12.0	
11月上旬	10.0	4.0	7.0	
計	30.0	12.0	24.0	1,000~2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が浅く(約30cm以下)、保肥力や保水性が比較的低い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量3,000kg、年間N26kg、P₂O₅9kg、K₂O20kgとする。
- (3) マルチシート除去が遅れ11月に施肥できない場合は、マルチシート除去後ただちに施肥し、かん水する、もしくは4月と5月に分施する。
- (4) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1~2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (5) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(5) 普通温州V(年1回施肥・肥沃土壤)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壌(褐色森林土、灰色台地土、赤色土、黄色土)
 腐植質土壌(黒ボク土)
 3. 栽植本数 60本/10a
 4. 目標収量 4,000kg/10a

5. 栽培型と主な作業

栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	青島温州 寿太郎温州
主要作業名	施肥	有機物投入	せん定			摘果剤散布		前期摘果	後期摘果		収穫		貯蔵管理

6. 施肥基準 (kg/10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
11~1月下旬	20.0	10.0	15.0	1,000~2,000

※年1回施肥用に調整された肥料を用いる。

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が深く(約30cm以上)、保肥力や保水性の高い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量3,000kg、年間N15kg、P₂O₅8kg、K₂O12kgとする。
- (3) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (4) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(6) 普通温州 VI (年1回施肥・普通土壤)

1. 対象地域 県下一円
2. 土 壤 鉱質土壌(褐色森林土、赤色土、黄色土)
3. 栽植本数 75本／10a
4. 目標収量 4,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 青島温州
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	●	○		●	⊗	⊗	⊗	⊗		●			
主要作業名	施肥	有機物投入	せん定			摘果剤散布		前期摘果	後期摘果		収穫		貯蔵管理

6. 施肥基準 (kg/10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
11～1月下旬	24.0	10.0	21.0	1,000～2,000

※年1回施肥用に調整された肥料を用いる。

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が浅く(約30cm以下)、保肥力や保水性が比較的低い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量3,000kg、年間N23kg、P₂O₅8kg、K₂O16kgとする。
- (3) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (4) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(7) 早生温州I(肥沃土壤)

1. 対象地域

県下一円

2. 土 壤

鉱質土壤(褐色森林土、赤色土、黄色土)

腐植質土壤(黒ボク土)

3. 栽植本数

60本／10a

4. 目標収量

4,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	宮川早生 興津早生
	❖			❖	❖	❖	❖						
主要作業名	苦土石灰投入用	有機物定定	春肥			夏肥	摘果剤散布	前期摘果	後期摘果		秋肥・収穫		

6. 施肥基準(kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月中旬	4.0	2.0	2.0	1,000～2,000
6月上旬	11.0	5.0	11.0	
10月下旬	5.0	5.0	3.0	
計	20.0	12.0	16.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が深く(約30cm以上)、保肥力や保水性が高い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量3,000kg、年間N17kg、P₂O₅9kg、K₂O13kgとする。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) マルチ栽培においては、被覆除去後ただちに秋肥を施用する。さらに、収穫後かん水する。
- (5) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (6) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(8) 早生温州Ⅱ(普通土壤)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壤(褐色森林土、赤色土、黄色土)
 3. 栽植本数 75本／10a
 4. 目標収量 4,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	宮川早生 興津早生
	☒			☒	☒	☒	☒						
主要作業名		●			●					●			
	苦土石灰投入用	有機物定	春肥			夏肥	摘果剤散布		前期摘果	後期摘果		秋肥・収穫	

6. 施肥基準(kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月中旬	7.0	3.0	4.0	1,000～2,000
6月上旬	10.0	5.0	10.0	
10月下旬	8.0	4.0	6.0	
計	25.0	12.0	20.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が浅く(約30cm以下)、保肥力や保水性が比較的低い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量3,000kg、年間N21kg、P₂O₅9kg、K₂O16kgとする。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) マルチ栽培においては、被覆除去後ただちに秋肥を施用する。さらに、収穫後かん水する。
- (5) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (6) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(9) 早生温州III（ハウス早期加温夏芽母枝）

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壤（褐色森林土、赤色土、黄色土）
 腐植質土壤（黒ボク土）
 3. 栽植本数 75本／10a
 4. 目標収量 6,000kg／10a
 5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 宮川早生 興津早生	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
	⊗	⊗	⊗				■	△	×					
主要作業名	摘花 落葉 落とし	摘果	摘枝 果つり		加温 張り 停止 除 解 放	内サイ ドリ 解除	収穫	ビニール 除去	せん定	●	● ●	施肥 機物 施用	ビニール被 覆	加温開始

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
収穫直後	7.0	4.0	7.0	1,000～2,000
10月中旬	10.0	5.0	8.0	
計	17.0	9.0	15.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 目標収量 5,000kg とする場合は、年間N15kg、P₂O₅9kg、K₂O12kg とする。
- (2) 着花量が多い場合は、12月下旬にN成分で3kgを速効性肥料で施用する。
- (3) 品質への影響が心配な場合は、N分が少ないバーク堆肥、稻わら堆肥、ピートモスを施用する。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(10) 早生温州IV (ハウス後期加温春芽母枝)

1. 対象地域

県下一円

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、赤色土、黄色土）

腐植質土壤（黒ボク土）

3. 栽植本数

75本／10a

4. 目標収量

6,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

栽培型	月別												品種
	1 上	2 中	3 下	4 上	5 中	6 下	7 上	8 中	9 下	10 上	11 中	12 下	
	⊗	⊗	⊗										宮川早生
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
主要作業名	加温開始	摘蕾	花弁落とし	摘果	摘枝つり		内張り除去・サイド解放	加温停止	収穫	●	●	●	施肥・定植 ビニール除去・施肥 ビニール被覆

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
収穫直後	9.0	5.0	6.0	1,000～2,000
被覆直前	11.0	6.0	9.0	
計	20.0	11.0	15.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 目標収量 5,000kg とする場合は、年間N17kg、P₂O₅9kg、K₂O14kg とする。
- (2) 着花量が多い場合は、1月中～下旬にN成分で3kgを速効性肥料で施用する。
- (3) 品質への影響が心配な場合はN分が少ないバーク堆肥、稻わら堆肥、ピートモスを施用する。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(11) 極早生温州I(肥沃土壤)

1. 対象地域

県下一円

2. 土 壤

鉱質土壤(褐色森林土、赤色土、黄色土)

腐植質土壤(黒ボク土)

3. 栽植本数

75本／10a

4. 目標収量

3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	ゆら早生 日南1号
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
主要作業名	苦土石 有機物 投入 定	春肥	夏肥	摘果	収穫	秋肥							

6. 施肥基準(kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月中旬	7.0	4.0	5.0	1,000～2,000
6月上旬	4.0	2.0	3.0	
収穫後	9.0	5.0	7.0	
計	20.0	11.0	15.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が深く(約30cm以上)、保肥力や保水性高い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量2,000kg、年間N17kg、P₂O₅9kg、K₂O13kgとする。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(12) 極早生温州Ⅱ(普通土壤)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壌(褐色森林土、赤色土、黄色土)
 3. 栽植本数 75本／10a
 4. 目標収量 3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 ゆら早生 日南1号 静丸早生
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	☒				⊗								
主要作業名		●			●			摘果		●			
	苦土石灰投入用	有機物定	春肥		夏肥				収穫	秋肥			

6. 施肥基準(kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月中旬	8.0	4.0	5.0	1,000～2,000
6月上旬	4.0	2.0	3.0	
収穫後	10.0	6.0	8.0	
計	22.0	12.0	16.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 本施肥基準は主要根群域が浅く(約30cm以下)、保肥力や保水性が比較的低い園地に適用する。
- (2) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量2,000kg、年間N18kg、P₂O₅9kg、K₂O14kgとする。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(13) 甘ナツ I (肥沃土壤)

1. 対象地域 主として伊豆
 2. 土 壤 腐植質土壌 (黒ボク土)
 3. 栽植本数 60本／10a
 4. 目標収量 5,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	川野夏橙
			☒				⊗						
主要作業名	収穫 (貯蔵)	苦土石灰施用	有機物投入	せん定・春肥	収穫 (木成り)		夏肥	摘果	初秋肥	秋肥			

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	9.0	6.0	8.0	1,000～2,000
6月中旬	10.0	7.0	7.0	
8月下旬	8.0	6.0	8.0	
10月上旬	8.0	6.0	7.0	
計	35.0	25.0	30.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量4,000kg、年間N30kg、P₂O₅20kg、K₂O26kgとする。
- (2) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壌管理する。
- (3) 苦土石灰の施用は収穫後(春肥または夏肥前)に行う。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(14) 甘ナツ II (普通土壤)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壤 (褐色森林土、灰色台地土、赤色土、黄色土)
 3. 栽植本数 75本／10a
 4. 目標収量 4,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	川野夏橙 スルガ甘夏
			☒				⊗						
主要作業名	収穫 (貯蔵)	苦土石灰施用	有機物投入	せん定・春肥	収穫 (木成り)		夏肥	摘果	初秋肥	秋肥			

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	9.0	5.0	7.0	1,000～2,000
6月中旬	10.0	5.0	7.0	
8月下旬	8.0	5.0	6.0	
10月上旬	8.0	5.0	6.0	
計	35.0	20.0	26.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壤管理する。
- (2) 苦土石灰の施用は収穫後（春肥または夏肥前）に行う。
- (3) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (4) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(15) 日向夏

1. 対象地域 主として伊豆
 2. 土 壤 腐植質土壤（黒ボク土）
 3. 栽植本数 75本／10a
 4. 目標収量 3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
栽培型													ヒュウガナツ オレンジヒュウガ 井原日向
				☒			⊗			□			
主要作業名			●		●	●	●	●	●	●			
	苦土石 有機物 石灰 投入 施用	春肥 ・ 収穫 (オレンジ日向)	せん定 (日向夏)	収穫 (日向)	夏肥	摘果	初秋肥	秋肥	袋掛け				

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	5.0	4.0	7.0	1,000～2,000
6月中旬	9.0	6.0	7.0	
8月下旬	9.0	5.0	7.0	
10月上旬	7.0	5.0	7.0	
計	30.0	20.0	28.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量2,500kg、年間N28kg、P₂O₅23kg、K₂O28kgとする。
- (2) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壌管理する。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(16) ネーブルオレンジ（屋根掛け）

1. 対象地域

県下一円

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、赤色土、黄色土）

腐植質土壤（黒ボク土）

3. 栽植本数

60本／10a

4. 目標収量

3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

栽培型	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
		□	❖			⊗			❖			□		白柳ネーブル 森田ネーブル
主要作業名		せん定	苦土石灰	有機物投入用	春肥		夏肥	摘果		初秋肥	夏秋枝の処理	秋肥		収穫

6. 施肥基準 (kg/ 10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	8.0	7.0	4.0	1,000～2,000
6月中旬	11.0	5.0	10.0	
9月中旬	4.0	2.0	3.0	
11月上旬	11.0	6.0	6.0	
計	34.0	20.0	23.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壤管理する。
- (2) 苦土石灰の施用量は、pH 6.0 (H₂O) を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (3) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (4) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(17) ポンカン

1. 対象地域

県下一円

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、赤色土、黄色土）

腐植質土壤（黒ボク土）

3. 栽植本数

60本／10a

4. 目標収量

3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	太田ポンカン
	❖			❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	
主要作業名	苦土石灰投入	有機物投入	春定肥		初夏肥	夏肥	摘果	仕上げ摘果			秋肥	収穫	

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	7.0	4.0	6.0	1,000～2,000
5月上旬	6.0	4.0	5.0	
6月下旬	10.0	6.0	9.0	
11月上旬	7.0	4.0	6.0	
計	30.0	18.0	26.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量2,500kg、年間N28kg、P₂O₅16kg、K₂O24kgとする。
- (2) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壌管理する。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(18) 清 見

1. 対象地域 中・東部
 2. 土 壤 鉱質土壌(褐色森林土、赤色土、黃色土)
 腐植質土壌(黒ボク土)
 3. 栽植本数 60本／10a
 4. 目標収量 3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

栽培型	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 清見
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
		□	☒		⊗	⊗	⊗		□					
			●			●		●		●				
主要作業名		苦土石 機物 投入 施用	有 機 物 收 穫	春 肥 定			夏 肥 果	摘 果		仕 初 上 秋 肥 果		秋 肥 袋 掛け		

6. 施肥基準(kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	6.0	4.0	6.0	1,000～2,000
6月中旬	12.0	8.0	10.0	
8月下旬	6.0	4.0	6.0	
10月上旬	6.0	4.0	6.0	
計	30.0	20.0	28.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量2,500kg、年間N28kg、P₂O₅18kg、K₂O26kgとする。
- (2) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壤管理する。
- (3) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1～2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (4) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(19) 不知火

1. 対象地域 中・東部
 2. 土 壤 鉱質土壤（黄色土）、腐植質土壤（黒ボク土）
 3. 栽植本数 60本／10a
 4. 目標収量 2,500kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 不知火
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	□	❖		⊗	⊗		⊗			□			
主要作業名		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	収穫	苔土定	春肥		初夏肥		夏肥・摘果		初秋肥		袋掛け	秋肥	
	施肥	石灰施用	石灰・有機物施用										

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	5.0	3.0	5.0	1,000～2,000
5月上旬	5.0	3.0	5.0	
6月下旬	9.0	4.0	9.0	
9月上旬	6.0	3.0	6.0	
11月上旬	5.0	3.0	5.0	
計	30.0	16.0	30.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壤管理する。
- (2) やせた土壤では、N施肥量を基準より年間で5kg多くする。
- (3) 樹勢が弱い場合は、3月、4月に窒素の葉面散布をする。
- (4) 新芽の先端が枯れる症状が発生する場合は、水溶性カルシウム剤を散布する。
- (5) 夏期にかん水をすることで、酸の低減を図る。
- (6) 不知火は根が少ないため、ピートモス等の有機物のたこつぼ施用等により発根の促進を図る。
- (7) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(20) はるみ

1. 対象地域 中・東部
 2. 土 壤 鉱質土壌(灰色台地土、黄色土)
 腐植質土壌(黒ボク土)
 3. 栽植本数 60本/10a
 4. 目標収量 3,000kg/10a
 5. 栽培型と主な作業

栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 はるみ
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
				☒			⊗	⊗					
主要作業名 収穫		●		●	●				●				
苦土石灰投入	有機物投入	春肥	せん定	初夏肥	夏肥	摘果	仕上げ摘果		秋肥				

6. 施肥基準 (kg/10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月下旬	6.0	4.0	6.0	1,000~2,000
5月上旬	6.0	4.0	6.0	
6月下旬	10.0	8.0	10.0	
10月中旬	8.0	4.0	6.0	
計	30.0	20.0	28.0	1,000~2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 作業道を設置する園地では、10a当たり栽植本数50本、目標収量2,500kg、年間N28kg、P₂O₅18kg、K₂O26kgとする。
- (2) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壤管理する。
- (3) 樹勢が弱く葉色が悪い場合は、8月下旬に窒素で5kg/10a施用する。
- (4) はるみは着花が不安定なので、蕾を確認しながら4月にせん定を実施する。
- (5) はるみは結実率が高く、着果過多になりやすいため、摘果を確実に行う。
- (6) 土壌乾燥に弱いので、土壌乾燥しやすい園では夏期にかん水を行う。
- (7) 苦土石灰の施用量は、pH6.0(H₂O)を目標として算出する。施用時期は1~2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (8) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(21) レモン

1. 対象地域 県内一円
 2. 土 壤 鉱質土壌(褐色森林土、赤色土、黄色土)
 腐植質土壌(黒ボク土)
 3. 栽植本数 60本/10a
 4. 目標収量 2,500kg/10a
 5. 栽培型と主な作業

栽培型	品種											
	1 上中下	2 上中下	3 上中下	4 上中下	5 上中下	6 上中下	7 上中下	8 上中下	9 上中下	10 上中下	11 上中下	12 上中下
	□	☓	⊗	⊗	☓							
主要作業名	苦土石灰投入	有機物投入	春肥・せん定		夏肥	摘果	初秋肥		夏秋枝の処理			

6. 施肥基準 (kg/10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月中旬	6.0	4.0	6.0	1,000~2,000
6月上旬	10.0	6.0	8.0	
8月下旬	8.0	6.0	8.0	
10月下旬	6.0	4.0	6.0	
計	30.0	20.0	28.0	1,000~2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 樹勢が低下すると果実肥大に影響するので、年間を通じて肥効が持続するように土壤管理する。
- (2) 苦土石灰の施用量は、pH 6.0 (H₂O)を目標として算出する。施用時期は1~2月とし、春肥施用の半月前までに行う。
- (3) 堆肥を施用する場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (4) 堆肥や苦土石灰、肥料は土とよく混和して肥効の増進を図る。

(22) ビ ワ

1. 対象地域 県下一円
2. 土 壤 鉱質土壌（褐色森林土、灰色台地土、赤色土、黄色土）
腐植質土壌（黒ボク土）
3. 栽植本数 30本／10a
4. 目標収量 1,200kg／10a
5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	田中 茂木
	■	■	⊗	■	■	⊗	×	×	⊗	⊗	⊗	⊗	
主要作業名	防寒	● 春摘 肥・ 防袋 寒かけ 終わり	● 収穫	● 夏整枝 肥・せん定	芽かき	芽かき	整枝かき ・せん定	摘房・ 摘蕾	秋肥				

6. 施肥基準 (kg／10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月中旬	10.0	14.0	10.0	敷ワラ、敷草
6月上旬	5.0	7.0	7.0	2,000
11月上旬	10.0	5.0	7.0	
計	25.0	26.0	24.0	2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0(H₂O)を目標として施用量を算出し、1月または9月に施用する。
- (2) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(23) ナシ

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壤（褐色森林土、灰色台地土、赤色土、黄色土）
 腐植質土壤（黒ボク土）
 3. 栽植本数 20本／10a
 4. 目標収量 3,000kg／10a
 5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
	☒	#	☒	×	⊗ × ⊗	☒							幸水 豊水
主要作業名	整枝・せん定	結束		● 施肥受粉・芽かき	摘芽かき G A処理	仕上げ摘果	夏季せん定・新梢誘引	収穫	施肥 (幸水)	施肥	施肥	有機物施用	苦土石灰施用

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
5年	6.0	4.0	5.0	500
10年	14.0	8.0	11.0	2,000
成木	20.0	12.0	16.0	3,500

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	5.0	3.0	4.0	1,000～2,000
9月	5.0	3.0	4.0	
10月下旬	10.0	6.0	8.0	
計	20.0	12.0	16.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 9月の施肥は、幸水は9月上旬、豊水は下旬（収穫直後）に行う。
- (2) 苦土石灰はpH 6.0 (H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (3) 土壌改良剤又は有機資材の施用は、深層施用に努める。投入量はバーク堆肥等では、500～600kg／10aとする。
- (4) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (5) 春先の寒害による発芽不良の発生が懸念される場合は、堆肥及び10月下旬の施肥を4月に変更する。

(24) カキ I (肥沃土壤)

1. 対象地域 県東部
 2. 土 壤 腐植質土壌 (黒ボク土)
 3. 栽植本数 50本／10a
 4. 目標収量 3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
	☒	=		☒	×	☒	☒	☒			☒	☒	四ツ溝
				●	施肥	摘蓄・芽かき	摘果	夏季せん定	夏季せん定	●	施肥・取穂	有機物施用・中耕	落葉処理
主要作業名	整枝・せん定	苦土石灰施用											

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
5年	5.0	4.0	4.0	500
10年	12.0	9.0	10.0	2,000
成木	17.0	12.0	14.0	3,000

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	7.0	6.0	7.0	1,000～2,000
10月下旬	10.0	6.0	7.0	
計	17.0	12.0	14.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0 (H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 完熟堆肥は毎年1,000～2,000kg／10a 施用する。
- (3) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(25) カキ II (普通土壤)

1. 対象地域

県下一円

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、赤色土、黄色土）

3. 栽植本数

50本／10a

4. 目標収量

3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	次郎 四ツ溝
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	△△
主要作業名	整枝・せん定	苦土石灰施用		施肥	摘芽かき	施肥	摘果・夏季せん定		施肥	施肥・収穫		落葉処理	有機物施用・中耕

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
5年	6.0	4.0	5.0	500
10年	14.0	9.0	11.0	2,000
成木	20.0	12.0	16.0	3,000

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	5.0	3.0	4.0	1,000～2,000
6月下旬	5.0	3.0	4.0	
10月下旬	10.0	6.0	8.0	
計	20.0	12.0	16.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0(H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 完熟堆肥は毎年1,000～2,000kg／10a 施用する。
- (3) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(26) カキ III (加温ハウス)

1. 対象地域

県中西部

2. 土 壤

鉱質土壌(褐色森林土、赤色土、黄色土)

3. 栽植本数

30~50本/10a

4. 目標収量

3,000kg/10a

5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 次郎
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	
	△	⊗ ×	⊗	■						▲			△ ⊗
主要作業名	ビニール開始被覆	● 摘蓄・芽かき・施肥	摘果	● 加温終了				収穫	● ビニール除去	● 施肥			整枝・せん定

6. 施肥基準(kg/10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月上旬	5.0	3.0	4.0	1,000~2,000
5月下旬	5.0	3.0	4.0	
10月下旬	10.0	6.0	6.0	
計	20.0	12.0	14.0	1,000~2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0(H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 土壌改良剤又は有機資材施用は深層施用に努める。
- (3) 完熟堆肥は毎年1,000~2,000kg/10a施用する。
- (4) 苦土欠乏症の発生園ではカリの施用を控える。
- (5) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(27) クリ

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壌（褐色森林土、赤色土、黄色土）
 腐植質土壌（黒ボク土）
 3. 栽植本数 12~19本／10a
 4. 目標収量 350kg／10a
 5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	☒			☒			☒						
せん定	苦土石灰施用			施肥		施肥	夏季せん定		収穫	施肥			国見筑波銀寄 ぼろたん 美玖里
主要作業名				●		●				●			

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
2年	2.0	2.0	2.0	
5年	6.0	3.0	4.0	150
成木	12.0	6.0	8.0	350

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	4.0		2.0	1,000～ 2,000
6月上旬	2.0		2.0	
10月中旬	6.0	6.0	4.0	
計	12.0	6.0	8.0	1,000～ 2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) pH 5.0~5.5(H₂O)で生育良好なので、苦土石灰の過剰施用に留意する。
- (2) 苦土石灰、有機資材及び堆肥の投入時期は1~2月とする。
- (3) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(28) ウ メ

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壌（褐色森林土、赤色土、黄色土）
 腐植質土壌（黒ボク土）
 3. 栽植本数 20本／10a
 4. 目標収量 2,000kg／10a
 5. 栽培型と主な作業

栽培型	月別												品種
	1 上	2 中	3 下	4 上	5 中	6 下	7 上	8 中	9 下	10 上	11 中	12 下	
							■	×	✖	✖	✖	✖	白加賀 改良内田 南高 宮口小梅 島田八房
主要作業名				● 施肥		● 収穫 芽かき		● 施肥		● 秋季せん定		● 施肥	苦土石・ 石灰施用定

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
2年	3.0	2.0	3.0	
5年	7.0	5.0	7.0	500
成木	15.0	10.0	15.0	2,000

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	4.0	3.0	3.0	1,000～ 2,000
7月下旬	4.0	3.0	3.0	
10月下旬	7.0	4.0	6.0	
計	15.0	10.0	12.0	1,000～ 2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0 (H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 有機資材の投入量はバーク堆肥等では、500～600kg／10aとする。
- (3) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(29) モモ I

1. 対象地域 県中西部
 2. 土 壤 鉱質土壌(褐色森林土、黄色土、砂丘未熟土)
 3. 栽植本数 30~40本/10a
 4. 目標収量 1,200~2,500kg/10a
 5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	×		⊗		⊗	□				×		×	さおとめ ちよひめ 日川白鳳 八幡白鳳 白鳳
主要作業名	整枝		摘蕾	● 施肥	摘果・袋かけ	夏季せん定・収穫	● 施肥			● 施肥			苦土石灰・灰せん定

6. 施肥基準(kg/10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
2年	3.0	2.0	2.0	
5年	7.0	4.0	6.0	1,500
成木	12.0	7.0	10.0	2,500

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	3.0	2.0	3.0	1,000~
7月中下旬	3.0	2.0	3.0	2,000
10月中旬	6.0	3.0	4.0	
計	12.0	7.0	10.0	1,000~ 2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0(H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
 (2) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(30) モモ II (加温ハウス)

1. 対象地域 県中西部
 2. 土 壤 鉱質土壌(褐色森林土、灰色台地土、黄色土、砂丘未熟土)
 3. 栽植本数 30~40本/10a
 4. 目標収量 1,200kg/10a
 5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 さおとめ ちよひめ 日川白鳳
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	合	¶	✿	⊗	⊗	□	▲						
主要作業名	ビニール被覆・加温開始	受粉	施肥	摘果	収穫	加温終了	ビニール除去	施肥		施肥			苦土石灰・灰施肥用定期

6. 施肥基準 (kg/10a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月中旬	3.0	2.0	3.0	1,000~2,000
7月中下旬	3.0	2.0	3.0	
10月中旬	6.0	3.0	4.0	
計	12.0	7.0	10.0	1,000~2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0(H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(31) スモモ

1. 対象地域

県中部

2. 土 壤

鉱質土壌（褐色森林土、赤色土、黄色土）

3. 栽植本数

16本／10a

4. 目標収量

2,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 大石早生
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	
	◆	⊗	⊗×										△ ○
主要作業名 苦土石灰施用			受粉	施肥 果	摘果 かき	収穫	施肥			施肥			整枝・ せん定

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
2年	4.0	3.0	3.0	
5年	8.0	6.0	7.0	1,000
成木	14.0	10.0	11.0	2,000

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	3.0	2.0	2.0	1,000～
7月中旬～ 8月中旬	3.0	2.0	2.0	2,000
10月上旬	8.0	6.0	7.0	
計	14.0	10.0	11.0	1,000～ 2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0 (H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 7月中旬～8月中旬の施肥は、収穫直後に行う。
- (3) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(32) イチジク I

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壌（褐色森林土、赤色土、黄色土）
 腐植質土壌（黒ボク土）
 3. 栽植本数 100～185 本／10 a
 4. 目標収量 3,000kg／10 a
 5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
	☒	☒	☒	×	━	☒	━	×	━				樹井 ドーフィン
主要作業名	整枝・せん定	施肥	芽かき		新梢誘引	新梢間引き	新梢誘引・摘心	芽かき・収穫葉	施肥	施肥	施肥	施肥	苦土石灰・有機物施用

6. 施肥基準 (kg／10 a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
2年	6.0	4.0	5.0	1,500
3年	10.0	6.0	8.0	2,500
成木	20.0	12.0	16.0	3,000

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月中旬	5.0	3.0	5.0	1,000～2,000
8月中旬	3.0	2.0	2.0	
9月上旬	3.0	2.0	2.0	
9月下旬	3.0	2.0	2.0	
10月下旬	6.0	3.0	5.0	
計	20.0	12.0	16.0	1,000～2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.5～7.0(H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(33) イチジク II (加温ハウス)

1. 対象地域 県下一円
 2. 土 壤 鉱質土壤（褐色森林土、赤色土、黄色土）
 腐植質土壤（黒ボク土）
 3. 栽植本数 100～185 本／10 a
 4. 目標収量 3,000kg／10 a
 5. 栽培型と主な作業

栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 樹井 ドーフィン
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	
	×	×	□	▣	■	■	■	■	△	△	△	△	
主要作業名	● 芽施肥 かき	● 芽かき		新梢誘引	摘心 終了 ・ 二重被覆除去	施肥 ・ 収穫	施肥	施肥 ニール 除去	施肥	施肥	苦土石灰 ・ 有機物施用	ビニール被覆 ・ セン定	整枝 二重被覆始

6. 施肥基準 (kg／10 a)

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
2月中旬	5.0	3.0	5.0	2,000
6月中旬	3.0	2.0	2.0	
7月中旬	3.0	2.0	2.0	
8月下旬	3.0	2.0	2.0	
10月中旬	6.0	3.0	5.0	
計	20.0	12.0	16.0	2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰は pH 6.5～7.0 (H₂O) を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(34) キウイフルーツ

1. 対象地域

県下一円

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、灰色台地土、赤色土、黄色土）
腐植質土壤（黒ボク土）

3. 栽植本数

16本／10a

4. 目標収量

3,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
	△△△	×	□	▲	□⊗□⊗	□	□						ヘイワード 東京ゴールド
主要作業名	整枝 ・定形 施肥 ・中耕	苦土 物 施肥 用	有機 物 施肥 用	機械 耕耘	新梢 誘引 ・芽かき	受粉	新梢 誘引	摘果	摘心	摘心	摘心	施肥 ・収穫 ・貯蔵	

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
2年	6.0	4.0	4.0	
5年	14.0	8.0	10.0	2,000
成木	18.0	12.0	14.0	3,000

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	5.0	6.0	6.0	1,000～
10月下旬	10.0	6.0	8.0	2,000
計	15.0	12.0	14.0	1,000～ 2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0 (H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(35) ブドウ I (屋根掛け)

1. 対象地域

県西部

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、赤色土、黄色土）

3. 栽植本数

6～8本／10 a

4. 目標収量

1,400kg／10 a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	△	△	×	□	⊗	⊗	□	▲	■	□	□	△△	ビオーネ
主要作業名	整枝発芽・促進剤処理	屋根ビニール張り	芽かき	新梢誘引	花穂整形	施肥	摘粒	摘房・新梢誘引	袋かけ・摘心	収穫	苦土石灰施用	施肥・有機物施用	中耕

6. 施肥基準 (kg／10 a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
5年	2.0	2.0	2.0	
10年	5.0	5.0	5.0	700
成木	10.0	10.0	10.0	1,400

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
5月下旬	2.0		4.0	1,000～
11月下旬	8.0	10.0	6.0	2,000
計	10.0	10.0	10.0	1,000～ 2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0 (H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 完熟堆肥を毎年1,000～2,000kg／10 a 施用する。
- (3) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (4) 5月の施肥は、樹勢に応じて施用量を調節する。

(36) ブドウⅡ (加温ハウス)

1. 対象地域

県西部

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、灰色台地土、赤色土、黄色土）

3. 栽植本数

6～8本／10a

4. 目標収量

1,600kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	△□	×□	⊗	⊗	▣■		▲		△△		△△		ビオーネ
主要作業名	ビニール被覆 開始	芽かき 新梢誘引	花穂形成	摘粒	摘房・新梢誘引	●	施肥 終了	収穫	被覆除去	苦土石灰施用	●	施肥・有機物施用 中耕	整枝・せん定 発芽促進剤処理

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
2年	2.0	2.0	2.0	
5年	4.0	4.0	4.0	700
成木	8.0	8.0	8.0	1,600

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月下旬	2.0	0.0	4.0	1,000～
9月下旬	6.0	8.0	4.0	2,000
計	8.0	8.0	8.0	1,000～ 2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰はpH 6.0 (H₂O)を目標として施用量を算出する。施用時期は施肥との間隔を半月以上あけ、施用後は軽く中耕する。
- (2) 完熟堆肥を毎年1,000～2,000kg／10a 施用する。
- (3) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。
- (4) 4月の施肥は、樹勢に応じて施用量を調節する。

(37) ギンナン (イチョウ)

1. 対象地域

県中部

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、赤色土、黄色土）

3. 栽植本数

40本（幼木）→10本（成木）／10a

4. 目標収量

1,000kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別 栽培型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種 金兵衛 久寿 藤九朗
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	—	—	—	●	—	●	施肥	収穫	●	施肥	—	—	せん定
主要作業名 誘引 苦土石灰施用													

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
3~5年	5.0	4.0	4.0	
成木	10.0	8.0	8.0	1,000

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
4月上旬	3.0	2.0	2.0	1,000~2,000
6月下旬	3.0	2.0	2.0	
10月上旬	4.0	4.0	4.0	
計	10.0	8.0	8.0	1,000~2,000

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰は毎年20kg程度施用する。
- (2) 堆肥等は、必ず毎年1,000~2,000kg／10a程度入れる。
- (3) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。

(38) オリーブ

1. 対象地域

県下一円

2. 土 壤

鉱質土壤（褐色森林土、灰色台地土、赤色土、黄色土）
腐植質土壤（黒ボク土）

3. 栽植本数

100本（幼木）→50本（成木）／10a

4. 目標収量

500kg／10a

5. 栽培型と主な作業

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	品種
栽培型	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
※													
主要作業名		●			●				●				
	せん定	苦土石灰施用	施肥			施肥			施肥				

6. 施肥基準 (kg／10a)

(1) 樹齢別施肥量

樹齢	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	目標収量
1～3年	5.0	3.0	4.0	
6～9年	10.0	6.0	8.0	200
成木	16.0	11.0	15.0	500

(2) 成木における時期別施肥量

施肥時期	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	堆肥
3月中旬	8.0	5.0	7.0	1,000～
6月下旬	4.0	3.0	4.0	2,000
10月下旬	4.0	3.0	4.0	
計	16.0	11.0	15.0	1,000～ 2,000

※香川県 HP を参照して作成

https://www.pref.kagawa.lg.jp/noshishozu/noshi_olive/saibai.html

7. 施用上の留意事項

- (1) 苦土石灰は pH 6.0 (H₂O) を目標として施用量を算出し、2月に施用する。
- (2) 堆肥を施用した場合、含まれる肥料成分を施肥量から差し引く。