


# 薬局でのノロウイルス対策

- 患者からの二次感染
- 医薬品を介する経口感染

**STOP !**



- ① 消毒石鹼を用いた手洗い(2度洗い) + 使い捨て手袋




洗い方	ウイルス残存率
水洗い	1%
1度洗い	0.01%
2度洗い	0.0001%

- ② 体調確認

→ 体調不良者は調剤させない・休ませる等の必要な措置を！

- ③ 調剤室の靴を使い分ける



靴底汚染による拡散は30 m以上

- ④ 患者が触れる部分の消毒

アルコール消毒では不十分。塩素系漂白剤(次亜塩素酸Na)で！

目的	次亜塩素酸Na濃度	市販の漂白剤(5~6%)の希釈方法 (500 mLペットボトルでの目安)
日常的清掃	200ppm程度	キャップ半分弱
汚染物消毒	1,000~5,000ppm	キャップ2杯で1,200ppm

- ⑤ 衣服(白衣等)の洗濯

家族が感染していたら？

→ 塩素系漂白剤の使用、熱湯浸漬、アイロンで加熱(2分以上)

問い合わせ先

静岡県中部保健所衛生薬務課 (静岡県藤枝市瀬戸新屋362-1)

電話番号054-644-9289/FAX番号054-644-4471