


下田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,722	501	467.6	107.1	99.5	115.3	▲	1,643	148	141.0	105.0	90.1	122.4	▲
メタボ予備群	1,722	286	269.3	106.2	95.6	118.0	▲	1,643	93	82.1	113.3	93.0	137.9	▲
肥満者	1,722	937	880.1	106.5	102.0	111.2	▲▲	1,643	415	383.5	108.2	99.6	117.6	▲
高血圧症有病者	1,688	910	819.7	111.0	106.2	116.0	▲▲	1,618	626	586.5	106.7	100.4	113.5	▲▲
高血圧症予備群	1,688	217	217.4	99.8	88.2	113.0	▽	1,618	182	194.1	93.8	81.8	107.5	▽
脂質異常症有病者	1,721	999	962.3	103.8	99.7	108.1	▲	1,642	880	861.2	102.2	97.7	106.9	▲
糖尿病有病者	1,713	273	262.2	104.1	93.4	116.0	▲	1,630	114	118.0	96.6	81.0	115.2	▽
糖尿病予備群	1,713	167	263.0	63.5	55.0	73.3	▽▽	1,630	101	213.6	47.3	39.2	57.1	▽▽
習慣的喫煙者	1,721	546	508.7	107.3	100.2	115.0	▲▲	1,643	194	127.7	151.9	133.2	173.3	▲▲

東伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,125	347	313.5	110.7	101.4	120.8	▲▲	1,095	104	101.2	102.8	85.7	123.4	▲
メタボ予備群	1,125	219	174.8	125.3	111.3	141.1	▲▲	1,095	51	54.6	93.4	71.5	122.1	▽
肥満者	1,125	660	577.5	114.3	108.8	120.0	▲▲	1,095	278	258.0	107.7	97.4	119.2	▲
高血圧症有病者	1,117	568	559.0	101.6	95.9	107.6	▲	1,088	478	427.2	111.9	104.6	119.6	▲▲
高血圧症予備群	1,117	178	142.5	124.9	109.2	142.9	▲▲	1,088	129	133.9	96.4	82.0	113.3	▽
脂質異常症有病者	1,131	655	635.4	103.1	98.1	108.3	▲	1,098	621	607.7	102.2	97.0	107.6	▲
糖尿病有病者	1,133	194	181.1	107.1	94.3	121.8	▲	1,096	97	86.9	111.6	92.3	134.9	▲
糖尿病予備群	1,133	170	177.8	95.6	83.2	109.8	▽	1,096	174	153.7	113.2	98.8	129.7	▲
習慣的喫煙者	1,132	376	324.6	115.9	106.7	125.8	▲▲	1,098	133	79.2	167.8	143.2	196.8	▲▲

河津町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	615	184	167.2	110.0	97.5	124.2	▲	527	40	45.5	87.9	65.3	118.4	▽
メタボ予備群	615	108	96.2	112.3	94.6	133.2	▲	527	23	26.3	87.4	58.6	130.3	▽
肥満者	615	323	314.5	102.7	95.3	110.7	▲	527	118	123.1	95.9	81.8	112.4	▽
高血圧症有病者	599	317	291.5	108.7	100.8	117.3	▲▲	516	203	188.9	107.4	96.5	119.6	▲
高血圧症予備群	599	96	77.1	124.5	103.6	149.5	▲▲	516	58	61.9	93.7	73.5	119.4	▽
脂質異常症有病者	614	338	343.0	98.5	91.8	105.8	▽	526	292	276.7	105.5	97.8	113.9	▲
糖尿病有病者	613	87	94.1	92.4	76.1	112.3	▽	524	31	38.3	80.9	57.5	113.8	▽
糖尿病予備群	613	69	94.4	73.1	58.5	91.3	▽▽	524	33	69.1	47.8	34.3	66.4	▽▽
習慣的喫煙者	615	215	181.7	118.3	106.2	131.8	▲▲	527	49	40.6	120.7	92.4	157.5	▲

南伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	712	212	197.9	107.1	95.7	119.9	▲	718	62	65.4	94.7	74.7	120.1	▽
メタボ予備群	712	156	110.4	141.3	123.0	162.3	▲▲	718	42	35.5	118.2	88.2	158.4	▲
肥満者	712	410	364.7	112.4	105.6	119.7	▲▲	718	178	168.6	105.6	93.0	119.9	▲
高血圧症有病者	704	397	352.5	112.6	105.5	120.2	▲▲	710	307	276.5	111.0	102.1	120.8	▲▲
高血圧症予備群	704	75	89.3	84.0	67.8	104.0	▽	710	91	86.7	105.0	86.7	127.1	▲
脂質異常症有病者	713	406	399.6	101.6	95.3	108.3	▲	717	390	390.9	99.8	93.3	106.7	▽
糖尿病有病者	691	116	110.0	105.5	89.4	124.5	▲	699	34	54.6	62.3	44.9	86.5	▽▽
糖尿病予備群	691	81	107.5	75.3	61.4	92.4	▽▽	699	54	96.1	56.2	43.5	72.6	▽▽
習慣的喫煙者	713	217	201.6	107.7	96.4	120.3	▲	718	62	51.9	119.4	94.1	151.4	▲

松崎町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	551	161	154.0	104.5	91.8	119.0	▲	552	47	48.9	96.1	73.1	126.3	▽		
メタボ予備群	551	87	85.4	101.9	84.0	123.5	▲	552	41	27.7	148.2	110.5	198.9	▲▲		
肥満者	551	310	282.9	109.6	101.8	118.0	▲▲	552	139	129.3	107.5	93.1	124.1	▲		
高血圧症有病者	535	275	269.7	102.0	93.9	110.7	▲	543	214	202.8	105.5	95.1	117.1	▲		
高血圧症予備群	535	75	68.2	110.0	89.2	135.6	▲	543	72	66.1	108.9	87.8	135.0	▲		
脂質異常症有病者	551	341	309.9	110.0	103.1	117.5	▲▲	552	275	297.8	92.3	84.9	100.4	▽		
糖尿病有病者	546	79	87.7	90.1	73.5	110.5	▽	550	32	41.3	77.5	55.4	108.4	▽		
糖尿病予備群	546	62	86.2	71.9	56.9	90.9	▽▽	550	45	74.7	60.2	45.5	79.7	▽▽		
習慣的喫煙者	551	156	158.8	98.3	86.0	112.2	▽	552	46	41.8	110.0	83.4	145.0	▲		

西伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	647	218	179.8	121.3	108.9	135.1	▲▲	722	60	67.5	88.9	69.8	113.3	▽
メタボ予備群	647	110	100.8	109.1	92.1	129.4	▲	722	46	35.8	128.4	97.1	169.7	▲
肥満者	647	379	332.2	114.1	106.9	121.7	▲▲	722	193	170.3	113.3	100.5	127.9	▲▲
高血圧症有病者	638	370	318.2	116.3	108.9	124.2	▲▲	712	297	284.3	104.5	95.8	113.9	▲
高血圧症予備群	638	94	81.5	115.4	95.8	139.1	▲	712	92	87.7	104.9	86.7	127.0	▲
脂質異常症有病者	647	372	363.4	102.4	95.8	109.4	▲	722	420	401.5	104.6	98.3	111.3	▲
糖尿病有病者	640	115	101.9	112.8	95.6	133.1	▲	710	46	57.5	80.0	60.5	105.7	▽
糖尿病予備群	640	63	100.2	62.9	49.7	79.5	▽▽	710	64	100.6	63.6	50.4	80.3	▽▽
習慣的喫煙者	647	219	185.8	117.9	105.8	131.2	▲▲	722	76	51.2	148.5	120.1	183.7	▲▲

熱海市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,139	663	602.0	110.1	103.4	117.3	▲▲	2,504	228	232.6	98.0	86.6	110.9	▽
メタボ予備群	2,139	371	330.8	112.2	102.3	123.0	▲▲	2,504	132	124.3	106.2	90.0	125.3	▲
肥満者	2,139	1,244	1,098.6	113.2	109.2	117.4	▲▲	2,504	628	589.6	106.5	99.6	113.9	▲
高血圧症有病者	2,122	1,110	1,078.6	102.9	98.8	107.2	▲	2,487	1,026	982.1	104.5	99.7	109.5	▲
高血圧症予備群	2,122	250	269.4	92.8	82.6	104.2	▽	2,487	297	306.1	97.0	87.2	107.9	▽
脂質異常症有病者	2,139	1,271	1,203.0	105.7	102.0	109.4	▲▲	2,501	1,430	1,389.1	102.9	99.5	106.5	▲
糖尿病有病者	2,122	375	345.5	108.5	99.1	118.9	▲	2,490	204	199.3	102.3	89.8	116.6	▲
糖尿病予備群	2,122	274	336.7	81.4	72.9	90.9	▽▽	2,490	255	350.9	72.7	64.7	81.6	▽▽
習慣的喫煙者	2,140	671	606.0	110.7	104.0	117.9	▲▲	2,505	331	178.6	185.3	167.7	204.7	▲▲

伊東市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5,792	1,689	1,628.6	103.7	99.7	107.9	▲	6,310	513	585.5	87.6	80.7	95.1	▽▽
メタボ予備群	5,792	960	897.1	107.0	101.0	113.3	▲▲	6,310	336	312.8	107.4	96.9	119.1	▲
肥満者	5,792	3,089	2,975.2	103.8	101.4	106.3	▲▲	6,310	1,408	1,486.5	94.7	90.5	99.1	▽▽
高血圧症有病者	5,742	2,973	2,919.2	101.8	99.4	104.4	▲	6,277	2,462	2,487.8	99.0	96.0	102.0	▽
高血圧症予備群	5,742	800	727.7	109.9	103.2	117.2	▲▲	6,277	795	770.9	103.1	96.7	110.0	▲
脂質異常症有病者	5,796	3,429	3,259.5	105.2	103.0	107.5	▲▲	6,312	3,582	3,490.5	102.6	100.5	104.8	▲▲
糖尿病有病者	5,746	953	930.8	102.4	96.7	108.4	▲	6,256	499	499.6	99.9	91.9	108.5	▽
糖尿病予備群	5,746	755	906.9	83.3	77.9	88.9	▽▽	6,256	689	876.0	78.7	73.3	84.3	▽▽
習慣的喫煙者	5,808	1,835	1,634.8	112.2	108.1	116.5	▲▲	6,332	833	451.3	184.6	173.4	196.5	▲▲

沼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	17,680	4,997	4,657.6	107.3	104.9	109.8	▲▲	16,707	1,483	1,382.9	107.2	102.3	112.4	▲▲
メタボ予備群	17,680	3,082	2,785.7	110.6	107.2	114.1	▲▲	16,707	1,043	838.6	124.4	117.5	131.6	▲▲
肥満者	17,680	9,745	8,994.0	108.4	107.0	109.8	▲▲	16,707	4,323	3,888.4	111.2	108.4	114.0	▲▲
高血圧症有病者	17,531	8,335	8,140.0	102.4	100.9	104.0	▲▲	16,587	5,846	5,764.1	101.4	99.4	103.5	▲
高血圧症予備群	17,531	2,286	2,284.3	100.1	96.4	103.9	▲	16,587	1,890	1,962.3	96.3	92.4	100.4	▽
脂質異常症有病者	17,663	9,972	9,808.7	101.7	100.4	103.0	▲▲	16,680	8,620	8,529.3	101.1	99.6	102.5	▲
糖尿病有病者	17,535	2,607	2,561.3	101.8	98.3	105.4	▲	16,534	1,066	1,152.4	92.5	87.4	97.9	▽▽
糖尿病予備群	17,535	2,255	2,623.6	86.0	82.8	89.2	▽▽	16,534	1,434	2,106.8	68.1	64.8	71.4	▽▽
習慣的喫煙者	17,674	5,990	5,382.5	111.3	109.1	113.5	▲▲	16,707	1,732	1,347.5	128.5	123.1	134.2	▲▲

三島市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9,447	2,658	2,510.0	105.9	102.6	109.3	▲▲	9,572	805	799.3	100.7	94.4	107.5	▲
メタボ予備群	9,447	1,473	1,484.7	99.2	94.7	103.9	▽	9,572	449	478.4	93.9	85.9	102.6	▽
肥満者	9,447	5,027	4,810.6	104.5	102.6	106.5	▲▲	9,572	2,207	2,228.1	99.1	95.5	102.7	▽
高血圧症有病者	9,279	4,411	4,371.2	100.9	98.8	103.1	▲	9,383	3,278	3,317.6	98.8	96.2	101.5	▽
高血圧症予備群	9,279	1,183	1,203.0	98.3	93.3	103.6	▽	9,383	1,092	1,112.9	98.1	92.9	103.7	▽
脂質異常症有病者	9,404	5,484	5,229.7	104.9	103.1	106.6	▲▲	9,463	5,118	4,872.2	105.0	103.1	107.0	▲▲
糖尿病有病者	9,373	1,453	1,389.4	104.6	99.8	109.6	▲	9,497	675	670.0	100.7	93.8	108.2	▲
糖尿病予備群	9,373	1,272	1,411.1	90.1	85.7	94.8	▽▽	9,497	907	1,215.6	74.6	70.2	79.3	▽▽
習慣的喫煙者	9,446	2,806	2,842.1	98.7	95.8	101.8	▽	9,572	805	761.8	105.7	99.0	112.8	▲

裾野市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,213	1,095	1,115.6	98.2	93.3	103.3	▽	4,173	415	354.9	116.9	106.8	128.0	▲▲
メタボ予備群	4,213	806	660.5	122.0	114.7	129.8	▲▲	4,173	256	207.8	123.2	109.5	138.6	▲▲
肥満者	4,213	2,315	2,140.5	108.2	105.3	111.1	▲▲	4,173	1,151	973.0	118.3	112.7	124.2	▲▲
高血圧症有病者	4,171	1,976	1,955.6	101.0	97.9	104.3	▲	4,127	1,557	1,485.9	104.8	100.8	108.9	▲▲
高血圧症予備群	4,171	533	539.2	98.8	91.4	107.0	▽	4,127	487	491.0	99.2	91.3	107.7	▽
脂質異常症有病者	4,210	2,382	2,335.5	102.0	99.3	104.7	▲	4,167	2,272	2,160.7	105.2	102.3	108.1	▲▲
糖尿病有病者	4,186	572	619.1	92.4	85.7	99.7	▽▽	4,136	307	299.3	102.6	92.2	114.2	▲
糖尿病予備群	4,186	455	626.4	72.6	66.6	79.2	▽▽	4,136	359	537.7	66.8	60.5	73.7	▽▽
習慣的喫煙者	4,212	1,390	1,258.1	110.5	105.9	115.3	▲▲	4,173	356	325.4	109.4	99.1	120.8	▲

伊豆市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,935	900	803.2	112.0	106.1	118.3	▲▲	2,968	316	267.0	118.4	106.7	131.3	▲▲
メタボ予備群	2,935	491	456.1	107.7	99.3	116.7	▲	2,968	156	147.8	105.5	90.6	122.8	▲
肥満者	2,935	1,602	1,498.6	106.9	103.4	110.5	▲▲	2,968	816	696.2	117.2	110.6	124.2	▲▲
高血圧症有病者	2,908	1,652	1,425.8	115.9	112.3	119.6	▲▲	2,957	1,326	1,123.6	118.0	113.4	122.8	▲▲
高血圧症予備群	2,908	358	371.8	96.3	87.4	106.0	▽	2,957	346	360.4	96.0	87.0	106.0	▽
脂質異常症有病者	2,934	1,687	1,639.4	102.9	99.8	106.1	▲	2,967	1,675	1,611.0	104.0	100.8	107.3	▲▲
糖尿病有病者	2,930	488	456.4	106.9	98.6	115.9	▲	2,962	308	227.2	135.6	122.0	150.6	▲▲
糖尿病予備群	2,930	425	452.0	94.0	86.1	102.6	▽	2,962	377	405.7	92.9	84.6	102.1	▽
習慣的喫煙者	2,935	967	850.2	113.7	108.0	119.7	▲▲	2,971	319	220.1	144.9	130.8	160.7	▲▲

伊豆の国市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,559	1,328	1,203.2	110.4	105.5	115.5	▲▲	4,632	425	390.3	108.9	99.5	119.1	▲
メタボ予備群	4,559	766	717.4	106.8	100.1	113.8	▲▲	4,632	231	231.3	99.9	88.1	113.1	▽
肥満者	4,557	2,559	2,317.6	110.4	107.6	113.3	▲▲	4,632	1,156	1,079.6	107.1	101.9	112.5	▲▲
高血圧症有病者	4,490	2,280	2,091.0	109.0	106.0	112.2	▲▲	4,550	1,794	1,623.0	110.5	106.7	114.6	▲▲
高血圧症予備群	4,490	524	583.2	89.8	82.9	97.3	▽▽	4,550	499	539.9	92.4	85.1	100.3	▽
脂質異常症有病者	4,555	2,715	2,528.3	107.4	104.9	110.0	▲▲	4,614	2,515	2,382.0	105.6	102.9	108.4	▲▲
糖尿病有病者	4,540	694	666.0	104.2	97.4	111.5	▲	4,620	320	329.5	97.1	87.4	107.9	▽
糖尿病予備群	4,540	563	678.8	82.9	76.8	89.6	▽▽	4,620	521	595.0	87.6	80.8	94.9	▽▽
習慣的喫煙者	4,559	1,591	1,377.4	115.5	111.1	120.1	▲▲	4,632	534	365.4	146.2	135.1	158.2	▲▲

函南町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,171	837	816.7	102.5	96.7	108.6	▲	2,885	225	233.7	96.3	85.0	109.1	▽
メタボ予備群	3,171	555	501.9	110.6	102.6	119.2	▲▲	2,885	149	145.1	102.7	87.9	120.0	▲
肥満者	3,171	1,707	1,606.7	106.2	102.9	109.7	▲▲	2,885	716	670.1	106.9	100.3	113.8	▲▲
高血圧症有病者	3,106	1,393	1,403.0	99.3	95.5	103.2	▽	2,837	988	966.2	102.3	97.3	107.5	▲
高血圧症予備群	3,106	436	407.3	107.0	98.2	116.7	▲	2,837	316	333.2	94.8	85.5	105.2	▽
脂質異常症有病者	3,156	1,760	1,743.5	100.9	97.9	104.1	▲	2,865	1,457	1,443.9	100.9	97.4	104.6	▲
糖尿病有病者	3,145	476	443.3	107.4	98.9	116.6	▲	2,869	196	194.5	100.8	88.1	115.3	▲
糖尿病予備群	3,145	437	461.5	94.7	86.8	103.3	▽	2,869	263	358.2	73.4	65.5	82.4	▽▽
習慣的喫煙者	3,168	1,093	983.6	111.1	105.9	116.6	▲▲	2,887	303	237.4	127.6	114.8	141.9	▲▲

清水町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,033	898	783.8	114.6	108.5	121.0	▲▲	2,867	258	230.3	112.0	99.8	125.8	▲
メタボ予備群	3,033	506	480.5	105.3	97.3	114.0	▲	2,867	198	144.3	137.2	120.0	156.8	▲▲
肥満者	3,033	1,684	1,539.4	109.4	106.0	112.9	▲▲	2,867	772	665.2	116.0	109.3	123.2	▲▲
高血圧症有病者	2,992	1,410	1,352.6	104.2	100.4	108.3	▲▲	2,825	975	949.9	102.6	97.6	108.0	▲
高血圧症予備群	2,992	404	392.9	102.8	94.0	112.5	▲	2,825	330	330.5	99.9	90.3	110.5	▽
脂質異常症有病者	3,029	1,758	1,676.6	104.9	101.7	108.1	▲▲	2,852	1,469	1,429.7	102.7	99.2	106.5	▲
糖尿病有病者	3,014	439	426.0	103.0	94.5	112.3	▲	2,851	186	191.2	97.3	84.7	111.7	▽
糖尿病予備群	3,014	387	443.4	87.3	79.6	95.7	▽▽	2,851	259	353.5	73.3	65.3	82.3	▽▽
習慣的喫煙者	3,032	1,035	943.6	109.7	104.4	115.2	▲▲	2,867	293	237.3	123.5	110.8	137.5	▲▲

長泉町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,568	913	918.9	99.4	94.0	105.0	▽	3,587	269	274.8	97.9	87.3	109.7	▽
メタボ予備群	3,568	604	564.4	107.0	99.6	115.0	▲	3,587	188	180.1	104.4	90.9	119.9	▲
肥満者	3,568	1,873	1,807.3	103.6	100.5	106.9	▲▲	3,587	828	827.7	100.0	94.3	106.2	▲
高血圧症有病者	3,528	1,594	1,591.3	100.2	96.6	103.9	▲	3,535	1,120	1,132.9	98.9	94.2	103.7	▽
高血圧症予備群	3,528	441	462.2	95.4	87.5	104.1	▽	3,535	376	406.2	92.6	84.2	101.8	▽
脂質異常症有病者	3,556	1,979	1,964.4	100.7	97.8	103.7	▲	3,569	1,821	1,721.7	105.8	102.4	109.2	▲▲
糖尿病有病者	3,525	452	498.0	90.8	83.3	98.9	▽▽	3,549	200	226.1	88.5	77.4	101.2	▽
糖尿病予備群	3,525	438	516.8	84.7	77.7	92.5	▽▽	3,549	267	421.2	63.4	56.5	71.1	▽▽
習慣的喫煙者	3,565	1,140	1,103.6	103.3	98.5	108.3	▲	3,587	287	306.7	93.6	83.8	104.5	▽

御殿場市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	6,971	1,986	1,864.9	106.5	102.6	110.5	▲▲	7,179	688	608.5	113.1	105.4	121.3	▲▲
メタボ予備群	6,971	1,169	1,090.2	107.2	101.8	112.9	▲▲	7,179	380	357.5	106.3	96.5	117.1	▲
肥満者	6,971	3,776	3,547.5	106.4	104.2	108.7	▲▲	7,179	1,911	1,672.4	114.3	110.0	118.7	▲▲
高血圧症有病者	6,928	3,376	3,292.2	102.5	100.1	105.0	▲▲	7,130	2,670	2,550.1	104.7	101.6	107.9	▲▲
高血圧症予備群	6,928	906	893.2	101.4	95.5	107.7	▲	7,130	915	848.1	107.9	101.6	114.5	▲▲
脂質異常症有病者	6,962	4,099	3,871.7	105.9	103.8	107.9	▲▲	7,165	3,928	3,710.8	105.9	103.7	108.1	▲▲
糖尿病有病者	6,929	1,069	1,042.1	102.6	97.1	108.3	▲	7,151	559	513.3	108.9	100.7	117.8	▲▲
糖尿病予備群	6,929	835	1,047.4	79.7	74.8	84.9	▽▽	7,151	699	925.8	75.5	70.4	81.0	▽▽
習慣的喫煙者	6,970	2,445	2,064.1	118.5	114.8	122.3	▲▲	7,179	751	561.3	133.8	125.2	143.0	▲▲

小山町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,428	407	394.3	103.2	95.1	112.0	▲	1,522	169	136.3	124.0	107.6	142.9	▲▲
メタボ予備群	1,428	244	221.2	110.3	98.4	123.6	▲	1,522	97	75.2	129.0	106.4	156.3	▲▲
肥満者	1,428	770	729.7	105.5	100.6	110.7	▲▲	1,521	449	355.8	126.2	116.8	136.4	▲▲
高血圧症有病者	1,418	718	704.0	102.0	96.9	107.4	▲	1,513	622	574.4	108.3	102.0	115.0	▲▲
高血圧症予備群	1,418	198	180.0	110.0	96.7	125.1	▲	1,513	184	183.1	100.5	87.8	115.0	▲
脂質異常症有病者	1,427	841	797.9	105.4	100.9	110.1	▲▲	1,518	925	817.2	113.2	108.7	117.8	▲▲
糖尿病有病者	1,419	226	224.8	100.6	89.2	113.3	▲	1,519	130	116.6	111.5	94.7	131.4	▲
糖尿病予備群	1,419	166	219.7	75.5	65.5	87.1	▽▽	1,519	154	206.3	74.7	64.3	86.7	▽▽
習慣的喫煙者	1,428	485	404.8	119.8	111.5	128.8	▲▲	1,522	135	111.6	121.0	103.0	142.0	▲▲

富士宮市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	12,474	3,351	3,248.9	103.1	100.3	106.1	▲▲	11,536	1,049	939.2	111.7	105.6	118.2	▲▲
メタボ予備群	12,474	2,133	1,968.2	108.4	104.3	112.6	▲▲	11,536	634	578.0	109.7	101.8	118.1	▲▲
肥満者	12,474	6,685	6,330.3	105.6	103.9	107.3	▲▲	11,536	2,988	2,678.1	111.6	108.2	115.0	▲▲
高血圧症有病者	12,286	5,870	5,624.0	104.4	102.5	106.3	▲▲	11,320	4,115	3,879.3	106.1	103.6	108.6	▲▲
高血圧症予備群	12,286	1,591	1,604.1	99.2	94.8	103.8	▽	11,320	1,385	1,331.1	104.0	99.1	109.2	▲
脂質異常症有病者	12,468	7,107	6,903.2	103.0	101.4	104.5	▲▲	11,534	6,021	5,814.7	103.5	101.8	105.3	▲▲
糖尿病有病者	12,356	1,736	1,774.9	97.8	93.7	102.1	▽	11,448	811	781.6	103.8	97.2	110.7	▲
糖尿病予備群	12,356	1,573	1,829.0	86.0	82.2	90.0	▽▽	11,448	1,197	1,433.1	83.5	79.2	88.1	▽▽
習慣的喫煙者	12,474	4,335	3,827.2	113.3	110.6	116.0	▲▲	11,537	1,264	940.2	134.4	127.8	141.4	▲▲

富士市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	23,654	6,195	6,121.6	101.2	99.1	103.3	▲	20,244	1,636	1,591.4	102.8	98.3	107.5	▲
メタボ予備群	23,654	3,994	3,744.2	106.7	103.8	109.6	▲▲	20,244	1,052	1,021.4	103.0	97.3	109.0	▲
肥満者	23,654	12,579	12,003.6	104.8	103.6	106.0	▲▲	20,242	5,018	4,686.4	107.1	104.6	109.6	▲▲
高血圧症有病者	23,353	10,806	10,576.6	102.2	100.8	103.5	▲▲	19,954	6,599	6,541.8	100.9	99.0	102.8	▲
高血圧症予備群	23,353	2,875	3,064.7	93.8	90.8	97.0	▽▽	19,954	2,237	2,323.8	96.3	92.7	100.0	▽▽
脂質異常症有病者	23,640	13,624	13,083.0	104.1	103.0	105.2	▲▲	20,240	10,372	9,997.0	103.8	102.4	105.1	▲▲
糖尿病有病者	23,419	3,222	3,321.0	97.0	94.1	100.1	▽	20,132	1,204	1,310.9	91.8	87.1	96.9	▽▽
糖尿病予備群	23,419	2,899	3,454.0	83.9	81.2	86.8	▽▽	20,132	1,841	2,452.1	75.1	72.0	78.3	▽▽
習慣的喫煙者	23,654	8,421	7,350.1	114.6	112.7	116.5	▲▲	20,246	2,255	1,710.4	131.8	127.0	136.8	▲▲

島田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10,554	2,589	2,752.2	94.1	91.0	97.2	▽▽	9,149	619	738.7	83.8	77.7	90.3	▽▽
メタボ予備群	10,554	1,451	1,663.6	87.2	83.2	91.4	▽▽	9,149	388	459.0	84.5	76.8	93.1	▽▽
肥満者	10,554	4,882	5,355.6	91.2	89.3	93.0	▽▽	9,149	1,798	2,120.9	84.8	81.4	88.3	▽▽
高血圧症有病者	10,474	4,704	4,800.6	98.0	96.0	100.1	▽	9,109	3,013	3,069.6	98.2	95.4	101.0	▽
高血圧症予備群	10,474	1,548	1,367.6	113.2	108.2	118.4	▲▲	9,109	1,182	1,068.2	110.7	105.0	116.6	▲▲
脂質異常症有病者	10,550	5,566	5,842.9	95.3	93.6	97.0	▽▽	9,149	4,396	4,596.3	95.6	93.7	97.7	▽▽
糖尿病有病者	10,466	1,472	1,506.2	97.7	93.3	102.4	▽	9,105	573	613.4	93.4	86.4	101.0	▽
糖尿病予備群	10,466	1,614	1,551.6	104.0	99.5	108.7	▲	9,105	1,375	1,133.6	121.3	115.6	127.2	▲▲
習慣的喫煙者	10,555	3,138	3,238.6	96.9	94.1	99.7	▽▽	9,153	537	751.8	71.4	65.9	77.5	▽▽

焼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	14,759	3,667	3,809.3	96.3	93.7	98.9	▽▽	12,717	972	1,008.6	96.4	90.8	102.3	▽
メタボ予備群	14,759	2,364	2,336.2	101.2	97.6	104.9	▲	12,717	640	639.6	100.1	92.9	107.7	▲
肥満者	14,759	7,316	7,484.0	97.8	96.2	99.3	▽▽	12,717	2,871	2,944.9	97.5	94.5	100.6	▽
高血圧症有病者	14,647	6,556	6,608.1	99.2	97.5	101.0	▽	12,639	4,163	4,179.9	99.6	97.2	102.1	▽
高血圧症予備群	14,647	2,028	1,923.5	105.4	101.3	109.7	▲▲	12,639	1,468	1,473.4	99.6	95.0	104.4	▽
脂質異常症有病者	14,753	7,750	8,158.5	95.0	93.6	96.4	▽▽	12,722	5,963	6,311.8	94.5	92.8	96.2	▽▽
糖尿病有病者	14,591	2,113	2,062.1	102.5	98.6	106.5	▲	12,612	852	833.1	102.3	96.0	109.0	▲
糖尿病予備群	14,591	2,142	2,147.8	99.7	96.0	103.6	▽	12,612	1,974	1,547.8	127.5	122.6	132.7	▲▲
習慣的喫煙者	14,762	4,760	4,594.8	103.6	101.3	106.0	▲▲	12,722	990	1,063.0	93.1	87.8	98.8	▽▽

藤枝市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	15,705	3,592	4,083.7	88.0	85.5	90.5	▽▽	14,966	748	1,206.3	62.0	57.9	66.4	▽▽
メタボ予備群	15,705	2,365	2,475.1	95.6	92.1	99.1	▽▽	14,966	446	749.2	59.5	54.4	65.1	▽▽
肥満者	15,705	7,312	7,961.5	91.8	90.3	93.4	▽▽	14,966	2,811	3,467.9	81.1	78.5	83.7	▽▽
高血圧症有病者	15,536	6,868	7,101.8	96.7	95.1	98.4	▽▽	14,791	4,989	4,997.4	99.8	97.7	102.1	▽
高血圧症予備群	15,536	2,078	2,026.7	102.5	98.6	106.6	▲	14,791	1,699	1,731.5	98.1	93.9	102.5	▽
脂質異常症有病者	15,698	8,426	8,684.2	97.0	95.7	98.4	▽▽	14,965	7,134	7,491.8	95.2	93.7	96.8	▽▽
糖尿病有病者	15,501	2,031	2,225.7	91.3	87.7	94.9	▽▽	14,825	888	1,000.3	88.8	83.4	94.5	▽▽
糖尿病予備群	15,501	2,021	2,290.4	88.2	84.8	91.8	▽▽	14,825	1,467	1,840.3	79.7	76.0	83.6	▽▽
習慣的喫煙者	15,706	4,476	4,810.2	93.1	90.8	95.3	▽▽	14,970	927	1,227.4	75.5	71.0	80.3	▽▽

牧之原市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,269	1,124	1,133.0	99.2	94.4	104.3	▽	3,820	292	319.0	91.5	82.0	102.1	▽
メタボ予備群	4,269	637	669.9	95.1	88.5	102.1	▽	3,820	165	190.8	86.5	74.5	100.3	▽
肥満者	4,269	2,153	2,171.8	99.1	96.2	102.1	▽	3,820	825	887.8	92.9	87.5	98.7	▽▽
高血圧症有病者	4,249	2,019	1,995.8	101.2	98.0	104.4	▲	3,795	1,369	1,333.0	102.7	98.5	107.1	▲
高血圧症予備群	4,249	608	551.2	110.3	102.5	118.7	▲▲	3,795	496	451.5	109.9	101.3	119.2	▲▲
脂質異常症有病者	4,286	2,344	2,382.3	98.4	95.8	101.1	▽	3,836	1,955	1,975.9	98.9	95.9	102.0	▽
糖尿病有病者	4,246	614	630.1	97.4	90.6	104.8	▽	3,806	271	267.2	101.4	90.5	113.7	▲
糖尿病予備群	4,246	691	639.9	108.0	100.9	115.6	▲▲	3,806	693	488.6	141.8	132.7	151.6	▲▲
習慣的喫煙者	4,287	1,399	1,290.3	108.4	103.9	113.2	▲▲	3,838	287	304.6	94.2	84.4	105.3	▽

吉田町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3,060	823	792.0	103.9	98.0	110.1	▲	2,650	190	210.1	90.4	78.9	103.6	▽
メタボ予備群	3,060	455	483.0	94.2	86.6	102.5	▽	2,650	123	133.0	92.5	77.9	109.8	▽
肥満者	3,060	1,534	1,550.7	98.9	95.5	102.5	▽	2,650	623	613.2	101.6	94.9	108.8	▲
高血圧症有病者	3,034	1,382	1,376.3	100.4	96.6	104.4	▲	2,635	830	873.0	95.1	89.9	100.6	▽
高血圧症予備群	3,034	431	397.2	108.5	99.5	118.4	▲	2,635	363	307.3	118.1	107.4	129.9	▲▲
脂質異常症有病者	3,060	1,674	1,692.3	98.9	95.8	102.1	▽	2,653	1,320	1,314.6	100.4	96.7	104.3	▲
糖尿病有病者	3,022	503	430.1	116.9	108.0	126.6	▲▲	2,626	170	173.5	98.0	84.8	113.2	▽
糖尿病予備群	3,022	460	445.6	103.2	94.9	112.3	▲	2,626	403	322.1	125.1	114.4	136.8	▲▲
習慣的喫煙者	3,062	1,033	946.7	109.1	103.9	114.6	▲▲	2,654	218	220.9	98.7	86.9	112.0	▽

川根本町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	699	205	195.8	104.7	93.3	117.5	▲	706	62	63.6	97.4	76.8	123.5	▽		
メタボ予備群	699	84	108.1	77.7	63.6	94.9	▽▽	706	34	35.2	96.6	69.6	134.0	▽		
肥満者	699	339	358.5	94.6	87.6	102.1	▽	706	164	165.5	99.1	86.6	113.3	▽		
高血圧症有病者	697	393	351.6	111.8	104.7	119.3	▲▲	701	302	266.5	113.3	104.1	123.4	▲▲		
高血圧症予備群	697	85	88.6	95.9	78.6	117.1	▽	701	84	85.5	98.2	80.4	120.0	▽		
脂質異常症有病者	699	385	392.8	98.0	91.7	104.8	▽	706	363	384.9	94.3	87.8	101.3	▽		
糖尿病有病者	690	109	111.5	97.8	82.3	116.1	▽	699	66	53.8	122.8	97.6	154.4	▲		
糖尿病予備群	690	146	109.0	134.0	116.0	154.7	▲▲	699	159	96.2	165.3	144.3	189.5	▲▲		
習慣的喫煙者	699	210	198.6	105.7	94.4	118.4	▲	706	30	52.2	57.5	40.5	81.6	▽▽		

磐田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	17,823	4,458	4,594.2	97.0	94.7	99.5	▽▽	15,899	1,262	1,257.5	100.4	95.3	105.7	▲
メタボ予備群	17,823	2,659	2,815.8	94.4	91.3	97.7	▽▽	15,899	787	796.7	98.8	92.4	105.6	▽
肥満者	17,823	8,694	9,025.0	96.3	94.9	97.8	▽▽	15,897	3,593	3,676.6	97.7	95.0	100.5	▽
高血圧症有病者	17,592	7,704	7,941.9	97.0	95.4	98.6	▽▽	15,677	5,021	5,196.0	96.6	94.5	98.8	▽▽
高血圧症予備群	17,592	2,289	2,302.5	99.4	95.8	103.2	▽	15,677	1,964	1,825.1	107.6	103.4	112.0	▲▲
脂質異常症有病者	17,824	9,564	9,844.3	97.2	95.9	98.5	▽▽	15,900	7,593	7,852.9	96.7	95.2	98.2	▽▽
糖尿病有病者	17,654	2,548	2,496.7	102.1	98.5	105.7	▲	15,739	1,122	1,038.4	108.1	102.3	114.2	▲▲
糖尿病予備群	17,654	2,881	2,588.6	111.3	107.7	115.0	▲▲	15,739	2,301	1,922.3	119.7	115.4	124.2	▲▲
習慣的喫煙者	17,826	5,320	5,509.8	96.6	94.5	98.7	▽▽	15,907	1,053	1,325.3	79.5	75.0	84.1	▽▽

掛川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10,913	2,581	2,855.9	90.4	87.4	93.4	▽▽	10,177	772	834.6	92.5	86.5	98.9	▽▽
メタボ予備群	10,913	1,647	1,713.3	96.1	92.0	100.4	▽	10,177	478	508.3	94.0	86.3	102.5	▽
肥満者	10,912	5,139	5,530.5	92.9	91.1	94.8	▽▽	10,176	2,177	2,360.7	92.2	88.9	95.7	▽▽
高血圧症有病者	10,879	4,770	5,017.1	95.1	93.1	97.1	▽▽	10,131	3,333	3,481.2	95.7	93.2	98.4	▽▽
高血圧症予備群	10,879	1,492	1,412.5	105.6	100.8	110.6	▲▲	10,131	1,370	1,193.3	114.8	109.4	120.5	▲▲
脂質異常症有病者	10,916	5,788	6,041.4	95.8	94.2	97.5	▽▽	10,209	4,926	5,171.4	95.3	93.4	97.2	▽▽
糖尿病有病者	10,820	1,430	1,572.8	90.9	86.7	95.4	▽▽	10,060	637	693.5	91.9	85.3	98.9	▽▽
糖尿病予備群	10,820	1,675	1,604.5	104.4	100.0	109.0	▲	10,060	1,296	1,270.0	102.1	97.1	107.3	▲
習慣的喫煙者	10,921	3,162	3,302.9	95.7	93.0	98.5	▽▽	10,212	655	823.8	79.5	73.9	85.5	▽▽

袋井市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8,691	2,130	2,251.4	94.6	91.2	98.1	▽▽	7,861	632	623.0	101.4	94.2	109.2	▲
メタボ予備群	8,691	1,302	1,369.3	95.1	90.5	99.9	▽▽	7,861	411	393.3	104.5	95.2	114.7	▲
肥満者	8,691	4,150	4,400.4	94.3	92.3	96.4	▽▽	7,861	1,826	1,817.7	100.5	96.5	104.5	▲
高血圧症有病者	8,647	3,762	3,929.9	95.7	93.5	98.0	▽▽	7,813	2,538	2,587.5	98.1	95.0	101.2	▽
高血圧症予備群	8,647	1,220	1,127.4	108.2	102.8	113.9	▲▲	7,813	1,054	908.4	116.0	109.8	122.6	▲▲
脂質異常症有病者	8,691	4,544	4,801.0	94.6	92.8	96.5	▽▽	7,872	3,715	3,887.6	95.6	93.4	97.8	▽▽
糖尿病有病者	8,614	1,271	1,230.6	103.3	98.2	108.6	▲	7,754	564	513.9	109.7	101.5	118.7	▲▲
糖尿病予備群	8,614	1,509	1,266.0	119.2	113.9	124.7	▲▲	7,754	1,216	949.8	128.0	121.7	134.7	▲▲
習慣的喫煙者	8,695	2,631	2,658.9	98.9	95.9	102.1	▽	7,875	602	653.7	92.1	85.4	99.4	▽▽

御前崎市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,804	755	746.3	101.2	95.2	107.5	▲	2,705	231	228.6	101.1	89.4	114.3	▲
メタボ予備群	2,804	419	439.9	95.2	87.2	104.0	▽	2,705	145	135.3	107.2	91.6	125.5	▲
肥満者	2,804	1,430	1,427.0	100.2	96.7	103.9	▲	2,705	650	630.1	103.2	96.5	110.3	▲
高血圧症有病者	2,794	1,304	1,317.6	99.0	95.1	102.9	▽	2,683	1,019	952.5	107.0	101.9	112.3	▲▲
高血圧症予備群	2,794	389	361.6	107.6	98.1	117.9	▲	2,683	385	320.3	120.2	109.6	131.8	▲▲
脂質異常症有病者	2,805	1,547	1,559.8	99.2	95.9	102.5	▽	2,705	1,376	1,403.7	98.0	94.5	101.7	▽
糖尿病有病者	2,789	408	414.8	98.4	90.0	107.5	▽	2,694	178	192.0	92.7	80.5	106.8	▽
糖尿病予備群	2,789	489	419.9	116.5	107.5	126.2	▲▲	2,694	403	349.7	115.2	105.4	126.0	▲▲
習慣的喫煙者	2,805	936	838.4	111.6	106.0	117.6	▲▲	2,705	232	213.4	108.7	96.2	122.9	▲

菊川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4,487	1,114	1,173.6	94.9	90.2	99.8	▽▽	4,345	349	352.3	99.1	89.6	109.5	▽
メタボ予備群	4,487	666	703.6	94.7	88.3	101.5	▽	4,345	210	216.2	97.1	85.2	110.7	▽
肥満者	4,487	2,131	2,272.2	93.8	91.0	96.7	▽▽	4,345	1,012	1,005.8	100.6	95.4	106.2	▲
高血圧症有病者	4,456	1,989	2,058.6	96.6	93.5	99.8	▽▽	4,308	1,426	1,468.8	97.1	93.1	101.3	▽
高血圧症予備群	4,456	624	577.1	108.1	100.6	116.2	▲▲	4,308	558	505.0	110.5	102.3	119.3	▲▲
脂質異常症有病者	4,487	2,303	2,481.1	92.8	90.2	95.5	▽▽	4,351	2,116	2,180.7	97.0	94.1	100.0	▽
糖尿病有病者	4,456	596	648.1	92.0	85.4	99.1	▽▽	4,324	278	294.5	94.4	84.3	105.7	▽
糖尿病予備群	4,456	666	658.9	101.1	94.3	108.4	▲	4,324	525	538.6	97.5	90.0	105.6	▽
習慣的喫煙者	4,488	1,334	1,348.9	98.9	94.6	103.4	▽	4,352	270	352.3	76.6	68.3	86.0	▽▽

森町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1,813	427	494.4	86.4	79.5	93.8	▽▽	1,771	135	150.2	89.9	76.5	105.6	▽
メタボ予備群	1,813	238	280.9	84.7	75.3	95.3	▽▽	1,771	60	88.1	68.1	53.1	87.3	▽▽
肥満者	1,813	815	923.8	88.2	83.8	92.8	▽▽	1,771	380	411.5	92.3	84.5	100.9	▽
高血圧症有病者	1,805	895	881.3	101.6	97.0	106.4	▲	1,763	638	626.4	101.8	95.7	108.3	▲
高血圧症予備群	1,805	228	230.9	98.8	87.5	111.5	▽	1,763	231	210.6	109.7	97.3	123.7	▲
脂質異常症有病者	1,814	988	1,012.5	97.6	93.6	101.8	▽	1,774	934	922.9	101.2	96.8	105.8	▲
糖尿病有病者	1,794	265	278.9	95.0	85.0	106.1	▽	1,752	148	125.2	118.2	101.3	137.8	▲▲
糖尿病予備群	1,794	369	276.3	133.6	122.0	146.2	▲▲	1,752	355	228.0	155.7	142.0	170.8	▲▲
習慣的喫煙者	1,814	566	527.4	107.3	100.3	114.9	▲▲	1,774	116	138.2	83.9	70.4	100.0	▽

湖西市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5,236	1,278	1,376.1	92.9	88.6	97.4	▽▽	4,951	410	410.4	99.9	91.1	109.5	▽
メタボ予備群	5,236	814	824.3	98.8	92.8	105.1	▽	4,951	244	247.8	98.5	87.2	111.2	▽
肥満者	5,236	2,559	2,660.2	96.2	93.6	98.9	▽▽	4,951	1,222	1,151.7	106.1	101.1	111.4	▲▲
高血圧症有病者	5,223	2,305	2,418.7	95.3	92.5	98.2	▽▽	4,939	1,722	1,719.2	100.2	96.4	104.0	▲
高血圧症予備群	5,223	723	679.5	106.4	99.5	113.8	▲	4,939	608	583.6	104.2	96.8	112.2	▲
脂質異常症有病者	5,236	2,671	2,903.8	92.0	89.6	94.4	▽▽	4,953	2,401	2,529.5	94.9	92.3	97.7	▽▽
糖尿病有病者	5,202	774	758.3	102.1	95.7	108.9	▲	4,926	380	343.8	110.5	100.4	121.6	▲▲
糖尿病予備群	5,202	896	775.1	115.6	109.0	122.6	▲▲	4,926	685	626.6	109.3	102.0	117.1	▲▲
習慣的喫煙者	5,236	1,534	1,587.4	96.6	92.7	100.8	▽	4,954	323	397.3	81.3	73.2	90.3	▽▽

静岡市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	66,743	17,766	17,376.6	102.2	100.7	103.8	▲▲	59,954	4,933	4,720.3	104.5	101.6	107.5	▲▲
メタボ予備群	66,743	10,400	10,549.9	98.6	96.7	100.5	▽	59,954	2,931	3,024.8	96.9	93.4	100.5	▽
肥満者	66,740	34,153	33,898.0	100.8	99.7	101.8	▲	59,951	13,797	13,881.4	99.4	97.7	101.1	▽
高血圧症有病者	66,024	31,154	30,147.9	103.3	102.2	104.5	▲▲	58,661	19,458	19,291.1	100.9	99.5	102.3	▲
高血圧症予備群	66,024	8,376	8,647.1	96.9	94.8	99.0	▽▽	58,661	6,437	6,838.2	94.1	91.8	96.5	▽▽
脂質異常症有病者	66,731	38,181	36,971.9	103.3	102.2	104.3	▲▲	59,959	30,338	29,652.0	102.3	101.2	103.5	▲▲
糖尿病有病者	65,865	9,437	9,442.4	99.9	97.9	102.0	▽	58,831	3,729	3,851.3	96.8	93.7	100.0	▽▽
糖尿病予備群	65,865	8,857	9,769.1	90.7	88.8	92.6	▽▽	58,831	6,564	7,191.4	91.3	89.1	93.5	▽▽
習慣的喫煙者	66,748	19,735	20,611.2	95.7	94.4	97.1	▽▽	59,978	4,988	5,061.0	98.6	95.8	101.3	▽

静岡市葵区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	24,061	6,237	6,261.6	99.6	97.6	101.7	▽	21,732	1,697	1,709.2	99.3	95.0	103.8	▽
メタボ予備群	24,061	3,709	3,801.5	97.6	94.8	100.4	▽	21,732	1,041	1,095.9	95.0	89.7	100.6	▽
肥満者	24,059	12,103	12,215.7	99.1	97.9	100.3	▽	21,731	4,838	5,029.2	96.2	93.9	98.5	▽▽
高血圧症有病者	23,752	11,251	10,845.6	103.7	102.4	105.1	▲▲	21,223	6,946	6,971.7	99.6	97.8	101.5	▽
高血圧症予備群	23,752	3,038	3,109.7	97.7	94.6	100.9	▽	21,223	2,451	2,473.9	99.1	95.6	102.7	▽
脂質異常症有病者	24,060	13,777	13,327.3	103.4	102.3	104.5	▲▲	21,735	10,919	10,744.3	101.6	100.3	102.9	▲▲
糖尿病有病者	23,704	3,346	3,397.9	98.5	95.5	101.5	▽	21,248	1,241	1,390.2	89.3	84.7	94.1	▽▽
糖尿病予備群	23,704	3,059	3,514.4	87.0	84.3	89.9	▽▽	21,248	2,255	2,597.6	86.8	83.6	90.2	▽▽
習慣的喫煙者	24,064	6,680	7,428.7	89.9	88.2	91.7	▽▽	21,740	1,623	1,834.2	88.5	84.6	92.6	▽▽

静岡市駿河区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	19,099	5,029	4,947.3	101.7	99.3	104.0	▲	17,160	1,290	1,332.9	96.8	92.0	101.9	▽
メタボ予備群	19,099	2,892	3,023.4	95.7	92.6	98.8	▽▽	17,160	793	866.5	91.5	85.7	97.8	▽▽
肥満者	19,099	9,602	9,694.8	99.0	97.7	100.4	▽	17,159	3,778	3,967.8	95.2	92.6	97.9	▽▽
高血圧症有病者	18,920	8,852	8,574.6	103.2	101.7	104.8	▲▲	16,840	5,421	5,447.8	99.5	97.4	101.7	▽
高血圧症予備群	18,920	2,419	2,483.6	97.4	93.9	101.0	▽	16,840	1,757	1,953.1	90.0	86.2	93.9	▽▽
脂質異常症有病者	19,095	10,896	10,569.8	103.1	101.9	104.3	▲▲	17,166	8,599	8,407.0	102.3	100.8	103.8	▲▲
糖尿病有病者	18,805	2,726	2,673.5	102.0	98.6	105.5	▲	16,795	1,068	1,081.8	98.7	93.3	104.5	▽
糖尿病予備群	18,805	2,576	2,778.1	92.7	89.5	96.0	▽▽	16,795	1,903	2,029.1	93.8	90.0	97.7	▽▽
習慣的喫煙者	19,101	5,666	5,933.0	95.5	93.5	97.6	▽▽	17,174	1,424	1,465.1	97.2	92.6	102.0	▽

静岡市清水区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	23,583	6,500	6,167.6	105.4	103.3	107.5	▲▲	21,062	1,946	1,678.2	116.0	111.3	120.8	▲▲
メタボ予備群	23,583	3,799	3,725.0	102.0	99.2	104.9	▲	21,062	1,097	1,062.5	103.2	97.7	109.2	▲
肥満者	23,582	12,448	11,987.5	103.8	102.6	105.1	▲▲	21,061	5,181	4,884.4	106.1	103.7	108.5	▲▲
高血圧症有病者	23,352	11,051	10,727.6	103.0	101.7	104.4	▲▲	20,598	7,091	6,871.5	103.2	101.3	105.1	▲▲
高血圧症予備群	23,352	2,919	3,053.8	95.6	92.5	98.8	▽▽	20,598	2,229	2,411.2	92.4	89.0	96.0	▽▽
脂質異常症有病者	23,576	13,508	13,074.8	103.3	102.2	104.4	▲▲	21,058	10,820	10,500.7	103.0	101.7	104.4	▲▲
糖尿病有病者	23,356	3,365	3,370.9	99.8	96.9	102.9	▽	20,788	1,420	1,379.3	103.0	98.1	108.1	▲
糖尿病予備群	23,356	3,222	3,476.7	92.7	89.8	95.6	▽▽	20,788	2,406	2,564.8	93.8	90.5	97.3	▽▽
習慣的喫煙者	23,583	7,389	7,249.5	101.9	100.1	103.8	▲▲	21,064	1,941	1,761.8	110.2	105.8	114.8	▲▲

浜松市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	78,608	19,817	20,082.3	98.7	97.3	100.1	▽	68,345	5,307	5,234.7	101.4	98.7	104.1	▲
メタボ予備群	78,608	12,019	12,467.1	96.4	94.7	98.1	▽▽	68,345	3,511	3,447.8	101.8	98.5	105.3	▲
肥満者	78,606	38,679	39,789.4	97.2	96.2	98.2	▽▽	68,343	15,200	15,775.6	96.4	94.8	97.9	▽▽
高血圧症有病者	78,123	33,301	34,764.0	95.8	94.8	96.8	▽▽	67,838	20,645	21,582.1	95.7	94.4	97.0	▽▽
高血圧症予備群	78,123	10,003	10,289.7	97.2	95.3	99.1	▽▽	67,838	7,579	7,819.3	96.9	94.8	99.1	▽▽
脂質異常症有病者	78,602	42,243	43,366.4	97.4	96.5	98.3	▽▽	68,349	32,371	33,102.6	97.8	96.7	98.9	▽▽
糖尿病有病者	76,942	10,852	10,705.3	101.4	99.5	103.3	▲	66,383	4,440	4,213.0	105.4	102.3	108.5	▲▲
糖尿病予備群	76,942	13,842	11,224.8	123.3	121.3	125.4	▲▲	66,383	10,261	7,919.5	129.6	127.1	132.1	▲▲
習慣的喫煙者	78,613	22,158	24,671.6	89.8	88.6	91.0	▽▽	68,364	4,629	5,882.6	78.7	76.4	81.0	▽▽

浜松市中央区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	58,577	14,928	14,920.5	100.0	98.8	101.3	▲	51,043	3,968	3,870.2	102.5	99.7	105.4	▲
メタボ予備群	58,577	9,034	9,303.7	97.1	95.4	98.8	▽▽	51,043	2,603	2,579.7	100.9	97.5	104.4	▲
肥満者	58,576	29,114	29,649.9	98.2	97.5	98.9	▽▽	51,042	11,288	11,775.7	95.9	94.4	97.3	▽▽
高血圧症有病者	58,203	24,724	25,779.3	95.9	95.1	96.7	▽▽	50,637	15,247	15,925.8	95.7	94.6	96.9	▽▽
高血圧症予備群	58,203	7,489	7,680.3	97.5	95.6	99.4	▽▽	50,637	5,627	5,820.5	96.7	94.5	98.9	▽▽
脂質異常症有病者	58,570	31,575	32,303.4	97.7	97.1	98.4	▽▽	51,047	24,090	24,564.7	98.1	97.2	98.9	▽▽
糖尿病有病者	57,348	8,091	7,933.9	102.0	100.1	103.9	▲▲	49,556	3,292	3,103.8	106.1	102.9	109.3	▲▲
糖尿病予備群	57,348	10,374	8,349.0	124.3	122.3	126.2	▲▲	49,556	7,733	5,862.3	131.9	129.5	134.4	▲▲
習慣的喫煙者	58,580	16,568	18,471.2	89.7	88.6	90.8	▽▽	51,059	3,603	4,436.4	81.2	78.9	83.6	▽▽

浜松市浜名区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。


なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	17,344	4,168	4,419.5	94.3	91.9	96.8	▽▽	14,962	1,150	1,158.1	99.3	94.1	104.8	▽
メタボ予備群	17,344	2,594	2,746.7	94.4	91.2	97.8	▽▽	14,962	773	750.8	103.0	96.3	110.1	▲
肥満者	17,343	8,264	8,765.0	94.3	92.9	95.7	▽▽	14,961	3,379	3,452.8	97.9	95.1	100.7	▽
高血圧症有病者	17,244	7,315	7,658.3	95.5	93.9	97.2	▽▽	14,870	4,615	4,796.0	96.2	94.0	98.5	▽▽
高血圧症予備群	17,244	2,156	2,267.0	95.1	91.5	98.8	▽▽	14,870	1,692	1,715.5	98.6	94.4	103.0	▽
脂質異常症有病者	17,347	9,155	9,557.6	95.8	94.5	97.1	▽▽	14,962	6,992	7,276.4	96.1	94.5	97.7	▽▽
糖尿病有病者	16,950	2,326	2,353.4	98.8	95.3	102.5	▽	14,528	987	937.6	105.3	99.3	111.6	▲
糖尿病予備群	16,950	2,967	2,462.5	120.5	116.7	124.4	▲▲	14,528	2,137	1,745.5	122.4	117.8	127.2	▲▲
習慣的喫煙者	17,346	4,796	5,421.5	88.5	86.4	90.6	▽▽	14,965	884	1,268.4	69.7	65.4	74.2	▽▽

浜松市天竜区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが有意でない、▲ 高いが有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。
(高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。)

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2,687	721	742.2	97.1	91.3	103.4	▽	2,340	189	206.3	91.6	79.9	105.0	▽
メタボ予備群	2,687	391	416.7	93.8	85.7	102.8	▽	2,340	135	117.2	115.2	97.8	135.6	▲
肥満者	2,687	1,301	1,374.5	94.7	91.0	98.4	▽▽	2,340	533	547.2	97.4	90.4	104.9	▽
高血圧症有病者	2,676	1,262	1,326.4	95.1	91.4	99.0	▽▽	2,331	783	860.3	91.0	86.0	96.3	▽▽
高血圧症予備群	2,676	358	342.3	104.6	95.0	115.1	▲	2,331	260	283.2	91.8	81.9	102.9	▽
脂質異常症有病者	2,685	1,513	1,505.4	100.5	97.2	103.9	▲	2,340	1,289	1,261.5	102.2	98.5	106.0	▲
糖尿病有病者	2,644	435	418.1	104.0	95.5	113.3	▲	2,299	161	171.6	93.8	80.9	108.8	▽
糖尿病予備群	2,644	501	413.3	121.2	112.1	131.1	▲▲	2,299	391	311.6	125.5	114.7	137.3	▲▲
習慣的喫煙者	2,687	794	779.0	101.9	96.2	108.0	▲	2,340	142	177.8	79.8	68.1	93.6	▽▽