

3 市町国民健康保険組合 (35/35)

3 市町国民健康保険組合

(1) 健診受診者数


| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 2,753 | 3,868 | 4,605 | 5,076 | 9,810 | 25,524 | 37,240 | 88,876 |
| | 割合 | 3.1% | 4.4% | 5.2% | 5.7% | 11.0% | 28.7% | 41.9% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 3,049 | 4,041 | 5,196 | 6,635 | 15,288 | 32,764 | 46,278 | 113,251 |
| | 割合 | 2.7% | 3.6% | 4.6% | 5.9% | 13.5% | 28.9% | 40.9% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 5,802 | 7,909 | 9,801 | 11,711 | 25,098 | 58,288 | 83,518 | 202,127 |
| | 割合 | 2.9% | 3.9% | 4.8% | 5.8% | 12.4% | 28.8% | 41.3% | 100.0% |

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差


| | 男性 | | | 女性 | | |
|-----------------------------|--------|-------|------|---------|-------|------|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 |
| BMI (kg/m ²) | 88,839 | 23.7 | 3.4 | 113,219 | 22.2 | 3.7 |
| 腹囲 (cm) | 88,811 | 85.8 | 9.3 | 113,176 | 80.6 | 10.3 |
| 収縮期血圧 (mmHg) | 88,836 | 130.4 | 16.4 | 113,218 | 128.9 | 17.6 |
| 拡張期血圧 (mmHg) | 88,836 | 77.6 | 11.0 | 113,211 | 74.3 | 10.9 |
| 中性脂肪 (mg/dl) | 88,838 | 126.2 | 87.1 | 113,223 | 101.8 | 58.8 |
| HDLコレステロール (mg/dl) | 88,839 | 59.6 | 16.1 | 113,217 | 71.5 | 17.3 |
| LDLコレステロール (mg/dl) | 88,818 | 116.1 | 29.8 | 113,206 | 123.5 | 29.7 |
| GOT (IU/l) | 88,863 | 24.5 | 12.4 | 113,244 | 22.8 | 9.2 |
| GPT (IU/l) | 88,864 | 23.5 | 15.4 | 113,248 | 18.7 | 12.1 |
| γ-GTP (IU/l) | 88,809 | 42.6 | 51.3 | 113,223 | 25.2 | 24.6 |
| 空腹時血糖 (mg/dl) | 57,198 | 102.6 | 20.8 | 72,527 | 95.6 | 15.3 |
| HbA1c (%) | 88,464 | 5.9 | 0.7 | 112,731 | 5.7 | 0.5 |
| 血清尿酸 (mg/dl) | 82,563 | 5.8 | 1.3 | 106,244 | 4.7 | 1.1 |
| 血清クレアチニン (mg/dl) | 86,955 | 0.9 | 0.3 | 111,521 | 0.7 | 0.2 |
| ヘマトクリット (%) | 73,933 | 44.5 | 3.8 | 95,334 | 40.8 | 3.2 |
| 血色素量 (g/dl) | 74,049 | 14.6 | 1.3 | 95,483 | 13.1 | 1.1 |
| 赤血球数 (×10 ⁶ /μL) | 73,950 | 469.1 | 47.8 | 95,384 | 434.3 | 38.2 |

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）


メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合




高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合




脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合




尿蛋白(+) 以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合
市町国保 (男性)

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 1,770 64.4% | 2,314 59.9% | 2,577 56.0% | 2,663 52.5% | 5,063 51.6% | 12,887 50.5% | 18,859 50.7% | 46,133 51.9% |
| メタボ予備群 | 507 18.4% | 688 17.8% | 820 17.8% | 894 17.6% | 1,551 15.8% | 3,807 14.9% | 5,351 14.4% | 13,618 15.3% |
| メタボ該当 | 472 17.2% | 864 22.3% | 1,203 26.2% | 1,514 29.9% | 3,191 32.5% | 8,819 34.6% | 12,997 34.9% | 29,060 32.7% |
| 合計 | 2,749 100.0% | 3,866 100.0% | 4,600 100.0% | 5,071 100.0% | 9,805 100.0% | 25,513 100.0% | 37,207 100.0% | 88,811 100.0% |

市町国保 (女性)

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 2,817 92.4% | 3,617 89.5% | 4,523 87.1% | 5,665 85.4% | 13,032 85.3% | 27,313 83.4% | 38,146 82.5% | 95,113 84.0% |
| メタボ予備群 | 138 4.5% | 218 5.4% | 308 5.9% | 375 5.7% | 728 4.8% | 1,545 4.7% | 2,109 4.6% | 5,421 4.8% |
| メタボ該当 | 93 3.1% | 205 5.1% | 359 6.9% | 592 8.9% | 1,524 10.0% | 3,889 11.9% | 5,980 12.9% | 12,642 11.2% |
| 合計 | 3,048 100.0% | 4,040 100.0% | 5,190 100.0% | 6,632 100.0% | 15,284 100.0% | 32,747 100.0% | 46,235 100.0% | 113,176 100.0% |

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

市町国保 (男性)

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲<85cm | 1,385 50.4% | 1,852 47.9% | 2,114 46.0% | 2,257 44.5% | 4,461 45.5% | 11,667 45.7% | 17,511 47.1% | 41,247 46.4% |
| BMI≥25, 腹囲<85cm | 57 2.1% | 101 2.6% | 103 2.2% | 110 2.2% | 171 1.7% | 384 1.5% | 402 1.1% | 1,328 1.5% |
| BMI<25, 腹囲≥85cm | 369 13.4% | 544 14.1% | 699 15.2% | 914 18.0% | 1,997 20.4% | 6,010 23.6% | 9,784 26.3% | 20,317 22.9% |
| BMI≥25, 腹囲≥85cm | 938 34.1% | 1,367 35.4% | 1,684 36.6% | 1,788 35.3% | 3,176 32.4% | 7,451 29.2% | 9,507 25.6% | 25,911 29.2% |
| 合計 | 2,749 100.0% | 3,864 100.0% | 4,600 100.0% | 5,069 100.0% | 9,805 100.0% | 25,512 100.0% | 37,204 100.0% | 88,803 100.0% |

市町国保 (女性)

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲<90cm | 2,439 80.0% | 3,122 77.3% | 3,942 76.0% | 5,096 76.9% | 11,816 77.3% | 24,946 76.2% | 34,838 75.3% | 86,199 76.2% |
| BMI≥25, 腹囲<90cm | 252 8.3% | 348 8.6% | 430 8.3% | 420 6.3% | 959 6.3% | 2,018 6.2% | 2,915 6.3% | 7,342 6.5% |
| BMI<25, 腹囲≥90cm | 26 0.9% | 57 1.4% | 124 2.4% | 198 3.0% | 602 3.9% | 1,517 4.6% | 2,556 5.5% | 5,080 4.5% |
| BMI≥25, 腹囲≥90cm | 331 10.9% | 513 12.7% | 692 13.3% | 917 13.8% | 1,906 12.5% | 4,264 13.0% | 5,926 12.8% | 14,549 12.9% |
| 合計 | 3,048 100.0% | 4,040 100.0% | 5,188 100.0% | 6,631 100.0% | 15,283 100.0% | 32,745 100.0% | 46,235 100.0% | 113,170 100.0% |

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
市町国保（男性）

| 肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 873 64.0% | 1,116 55.5% | 1,253 50.4% | 1,243 44.2% | 2,053 38.4% | 4,788 34.6% | 6,438 32.7% | 17,764 37.4% |
| リスク2個以上 | 491 36.0% | 896 44.5% | 1,233 49.6% | 1,569 55.8% | 3,291 61.6% | 9,057 65.4% | 13,255 67.3% | 29,792 62.6% |
| 合計 | 1,364 100.0% | 2,012 100.0% | 2,486 100.0% | 2,812 100.0% | 5,344 100.0% | 13,845 100.0% | 19,693 100.0% | 47,556 100.0% |

| 非肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 1,274 92.0% | 1,587 85.7% | 1,725 81.6% | 1,703 75.5% | 3,047 68.3% | 7,077 60.7% | 9,765 55.8% | 26,178 63.5% |
| リスク2個以上 | 111 8.0% | 265 14.3% | 389 18.4% | 554 24.5% | 1,414 31.7% | 4,590 39.3% | 7,746 44.2% | 15,069 36.5% |
| 合計 | 1,385 100.0% | 1,852 100.0% | 2,114 100.0% | 2,257 100.0% | 4,461 100.0% | 11,667 100.0% | 17,511 100.0% | 41,247 100.0% |

市町国保（女性）

| 肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 482 79.1% | 650 70.8% | 763 61.2% | 747 48.7% | 1,412 40.7% | 2,582 33.1% | 3,414 30.0% | 10,050 37.3% |
| リスク2個以上 | 127 20.9% | 268 29.2% | 483 38.8% | 788 51.3% | 2,055 59.3% | 5,217 66.9% | 7,983 70.0% | 16,921 62.7% |
| 合計 | 609 100.0% | 918 100.0% | 1,246 100.0% | 1,535 100.0% | 3,467 100.0% | 7,799 100.0% | 11,397 100.0% | 26,971 100.0% |

| 非肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 2,391 98.0% | 2,969 95.1% | 3,577 90.7% | 4,293 84.2% | 8,800 74.5% | 16,048 64.3% | 19,346 55.5% | 57,424 66.6% |
| リスク2個以上 | 48 2.0% | 153 4.9% | 365 9.3% | 803 15.8% | 3,016 25.5% | 8,898 35.7% | 15,492 44.5% | 28,775 33.4% |
| 合計 | 2,439 100.0% | 3,122 100.0% | 3,942 100.0% | 5,096 100.0% | 11,816 100.0% | 24,946 100.0% | 34,838 100.0% | 86,199 100.0% |

糖尿病有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 2,412 87.7% | 3,190 82.6% | 3,579 77.9% | 3,665 72.2% | 6,678 68.1% | 15,989 62.7% | 22,332 60.0% | 57,845 65.2% |
| 糖尿病予備群 | 209 7.6% | 354 9.2% | 532 11.6% | 695 13.7% | 1,534 15.7% | 4,401 17.3% | 6,722 18.1% | 14,447 16.3% |
| 糖尿病有病者 | 129 4.7% | 317 8.2% | 485 10.6% | 713 14.1% | 1,588 16.2% | 5,100 20.0% | 8,145 21.9% | 16,477 18.6% |
| 合計 | 2,750 100.0% | 3,861 100.0% | 4,596 100.0% | 5,073 100.0% | 9,800 100.0% | 25,490 100.0% | 37,199 100.0% | 88,769 100.0% |

市町国保（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 2,886 94.7% | 3,678 91.1% | 4,471 86.2% | 5,422 81.8% | 11,913 78.0% | 23,959 73.2% | 32,320 69.9% | 84,649 74.8% |
| 糖尿病予備群 | 111 3.6% | 220 5.4% | 486 9.4% | 795 12.0% | 2,246 14.7% | 5,602 17.1% | 8,303 18.0% | 17,763 15.7% |
| 糖尿病有病者 | 51 1.7% | 140 3.5% | 230 4.4% | 411 6.2% | 1,118 7.3% | 3,163 9.7% | 5,598 12.1% | 10,711 9.5% |
| 合計 | 3,048 100.0% | 4,038 100.0% | 5,187 100.0% | 6,628 100.0% | 15,277 100.0% | 32,724 100.0% | 46,221 100.0% | 113,123 100.0% |

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 72 2.6% | 165 4.3% | 285 6.2% | 439 8.7% | 1,040 10.6% | 3,347 13.1% | 5,458 14.7% | 10,806 12.2% |
| 服用していない | 2,680 97.4% | 3,702 95.7% | 4,319 93.8% | 4,636 91.3% | 8,769 89.4% | 22,173 86.9% | 31,774 85.3% | 78,053 87.8% |
| 合計 | 2,752 100.0% | 3,867 100.0% | 4,604 100.0% | 5,075 100.0% | 9,809 100.0% | 25,520 100.0% | 37,232 100.0% | 88,859 100.0% |

市町国保（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 30 1.0% | 85 2.1% | 142 2.7% | 241 3.6% | 727 4.8% | 1,994 6.1% | 3,513 7.6% | 6,732 5.9% |
| 服用していない | 3,019 99.0% | 3,956 97.9% | 5,054 97.3% | 6,394 96.4% | 14,561 95.2% | 30,765 93.9% | 42,756 92.4% | 106,505 94.1% |
| 合計 | 3,049 100.0% | 4,041 100.0% | 5,196 100.0% | 6,635 100.0% | 15,288 100.0% | 32,759 100.0% | 46,269 100.0% | 113,237 100.0% |

高血圧症有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 1,801 65.4% | 2,168 56.1% | 2,137 46.4% | 1,901 37.5% | 3,050 31.1% | 6,491 25.4% | 8,075 21.7% | 25,623 28.8% |
| 高血圧症予備群 | 388 14.1% | 556 14.4% | 693 15.1% | 738 14.5% | 1,227 12.5% | 3,038 11.9% | 4,035 10.8% | 10,675 12.0% |
| 高血圧症有病者 | 564 20.5% | 1,142 29.5% | 1,773 38.5% | 2,435 48.0% | 5,531 56.4% | 15,990 62.7% | 25,115 67.5% | 52,550 59.1% |
| 合計 | 2,753 100.0% | 3,866 100.0% | 4,603 100.0% | 5,074 100.0% | 9,808 100.0% | 25,519 100.0% | 37,225 100.0% | 88,848 100.0% |

市町国保（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 2,556 83.8% | 2,977 73.7% | 3,384 65.1% | 3,697 55.7% | 7,209 47.2% | 12,066 36.8% | 12,767 27.6% | 44,656 39.4% |
| 高血圧症予備群 | 231 7.6% | 434 10.7% | 642 12.4% | 895 13.5% | 2,107 13.8% | 4,651 14.2% | 6,203 13.4% | 15,163 13.4% |
| 高血圧症有病者 | 262 8.6% | 629 15.6% | 1,170 22.5% | 2,042 30.8% | 5,971 39.1% | 16,039 49.0% | 27,293 59.0% | 53,406 47.2% |
| 合計 | 3,049 100.0% | 4,040 100.0% | 5,196 100.0% | 6,634 100.0% | 15,287 100.0% | 32,756 100.0% | 46,263 100.0% | 113,225 100.0% |

血圧を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 212 | 480 | 983 | 1,527 | 3,951 | 12,169 | 19,943 | 39,265 |
| 割合 | 7.7% | 12.4% | 21.4% | 30.1% | 40.3% | 47.7% | 53.6% | 44.2% |
| 服用していない | 2,541 | 3,387 | 3,621 | 3,548 | 5,858 | 13,351 | 17,293 | 49,599 |
| 割合 | 92.3% | 87.6% | 78.6% | 69.9% | 59.7% | 52.3% | 46.4% | 55.8% |
| 合計 | 2,753 | 3,867 | 4,604 | 5,075 | 9,809 | 25,520 | 37,236 | 88,864 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

市町国保（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 88 | 277 | 613 | 1,222 | 3,795 | 10,749 | 19,761 | 36,505 |
| 割合 | 2.9% | 6.9% | 11.8% | 18.4% | 24.8% | 32.8% | 42.7% | 32.2% |
| 服用していない | 2,961 | 3,764 | 4,583 | 5,413 | 11,493 | 22,010 | 26,511 | 76,735 |
| 割合 | 97.1% | 93.1% | 88.2% | 81.6% | 75.2% | 67.2% | 57.3% | 67.8% |
| 合計 | 3,049 | 4,041 | 5,196 | 6,635 | 15,288 | 32,759 | 46,272 | 113,240 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

脂質異常症有病者の割合

市町国保（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 1,287 | 1,616 | 1,943 | 2,070 | 3,898 | 9,998 | 15,425 | 36,237 |
| 割合 | 46.7% | 41.8% | 42.2% | 40.8% | 39.7% | 39.2% | 41.4% | 40.8% |
| 脂質異常症有病者 | 1,466 | 2,251 | 2,660 | 3,002 | 5,911 | 15,515 | 21,802 | 52,607 |
| 割合 | 53.3% | 58.2% | 57.8% | 59.2% | 60.3% | 60.8% | 58.6% | 59.2% |
| 合計 | 2,753 | 3,867 | 4,603 | 5,072 | 9,809 | 25,513 | 37,227 | 88,844 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

市町国保（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 2,314 | 2,708 | 2,781 | 2,889 | 5,709 | 10,842 | 14,787 | 42,030 |
| 割合 | 75.9% | 67.0% | 53.6% | 43.6% | 37.4% | 33.1% | 32.0% | 37.1% |
| 脂質異常症有病者 | 735 | 1,333 | 2,412 | 3,744 | 9,575 | 21,912 | 31,473 | 71,184 |
| 割合 | 24.1% | 33.0% | 46.4% | 56.4% | 62.6% | 66.9% | 68.0% | 62.9% |
| 合計 | 3,049 | 4,041 | 5,193 | 6,633 | 15,284 | 32,754 | 46,260 | 113,214 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

コレステロールを下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 197 | 425 | 696 | 990 | 2,508 | 7,685 | 11,905 | 24,406 |
| 割合 | 7.2% | 11.0% | 15.1% | 19.5% | 25.6% | 30.1% | 32.0% | 27.5% |
| 服用していない | 2,555 | 3,442 | 3,908 | 4,085 | 7,301 | 17,835 | 25,329 | 64,455 |
| 割合 | 92.8% | 89.0% | 84.9% | 80.5% | 74.4% | 69.9% | 68.0% | 72.5% |
| 合計 | 2,752 | 3,867 | 4,604 | 5,075 | 9,809 | 25,520 | 37,234 | 88,861 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

市町国保（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 75 | 228 | 551 | 1,293 | 4,515 | 12,379 | 20,035 | 39,076 |
| 割合 | 2.5% | 5.6% | 10.6% | 19.5% | 29.5% | 37.8% | 43.3% | 34.5% |
| 服用していない | 2,974 | 3,813 | 4,645 | 5,342 | 10,773 | 20,381 | 26,235 | 74,163 |
| 割合 | 97.5% | 94.4% | 89.4% | 80.5% | 70.5% | 62.2% | 56.7% | 65.5% |
| 合計 | 3,049 | 4,041 | 5,196 | 6,635 | 15,288 | 32,760 | 46,270 | 113,239 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

尿蛋白(+) 以上の割合

市町国保 (男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 割合 | 2, 657 96. 7% | 3, 681 95. 4% | 4, 381 95. 4% | 4, 799 94. 9% | 9, 177 93. 8% | 23, 905 93. 9% | 34, 389 92. 7% | 82, 989 93. 7% |
| 尿蛋白(+) 以上 | 人数 割合 | 91 3. 3% | 176 4. 6% | 210 4. 6% | 258 5. 1% | 603 6. 2% | 1, 558 6. 1% | 2, 719 7. 3% | 5, 615 6. 3% |
| 合計 | 人数 割合 | 2, 748 100. 0% | 3, 857 100. 0% | 4, 591 100. 0% | 5, 057 100. 0% | 9, 780 100. 0% | 25, 463 100. 0% | 37, 108 100. 0% | 88, 604 100. 0% |

市町国保 (女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 割合 | 2, 956 97. 4% | 3, 923 97. 6% | 5, 086 98. 2% | 6, 496 98. 1% | 14, 923 97. 8% | 31, 831 97. 4% | 44, 611 96. 7% | 109, 826 97. 2% |
| 尿蛋白(+) 以上 | 人数 割合 | 80 2. 6% | 96 2. 4% | 91 1. 8% | 126 1. 9% | 338 2. 2% | 857 2. 6% | 1, 521 3. 3% | 3, 109 2. 8% |
| 合計 | 人数 割合 | 3, 036 100. 0% | 4, 019 100. 0% | 5, 177 100. 0% | 6, 622 100. 0% | 15, 261 100. 0% | 32, 688 100. 0% | 46, 132 100. 0% | 112, 935 100. 0% |

習慣的喫煙者の割合

市町国保（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 881 | 1, 148 | 1, 375 | 1, 391 | 2, 131 | 4, 826 | 5, 445 | 17, 197 |
| 割合 | 32. 0% | 29. 7% | 29. 9% | 27. 4% | 21. 7% | 18. 9% | 14. 6% | 19. 4% |
| 非喫煙者 | 1, 872 | 2, 719 | 3, 229 | 3, 684 | 7, 678 | 20, 695 | 31, 790 | 71, 667 |
| 割合 | 68. 0% | 70. 3% | 70. 1% | 72. 6% | 78. 3% | 81. 1% | 85. 4% | 80. 6% |
| 合計 | 2, 753 | 3, 867 | 4, 604 | 5, 075 | 9, 809 | 25, 521 | 37, 235 | 88, 864 |
| 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 361 | 522 | 648 | 574 | 869 | 1, 243 | 1, 422 | 5, 639 |
| 割合 | 11. 8% | 12. 9% | 12. 5% | 8. 7% | 5. 7% | 3. 8% | 3. 1% | 5. 0% |
| 非喫煙者 | 2, 688 | 3, 519 | 4, 548 | 6, 061 | 14, 419 | 31, 518 | 44, 850 | 107, 603 |
| 割合 | 88. 2% | 87. 1% | 87. 5% | 91. 3% | 94. 3% | 96. 2% | 96. 9% | 95. 0% |
| 合計 | 3, 049 | 4, 041 | 5, 196 | 6, 635 | 15, 288 | 32, 761 | 46, 272 | 113, 242 |
| 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

飲酒者の割合

市町国保（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 637 | 979 | 1, 247 | 1, 541 | 3, 311 | 9, 342 | 13, 226 | 30, 283 |
| 割合 | 25. 5% | 27. 7% | 30. 2% | 33. 8% | 37. 4% | 40. 7% | 39. 6% | 37. 9% |
| 時々 | 731 | 1, 045 | 1, 125 | 1, 195 | 2, 212 | 5, 539 | 7, 474 | 19, 321 |
| 割合 | 29. 3% | 29. 5% | 27. 2% | 26. 2% | 25. 0% | 24. 1% | 22. 4% | 24. 2% |
| ほとんど飲まない | 1, 127 | 1, 513 | 1, 759 | 1, 823 | 3, 320 | 8, 071 | 12, 711 | 30, 324 |
| 割合 | 45. 2% | 42. 8% | 42. 6% | 40. 0% | 37. 5% | 35. 2% | 38. 0% | 37. 9% |
| 合計 | 2, 495 | 3, 537 | 4, 131 | 4, 559 | 8, 843 | 22, 952 | 33, 411 | 79, 928 |
| 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

市町国保（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 340 | 461 | 645 | 701 | 1, 551 | 2, 622 | 3, 123 | 9, 443 |
| 割合 | 12. 5% | 12. 7% | 14. 0% | 11. 9% | 11. 3% | 8. 9% | 7. 6% | 9. 3% |
| 時々 | 723 | 998 | 1, 211 | 1, 413 | 3, 136 | 5, 918 | 7, 186 | 20, 585 |
| 割合 | 26. 5% | 27. 6% | 26. 2% | 23. 9% | 22. 8% | 20. 1% | 17. 5% | 20. 4% |
| ほとんど飲まない | 1, 664 | 2, 157 | 2, 759 | 3, 789 | 9, 050 | 20, 872 | 30, 822 | 71, 113 |
| 割合 | 61. 0% | 59. 7% | 59. 8% | 64. 2% | 65. 9% | 71. 0% | 74. 9% | 70. 3% |
| 合計 | 2, 727 | 3, 616 | 4, 615 | 5, 903 | 13, 737 | 29, 412 | 41, 131 | 101, 141 |
| 割合 | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

4 国民健康保険組合 (5/5)

4 国民健康保険組合

(1) 健診受診者数


| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 366 | 459 | 539 | 456 | 552 | 546 | 461 | 3,379 |
| | 10.8% | 13.6% | 16.0% | 13.5% | 16.3% | 16.2% | 13.6% | 100.0% |
| 女性 | 861 | 1,058 | 1,029 | 918 | 683 | 479 | 271 | 5,299 |
| | 16.2% | 20.0% | 19.4% | 17.3% | 12.9% | 9.0% | 5.1% | 100.0% |
| 計 | 1,227 | 1,517 | 1,568 | 1,374 | 1,235 | 1,025 | 732 | 8,678 |
| | 14.1% | 17.5% | 18.1% | 15.8% | 14.2% | 11.8% | 8.4% | 100.0% |

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差


| | 男性 | | | 女性 | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| BMI (kg/m ²) | 3,379 | 24.0 | 3.5 | 5,297 | 21.6 | 3.6 | |
| 腹囲 (cm) | 3,376 | 85.4 | 9.2 | 5,294 | 77.4 | 9.7 | |
| 収縮期血圧 (mmHg) | 3,377 | 128.2 | 16.3 | 5,296 | 121.1 | 16.3 | |
| 拡張期血圧 (mmHg) | 3,377 | 79.4 | 11.1 | 5,296 | 72.8 | 11.0 | |
| 中性脂肪 (mg/dl) | 3,378 | 128.5 | 109.5 | 5,296 | 83.3 | 52.6 | |
| HDLコレステロール (mg/dl) | 3,376 | 61.6 | 16.2 | 5,296 | 75.5 | 17.4 | |
| LDLコレステロール (mg/dl) | 3,368 | 121.7 | 31.9 | 5,291 | 123.6 | 30.5 | |
| GOT (IU/l) | 3,379 | 25.4 | 12.6 | 5,299 | 21.7 | 8.4 | |
| GPT (IU/l) | 3,378 | 26.8 | 16.9 | 5,296 | 18.6 | 12.1 | |
| γ-GTP (IU/l) | 3,373 | 48.8 | 57.6 | 5,295 | 26.0 | 31.4 | |
| 空腹時血糖 (mg/dl) | 2,428 | 102.4 | 18.6 | 3,034 | 92.7 | 12.9 | |
| HbA1c (%) | 2,837 | 5.8 | 0.7 | 4,705 | 5.6 | 0.4 | |
| 血清尿酸 (mg/dl) | 1,248 | 5.9 | 1.3 | 2,229 | 4.6 | 2.2 | |
| 血清クレアチニン (mg/dl) | 2,018 | 0.9 | 0.3 | 4,225 | 0.7 | 0.1 | |
| ヘマトクリット (%) | 2,013 | 45.3 | 3.4 | 4,161 | 40.8 | 3.3 | |
| 血色素量 (g/dl) | 2,024 | 14.9 | 1.1 | 4,183 | 13.1 | 1.2 | |
| 赤血球数 (×10 ⁶ /μL) | 2,003 | 480.9 | 45.6 | 4,149 | 440.4 | 36.0 | |

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）


メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合




高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合




脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合




尿蛋白(+) 以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合
国保組合 (男性)

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 244 66.7% | 276 60.1% | 327 60.7% | 255 55.9% | 311 56.4% | 287 52.8% | 242 52.5% | 1,942 57.5% |
| メタボ予備群 | 61 16.7% | 89 19.4% | 92 17.1% | 76 16.7% | 79 14.3% | 76 14.0% | 51 11.1% | 524 15.5% |
| メタボ該当 | 61 16.7% | 94 20.5% | 120 22.3% | 125 27.4% | 161 29.2% | 181 33.3% | 168 36.4% | 910 27.0% |
| 合計 | 366 100.0% | 459 100.0% | 539 100.0% | 456 100.0% | 551 100.0% | 544 100.0% | 461 100.0% | 3,376 100.0% |

国保組合 (女性)

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 822 95.6% | 978 92.5% | 947 92.0% | 839 91.4% | 612 89.7% | 409 85.7% | 227 83.8% | 4,834 91.3% |
| メタボ予備群 | 28 3.3% | 51 4.8% | 36 3.5% | 37 4.0% | 25 3.7% | 23 4.8% | 12 4.4% | 212 4.0% |
| メタボ該当 | 10 1.2% | 28 2.6% | 46 4.5% | 42 4.6% | 45 6.6% | 45 9.4% | 32 11.8% | 248 4.7% |
| 合計 | 860 100.0% | 1,057 100.0% | 1,029 100.0% | 918 100.0% | 682 100.0% | 477 100.0% | 271 100.0% | 5,294 100.0% |

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

国保組合 (男性)

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲<85cm | 199 54.4% | 217 47.3% | 269 49.9% | 223 48.9% | 278 50.5% | 255 46.9% | 223 48.4% | 1,664 49.3% |
| BMI≥25, 腹囲<85cm | 10 2.7% | 13 2.8% | 13 2.4% | 11 2.4% | 12 2.2% | 10 1.8% | 6 1.3% | 75 2.2% |
| BMI<25, 腹囲≥85cm | 44 12.0% | 65 14.2% | 86 16.0% | 76 16.7% | 108 19.6% | 129 23.7% | 113 24.5% | 621 18.4% |
| BMI≥25, 腹囲≥85cm | 113 30.9% | 164 35.7% | 171 31.7% | 146 32.0% | 153 27.8% | 150 27.6% | 119 25.8% | 1,016 30.1% |
| 合計 | 366 100.0% | 459 100.0% | 539 100.0% | 456 100.0% | 551 100.0% | 544 100.0% | 461 100.0% | 3,376 100.0% |

国保組合 (女性)

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲<90cm | 750 87.2% | 896 84.8% | 849 82.5% | 762 83.0% | 564 82.7% | 380 79.7% | 208 77.0% | 4,409 83.3% |
| BMI≥25, 腹囲<90cm | 52 6.0% | 67 6.3% | 76 7.4% | 62 6.8% | 39 5.7% | 26 5.5% | 17 6.3% | 339 6.4% |
| BMI<25, 腹囲≥90cm | 3 0.3% | 7 0.7% | 14 1.4% | 15 1.6% | 17 2.5% | 20 4.2% | 13 4.8% | 89 1.7% |
| BMI≥25, 腹囲≥90cm | 55 6.4% | 87 8.2% | 90 8.7% | 79 8.6% | 62 9.1% | 51 10.7% | 32 11.9% | 456 8.6% |
| 合計 | 860 100.0% | 1,057 100.0% | 1,029 100.0% | 918 100.0% | 682 100.0% | 477 100.0% | 270 100.0% | 5,293 100.0% |

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
国保組合（男性）

| 肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 104 | 146 | 148 | 105 | 106 | 103 | 67 | 779 |
| | 62.3% | 60.3% | 54.8% | 45.1% | 38.8% | 35.6% | 28.2% | 45.5% |
| リスク2個以上 | 63 | 96 | 122 | 128 | 167 | 186 | 171 | 933 |
| | 37.7% | 39.7% | 45.2% | 54.9% | 61.2% | 64.4% | 71.8% | 54.5% |
| 合計 | 167 | 242 | 270 | 233 | 273 | 289 | 238 | 1,712 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| 非肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 176 | 194 | 224 | 167 | 185 | 145 | 114 | 1,205 |
| | 88.4% | 89.4% | 83.3% | 74.9% | 66.5% | 56.9% | 51.1% | 72.4% |
| リスク2個以上 | 23 | 23 | 45 | 56 | 93 | 110 | 109 | 459 |
| | 11.6% | 10.6% | 16.7% | 25.1% | 33.5% | 43.1% | 48.9% | 27.6% |
| 合計 | 199 | 217 | 269 | 223 | 278 | 255 | 223 | 1,664 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

国保組合（女性）

| 肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 93 | 119 | 111 | 88 | 53 | 39 | 18 | 521 |
| | 84.5% | 73.9% | 61.7% | 56.4% | 44.9% | 40.2% | 29.0% | 58.9% |
| リスク2個以上 | 17 | 42 | 69 | 68 | 65 | 58 | 44 | 363 |
| | 15.5% | 26.1% | 38.3% | 43.6% | 55.1% | 59.8% | 71.0% | 41.1% |
| 合計 | 110 | 161 | 180 | 156 | 118 | 97 | 62 | 884 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| 非肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| リスク1個以下 | 731 | 876 | 786 | 658 | 449 | 245 | 115 | 3,860 |
| | 97.5% | 97.8% | 92.6% | 86.4% | 79.6% | 64.5% | 55.3% | 87.5% |
| リスク2個以上 | 19 | 20 | 63 | 104 | 115 | 135 | 93 | 549 |
| | 2.5% | 2.2% | 7.4% | 13.6% | 20.4% | 35.5% | 44.7% | 12.5% |
| 合計 | 750 | 896 | 849 | 762 | 564 | 380 | 208 | 4,409 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

糖尿病有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 309 | 379 | 424 | 319 | 371 | 334 | 252 | 2,388 |
| | 85.4% | 83.3% | 79.0% | 70.1% | 67.5% | 61.3% | 54.9% | 71.0% |
| 糖尿病予備群 | 37 | 49 | 70 | 84 | 91 | 105 | 101 | 537 |
| | 10.2% | 10.8% | 13.0% | 18.5% | 16.5% | 19.3% | 22.0% | 16.0% |
| 糖尿病有病者 | 16 | 27 | 43 | 52 | 88 | 106 | 106 | 438 |
| | 4.4% | 5.9% | 8.0% | 11.4% | 16.0% | 19.4% | 23.1% | 13.0% |
| 合計 | 362 | 455 | 537 | 455 | 550 | 545 | 459 | 3,363 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 816 | 994 | 935 | 789 | 545 | 351 | 191 | 4,621 |
| | 95.0% | 94.4% | 91.0% | 86.3% | 80.1% | 73.4% | 70.7% | 87.5% |
| 糖尿病予備群 | 32 | 36 | 70 | 91 | 83 | 83 | 43 | 438 |
| | 3.7% | 3.4% | 6.8% | 10.0% | 12.2% | 17.4% | 15.9% | 8.3% |
| 糖尿病有病者 | 11 | 23 | 23 | 34 | 52 | 44 | 36 | 223 |
| | 1.3% | 2.2% | 2.2% | 3.7% | 7.6% | 9.2% | 13.3% | 4.2% |
| 合計 | 859 | 1,053 | 1,028 | 914 | 680 | 478 | 270 | 5,282 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している 人数 割合 | 3 0.8% | 16 3.5% | 19 3.5% | 30 6.6% | 59 10.7% | 70 12.8% | 65 14.1% | 262 7.8% |
| 服用していない 人数 割合 | 363 99.2% | 443 96.5% | 520 96.5% | 426 93.4% | 493 89.3% | 476 87.2% | 396 85.9% | 3,117 92.2% |
| 合計 人数 割合 | 366 100.0% | 459 100.0% | 539 100.0% | 456 100.0% | 552 100.0% | 546 100.0% | 461 100.0% | 3,379 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している 人数 割合 | 5 0.6% | 15 1.4% | 14 1.4% | 20 2.2% | 27 4.0% | 28 5.8% | 21 7.7% | 130 2.5% |
| 服用していない 人数 割合 | 856 99.4% | 1,043 98.6% | 1,015 98.6% | 897 97.8% | 656 96.0% | 451 94.2% | 250 92.3% | 5,168 97.5% |
| 合計 人数 割合 | 861 100.0% | 1,058 100.0% | 1,029 100.0% | 917 100.0% | 683 100.0% | 479 100.0% | 271 100.0% | 5,298 100.0% |

高血圧症有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 人数 割合 | 227 62.0% | 248 54.1% | 271 50.3% | 183 40.1% | 173 31.4% | 140 25.6% | 88 19.1% | 1,330 39.4% |
| 高血圧症予備群 人数 割合 | 58 15.8% | 80 17.5% | 78 14.5% | 60 13.2% | 76 13.8% | 60 11.0% | 48 10.4% | 460 13.6% |
| 高血圧症有病者 人数 割合 | 81 22.1% | 130 28.4% | 190 35.3% | 213 46.7% | 302 54.8% | 346 63.4% | 325 70.5% | 1,587 47.0% |
| 合計 人数 割合 | 366 100.0% | 458 100.0% | 539 100.0% | 456 100.0% | 551 100.0% | 546 100.0% | 461 100.0% | 3,377 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 人数 割合 | 712 82.8% | 805 76.2% | 674 65.5% | 564 61.5% | 358 52.5% | 184 38.4% | 74 27.3% | 3,371 63.7% |
| 高血圧症予備群 人数 割合 | 88 10.2% | 108 10.2% | 128 12.4% | 116 12.6% | 102 15.0% | 74 15.4% | 31 11.4% | 647 12.2% |
| 高血圧症有病者 人数 割合 | 60 7.0% | 144 13.6% | 227 22.1% | 237 25.8% | 222 32.6% | 221 46.1% | 166 61.3% | 1,277 24.1% |
| 合計 人数 割合 | 860 100.0% | 1,057 100.0% | 1,029 100.0% | 917 100.0% | 682 100.0% | 479 100.0% | 271 100.0% | 5,295 100.0% |

血圧を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している 人数 割合 | 19 5.2% | 56 12.2% | 102 18.9% | 134 29.4% | 207 37.5% | 260 47.6% | 256 55.5% | 1,034 30.6% |
| 服用していない 人数 割合 | 347 94.8% | 403 87.8% | 437 81.1% | 322 70.6% | 345 62.5% | 286 52.4% | 205 44.5% | 2,345 69.4% |
| 合計 人数 割合 | 366 100.0% | 459 100.0% | 539 100.0% | 456 100.0% | 552 100.0% | 546 100.0% | 461 100.0% | 3,379 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している 人数 割合 | 22 2.6% | 66 6.2% | 124 12.1% | 127 13.8% | 149 21.8% | 168 35.1% | 122 45.0% | 778 14.7% |
| 服用していない 人数 割合 | 839 97.4% | 992 93.8% | 905 87.9% | 790 86.2% | 534 78.2% | 311 64.9% | 149 55.0% | 4,520 85.3% |
| 合計 人数 割合 | 861 100.0% | 1,058 100.0% | 1,029 100.0% | 917 100.0% | 683 100.0% | 479 100.0% | 271 100.0% | 5,298 100.0% |

脂質異常症有病者の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 人数 割合 | 169 46.2% | 184 40.2% | 238 44.2% | 184 40.4% | 209 37.9% | 213 39.1% | 191 41.4% | 1,388 41.1% |
| 脂質異常有病者 人数 割合 | 197 53.8% | 274 59.8% | 301 55.8% | 272 59.6% | 342 62.1% | 332 60.9% | 270 58.6% | 1,988 58.9% |
| 合計 人数 割合 | 366 100.0% | 458 100.0% | 539 100.0% | 456 100.0% | 551 100.0% | 545 100.0% | 461 100.0% | 3,376 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 人数 割合 | 687 79.9% | 755 71.4% | 551 53.7% | 411 44.9% | 300 43.9% | 164 34.2% | 76 28.0% | 2,944 55.6% |
| 脂質異常有病者 人数 割合 | 173 20.1% | 302 28.6% | 476 46.3% | 505 55.1% | 383 56.1% | 315 65.8% | 195 72.0% | 2,349 44.4% |
| 合計 人数 割合 | 860 100.0% | 1,057 100.0% | 1,027 100.0% | 916 100.0% | 683 100.0% | 479 100.0% | 271 100.0% | 5,293 100.0% |

コレステロールを下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している 人数 割合 | 25 6.8% | 40 8.7% | 68 12.6% | 103 22.6% | 147 26.6% | 166 30.4% | 140 30.4% | 689 20.4% |
| 服用していない 人数 割合 | 341 93.2% | 419 91.3% | 471 87.4% | 353 77.4% | 405 73.4% | 380 69.6% | 321 69.6% | 2,690 79.6% |
| 合計 人数 割合 | 366 100.0% | 459 100.0% | 539 100.0% | 456 100.0% | 552 100.0% | 546 100.0% | 461 100.0% | 3,379 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している 人数 割合 | 18 2.1% | 46 4.3% | 110 10.7% | 166 18.1% | 172 25.2% | 178 37.2% | 111 41.0% | 801 15.1% |
| 服用していない 人数 割合 | 843 97.9% | 1,012 95.7% | 919 89.3% | 751 81.9% | 511 74.8% | 301 62.8% | 160 59.0% | 4,497 84.9% |
| 合計 人数 割合 | 861 100.0% | 1,058 100.0% | 1,029 100.0% | 917 100.0% | 683 100.0% | 479 100.0% | 271 100.0% | 5,298 100.0% |

尿蛋白(+)以上の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 359 | 452 | 530 | 438 | 533 | 529 | 440 | 3,281 |
| | 割合 98.1% | 98.5% | 98.3% | 96.5% | 97.1% | 97.1% | 96.3% | 97.4% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 7 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 17 | 88 |
| | 割合 1.9% | 1.5% | 1.7% | 3.5% | 2.9% | 2.9% | 3.7% | 2.6% |
| 合計 | 人数 366 | 459 | 539 | 454 | 549 | 545 | 457 | 3,369 |
| | 割合 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 843 | 1,035 | 1,013 | 912 | 676 | 472 | 268 | 5,219 |
| | 割合 98.5% | 98.7% | 98.5% | 99.3% | 99.1% | 98.5% | 98.9% | 98.8% |
| 尿蛋白(+)以上 | 人数 13 | 14 | 15 | 6 | 6 | 7 | 3 | 64 |
| | 割合 1.5% | 1.3% | 1.5% | 0.7% | 0.9% | 1.5% | 1.1% | 1.2% |
| 合計 | 人数 856 | 1,049 | 1,028 | 918 | 682 | 479 | 271 | 5,283 |
| | 割合 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

習慣的喫煙者の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 人数 | 125 | 143 | 161 | 91 | 97 | 76 | 55 | 748 |
| 喫煙者 割合 | 34.2% | 31.2% | 29.9% | 20.0% | 17.6% | 13.9% | 11.9% | 22.1% |
| 非喫煙者 人数 | 241 | 316 | 378 | 365 | 455 | 470 | 406 | 2,631 |
| 非喫煙者 割合 | 65.8% | 68.8% | 70.1% | 80.0% | 82.4% | 86.1% | 88.1% | 77.9% |
| 合計 人数 | 366 | 459 | 539 | 456 | 552 | 546 | 461 | 3,379 |
| 合計 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 人数 | 45 | 80 | 62 | 42 | 33 | 22 | 13 | 297 |
| 喫煙者 割合 | 5.2% | 7.6% | 6.0% | 4.6% | 4.8% | 4.6% | 4.8% | 5.6% |
| 非喫煙者 人数 | 816 | 978 | 967 | 875 | 650 | 456 | 258 | 5,000 |
| 非喫煙者 割合 | 94.8% | 92.4% | 94.0% | 95.4% | 95.2% | 95.4% | 95.2% | 94.4% |
| 合計 人数 | 861 | 1,058 | 1,029 | 917 | 683 | 478 | 271 | 5,297 |
| 合計 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

飲酒者の割合

国保組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 人数 | 121 | 159 | 199 | 166 | 212 | 225 | 183 | 1,265 |
| 毎日 割合 | 33.2% | 34.9% | 37.1% | 36.7% | 38.7% | 41.8% | 40.4% | 37.8% |
| 時々 人数 | 145 | 164 | 169 | 149 | 175 | 156 | 137 | 1,095 |
| 時々 割合 | 39.7% | 36.0% | 31.5% | 33.0% | 31.9% | 29.0% | 30.2% | 32.7% |
| ほとんど飲まない 人数 | 99 | 133 | 169 | 137 | 161 | 157 | 133 | 989 |
| ほとんど飲まない 割合 | 27.1% | 29.2% | 31.5% | 30.3% | 29.4% | 29.2% | 29.4% | 29.5% |
| 合計 人数 | 365 | 456 | 537 | 452 | 548 | 538 | 453 | 3,349 |
| 合計 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

国保組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 人数 | 108 | 147 | 127 | 111 | 89 | 66 | 28 | 676 |
| 毎日 割合 | 12.6% | 14.0% | 12.5% | 12.3% | 13.2% | 14.1% | 10.5% | 12.9% |
| 時々 人数 | 270 | 325 | 306 | 285 | 175 | 137 | 61 | 1,559 |
| 時々 割合 | 31.6% | 31.0% | 30.1% | 31.5% | 25.9% | 29.3% | 22.9% | 29.8% |
| ほとんど飲まない 人数 | 476 | 576 | 583 | 508 | 411 | 265 | 177 | 2,996 |
| ほとんど飲まない 割合 | 55.7% | 55.0% | 57.4% | 56.2% | 60.9% | 56.6% | 66.5% | 57.3% |
| 合計 人数 | 854 | 1,048 | 1,016 | 904 | 675 | 468 | 266 | 5,231 |
| 合計 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

5 共濟組合 (4/4)

5 共済組合

(1) 健診受診者数


| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 人数 | 5,033 | 5,499 | 5,974 | 6,304 | 4,027 | 1,754 | 413 | 29,004 |
| 男性 割合 | 17.4% | 19.0% | 20.6% | 21.7% | 13.9% | 6.0% | 1.4% | 100.0% |
| 女性 人数 | 6,772 | 7,726 | 8,075 | 7,143 | 4,500 | 1,459 | 350 | 36,025 |
| 女性 割合 | 18.8% | 21.4% | 22.4% | 19.8% | 12.5% | 4.0% | 1.0% | 100.0% |
| 計 人数 | 11,805 | 13,225 | 14,049 | 13,447 | 8,527 | 3,213 | 763 | 65,029 |
| 計 割合 | 18.2% | 20.3% | 21.6% | 20.7% | 13.1% | 4.9% | 1.2% | 100.0% |

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差


| | 男性 | | | 女性 | | | |
|-----------------------------|--------|-------|------|--------|-------|------|--|
| | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| BMI (kg/m ²) | 29,004 | 24.1 | 3.6 | 36,024 | 22.2 | 3.9 | |
| 腹囲 (cm) | 28,999 | 84.4 | 9.5 | 36,011 | 78.6 | 10.0 | |
| 収縮期血圧 (mmHg) | 25,729 | 123.4 | 15.3 | 32,035 | 118.5 | 16.7 | |
| 拡張期血圧 (mmHg) | 25,729 | 78.6 | 11.2 | 32,035 | 72.3 | 11.4 | |
| 中性脂肪 (mg/dL) | 28,997 | 117.9 | 81.8 | 36,023 | 85.3 | 49.2 | |
| HDLコレステロール (mg/dL) | 28,768 | 59.5 | 15.1 | 35,563 | 71.8 | 16.4 | |
| LDLコレステロール (mg/dL) | 28,946 | 122.5 | 29.1 | 35,889 | 122.6 | 29.7 | |
| GOT (IU/L) | 28,855 | 23.8 | 11.4 | 35,736 | 21.0 | 8.3 | |
| GPT (IU/L) | 28,855 | 26.6 | 18.2 | 35,736 | 18.6 | 12.5 | |
| γ-GTP (IU/L) | 28,915 | 43.2 | 46.8 | 35,869 | 24.9 | 24.5 | |
| 空腹時血糖 (mg/dL) | 26,879 | 100.0 | 18.1 | 31,060 | 93.0 | 13.7 | |
| HbA1c (%) | 26,652 | 5.8 | 0.7 | 30,617 | 5.6 | 0.5 | |
| 血清尿酸 (mg/dL) | 2,083 | 6.0 | 1.2 | 3,144 | 4.6 | 1.0 | |
| 血清クレアチニン (mg/dL) | 9,612 | 0.9 | 0.4 | 13,177 | 0.7 | 0.2 | |
| ヘマトクリット (%) | 10,416 | 44.6 | 3.1 | 14,403 | 40.0 | 3.3 | |
| 血色素量 (g/dL) | 10,805 | 14.9 | 1.1 | 14,904 | 13.1 | 1.2 | |
| 赤血球数 (×10 ⁴ /μL) | 10,805 | 485.0 | 41.3 | 14,907 | 440.3 | 36.9 | |

(3) 異常者等該当者割合（グラフ）


メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満（BMI25以上または腹囲基準値以上）該当者の割合




肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上


糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合




高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合




脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合




尿蛋白(+) 以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合
共済組合 (男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | |
| 非該当 | 人数 割合 | 3,884 77.2% | 3,863 70.3% | 3,814 63.9% | 3,802 60.3% | 2,341 58.1% | 972 55.5% | 237 57.4% | 18,913 65.2% |
| メタボ予備群 | 人数 割合 | 676 13.4% | 777 14.1% | 895 15.0% | 935 14.8% | 543 13.5% | 222 12.7% | 43 10.4% | 4,091 14.1% |
| メタボ該当 | 人数 割合 | 472 9.4% | 858 15.6% | 1,264 21.2% | 1,567 24.9% | 1,143 28.4% | 558 31.8% | 133 32.2% | 5,995 20.7% |
| 合計 | 人数 割合 | 5,032 100.0% | 5,498 100.0% | 5,973 100.0% | 6,304 100.0% | 4,027 100.0% | 1,752 100.0% | 413 100.0% | 28,999 100.0% |

共済組合 (女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | |
| 非該当 | 人数 割合 | 6,429 95.1% | 7,144 92.5% | 7,248 89.8% | 6,270 87.8% | 3,894 86.6% | 1,211 83.0% | 283 80.9% | 32,479 90.2% |
| メタボ予備群 | 人数 割合 | 218 3.2% | 331 4.3% | 389 4.8% | 344 4.8% | 185 4.1% | 62 4.2% | 22 6.3% | 1,551 4.3% |
| メタボ該当 | 人数 割合 | 116 1.7% | 251 3.2% | 437 5.4% | 526 7.4% | 420 9.3% | 186 12.7% | 45 12.9% | 1,981 5.5% |
| 合計 | 人数 割合 | 6,763 100.0% | 7,726 100.0% | 8,074 100.0% | 7,140 100.0% | 4,499 100.0% | 1,459 100.0% | 350 100.0% | 36,011 100.0% |

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

共済組合 (男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | |
| BMI < 25, 腹囲 < 85cm | 人数 割合 | 3,087 61.3% | 3,024 55.0% | 3,079 51.5% | 3,164 50.2% | 2,033 50.5% | 863 49.3% | 219 53.0% | 15,469 53.3% |
| BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm | 人数 割合 | 219 4.4% | 275 5.0% | 244 4.1% | 221 3.5% | 106 2.6% | 40 2.3% | 12 2.9% | 1,117 3.9% |
| BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm | 人数 割合 | 407 8.1% | 549 10.0% | 657 11.0% | 864 13.7% | 643 16.0% | 340 19.4% | 87 21.1% | 3,547 12.2% |
| BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm | 人数 割合 | 1,319 26.2% | 1,650 30.0% | 1,993 33.4% | 2,055 32.6% | 1,245 30.9% | 509 29.1% | 95 23.0% | 8,866 30.6% |
| 合計 | 人数 割合 | 5,032 100.0% | 5,498 100.0% | 5,973 100.0% | 6,304 100.0% | 4,027 100.0% | 1,752 100.0% | 413 100.0% | 28,999 100.0% |

共済組合 (女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | |
| BMI < 25, 腹囲 < 90cm | 人数 割合 | 5,613 83.0% | 6,111 79.1% | 6,311 78.2% | 5,556 77.8% | 3,472 77.2% | 1,099 75.3% | 255 72.9% | 28,417 78.9% |
| BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm | 人数 割合 | 564 8.3% | 767 9.9% | 711 8.8% | 539 7.5% | 330 7.3% | 89 6.1% | 23 6.6% | 3,023 8.4% |
| BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm | 人数 割合 | 41 0.6% | 50 0.6% | 105 1.3% | 142 2.0% | 121 2.7% | 47 3.2% | 22 6.3% | 528 1.5% |
| BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm | 人数 割合 | 545 8.1% | 798 10.3% | 947 11.7% | 903 12.6% | 575 12.8% | 224 15.4% | 50 14.3% | 4,042 11.2% |
| 合計 | 人数 割合 | 6,763 100.0% | 7,726 100.0% | 8,074 100.0% | 7,140 100.0% | 4,498 100.0% | 1,459 100.0% | 350 100.0% | 36,010 100.0% |

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
共済組合（男性）

| 肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | | |
| リスク1個以下 | 人数 | 1,453 | 1,556 | 1,552 | 1,489 | 801 | 311 | 55 | 7,217 |
| | 割合 | 74.7% | 62.9% | 53.6% | 47.4% | 40.2% | 35.0% | 28.4% | 53.3% |
| リスク2個以上 | 人数 | 492 | 918 | 1,342 | 1,651 | 1,193 | 578 | 139 | 6,313 |
| | 割合 | 25.3% | 37.1% | 46.4% | 52.6% | 59.8% | 65.0% | 71.6% | 46.7% |
| 合計 | 人数 | 1,945 | 2,474 | 2,894 | 3,140 | 1,994 | 889 | 194 | 13,530 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| 非肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | | |
| リスク1個以下 | 人数 | 2,945 | 2,713 | 2,627 | 2,413 | 1,382 | 545 | 125 | 12,750 |
| | 割合 | 95.4% | 89.7% | 85.3% | 76.3% | 68.0% | 63.2% | 57.1% | 82.4% |
| リスク2個以上 | 人数 | 142 | 311 | 452 | 751 | 651 | 318 | 94 | 2,719 |
| | 割合 | 4.6% | 10.3% | 14.7% | 23.7% | 32.0% | 36.8% | 42.9% | 17.6% |
| 合計 | 人数 | 3,087 | 3,024 | 3,079 | 3,164 | 2,033 | 863 | 219 | 15,469 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

共済組合（女性）

| 肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | | |
| リスク1個以下 | 人数 | 970 | 1,225 | 1,126 | 848 | 459 | 127 | 34 | 4,789 |
| | 割合 | 84.3% | 75.9% | 63.9% | 53.5% | 44.7% | 35.3% | 35.8% | 63.1% |
| リスク2個以上 | 人数 | 180 | 390 | 637 | 736 | 567 | 233 | 61 | 2,804 |
| | 割合 | 15.7% | 24.1% | 36.1% | 46.5% | 55.3% | 64.7% | 64.2% | 36.9% |
| 合計 | 人数 | 1,150 | 1,615 | 1,763 | 1,584 | 1,026 | 360 | 95 | 7,593 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| 非肥満 | 年代別 | | | | | | | 合計 | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | | |
| リスク1個以下 | 人数 | 5,546 | 5,927 | 5,854 | 4,763 | 2,663 | 731 | 140 | 25,624 |
| | 割合 | 98.8% | 97.0% | 92.8% | 85.7% | 76.7% | 66.5% | 54.9% | 90.2% |
| リスク2個以上 | 人数 | 67 | 184 | 457 | 793 | 809 | 368 | 115 | 2,793 |
| | 割合 | 1.2% | 3.0% | 7.2% | 14.3% | 23.3% | 33.5% | 45.1% | 9.8% |
| 合計 | 人数 | 5,613 | 6,111 | 6,311 | 5,556 | 3,472 | 1,099 | 255 | 28,417 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

糖尿病有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | | |
| 非該当 | 人数 | 4,504 | 4,600 | 4,568 | 4,329 | 2,495 | 1,047 | 230 | 21,773 |
| | 割合 | 90.0% | 84.1% | 76.8% | 69.0% | 62.6% | 60.6% | 56.1% | 75.6% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 344 | 567 | 796 | 1,090 | 753 | 324 | 76 | 3,950 |
| | 割合 | 6.9% | 10.4% | 13.4% | 17.4% | 18.9% | 18.8% | 18.5% | 13.7% |
| 糖尿病有病者 | 人数 | 155 | 300 | 581 | 857 | 736 | 357 | 104 | 3,090 |
| | 割合 | 3.1% | 5.5% | 9.8% | 13.7% | 18.5% | 20.7% | 25.4% | 10.7% |
| 合計 | 人数 | 5,003 | 5,467 | 5,945 | 6,276 | 3,984 | 1,728 | 410 | 28,813 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

共済組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | | |
| 非該当 | 人数 | 6,308 | 6,932 | 6,754 | 5,534 | 3,345 | 1,002 | 216 | 30,091 |
| | 割合 | 94.1% | 90.8% | 84.5% | 78.2% | 75.1% | 69.3% | 62.4% | 84.4% |
| 糖尿病予備群 | 人数 | 311 | 549 | 929 | 1,150 | 758 | 287 | 72 | 4,056 |
| | 割合 | 4.6% | 7.2% | 11.6% | 16.2% | 17.0% | 19.8% | 20.8% | 11.4% |
| 糖尿病有病者 | 人数 | 84 | 157 | 311 | 394 | 349 | 157 | 58 | 1,510 |
| | 割合 | 1.3% | 2.1% | 3.9% | 5.6% | 7.8% | 10.9% | 16.8% | 4.2% |
| 合計 | 人数 | 6,703 | 7,638 | 7,994 | 7,078 | 4,452 | 1,446 | 346 | 35,657 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している 人数 割合 | 78 1. 5% | 162 2. 9% | 329 5. 5% | 567 9. 0% | 467 11. 6% | 237 13. 5% | 61 14. 8% | 1, 901 6. 6% |
| 服用していない 人数 割合 | 4, 955 98. 5% | 5, 336 97. 1% | 5, 645 94. 5% | 5, 737 91. 0% | 3, 560 88. 4% | 1, 514 86. 5% | 352 85. 2% | 27, 099 93. 4% |
| 合計 人数 割合 | 5, 033 100. 0% | 5, 498 100. 0% | 5, 974 100. 0% | 6, 304 100. 0% | 4, 027 100. 0% | 1, 751 100. 0% | 413 100. 0% | 29, 000 100. 0% |

共済組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している 人数 割合 | 43 0. 6% | 87 1. 1% | 175 2. 2% | 230 3. 2% | 208 4. 6% | 84 5. 8% | 31 8. 9% | 858 2. 4% |
| 服用していない 人数 割合 | 6, 728 99. 4% | 7, 638 98. 9% | 7, 900 97. 8% | 6, 910 96. 8% | 4, 292 95. 4% | 1, 375 94. 2% | 319 91. 1% | 35, 162 97. 6% |
| 合計 人数 割合 | 6, 771 100. 0% | 7, 725 100. 0% | 8, 075 100. 0% | 7, 140 100. 0% | 4, 500 100. 0% | 1, 459 100. 0% | 350 100. 0% | 36, 020 100. 0% |

高血圧症有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 人数 割合 | 3, 360 74. 5% | 3, 102 61. 4% | 2, 892 52. 6% | 2, 404 42. 6% | 1, 216 33. 3% | 504 30. 0% | 79 20. 4% | 13, 557 51. 3% |
| 高血圧症予備群 人数 割合 | 520 11. 5% | 654 13. 0% | 692 12. 6% | 680 12. 1% | 449 12. 3% | 202 12. 0% | 51 13. 2% | 3, 248 12. 3% |
| 高血圧症有病者 人数 割合 | 632 14. 0% | 1, 293 25. 6% | 1, 913 34. 8% | 2, 554 45. 3% | 1, 985 54. 4% | 972 57. 9% | 257 66. 4% | 9, 606 36. 4% |
| 合計 人数 割合 | 4, 512 100. 0% | 5, 049 100. 0% | 5, 497 100. 0% | 5, 638 100. 0% | 3, 650 100. 0% | 1, 678 100. 0% | 387 100. 0% | 26, 411 100. 0% |

共済組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 人数 割合 | 5, 216 86. 3% | 5, 403 77. 7% | 5, 024 68. 9% | 3, 854 60. 7% | 2, 111 51. 2% | 540 39. 3% | 102 30. 9% | 22, 255 68. 5% |
| 高血圧症予備群 人数 割合 | 369 6. 1% | 599 8. 6% | 769 10. 6% | 675 10. 6% | 498 12. 1% | 203 14. 8% | 37 11. 2% | 3, 150 9. 7% |
| 高血圧症有病者 人数 割合 | 457 7. 6% | 951 13. 7% | 1, 494 20. 5% | 1, 825 28. 7% | 1, 517 36. 8% | 632 46. 0% | 191 57. 9% | 7, 067 21. 8% |
| 合計 人数 割合 | 6, 042 100. 0% | 6, 958 100. 0% | 7, 287 100. 0% | 6, 354 100. 0% | 4, 126 100. 0% | 1, 375 100. 0% | 330 100. 0% | 32, 472 100. 0% |

血圧を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 233 4.6% | 638 11.6% | 1,117 18.7% | 1,797 28.5% | 1,487 36.9% | 749 42.8% | 207 50.1% | 6,228 21.5% |
| 服用していない | 4,800 95.4% | 4,860 88.4% | 4,857 81.3% | 4,507 71.5% | 2,540 63.1% | 1,002 57.2% | 206 49.9% | 22,772 78.5% |
| 合計 | 5,033 100.0% | 5,498 100.0% | 5,974 100.0% | 6,304 100.0% | 4,027 100.0% | 1,751 100.0% | 413 100.0% | 29,000 100.0% |

共済組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 168 2.5% | 440 5.7% | 839 10.4% | 1,144 16.0% | 996 22.1% | 438 30.0% | 138 39.4% | 4,163 11.6% |
| 服用していない | 6,603 97.5% | 7,285 94.3% | 7,236 89.6% | 5,996 84.0% | 3,504 77.9% | 1,021 70.0% | 212 60.6% | 31,857 88.4% |
| 合計 | 6,771 100.0% | 7,725 100.0% | 8,075 100.0% | 7,140 100.0% | 4,500 100.0% | 1,459 100.0% | 350 100.0% | 36,020 100.0% |

脂質異常症有病者の割合

共済組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 2,793 55.8% | 2,680 48.9% | 2,723 45.7% | 2,686 42.7% | 1,625 40.6% | 704 40.3% | 171 41.5% | 13,382 46.3% |
| 脂質異常有病者 | 2,215 44.2% | 2,799 51.1% | 3,232 54.3% | 3,599 57.3% | 2,380 59.4% | 1,044 59.7% | 241 58.5% | 15,510 53.7% |
| 合計 | 5,008 100.0% | 5,479 100.0% | 5,955 100.0% | 6,285 100.0% | 4,005 100.0% | 1,748 100.0% | 412 100.0% | 28,892 100.0% |

共済組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 5,387 80.6% | 5,518 72.2% | 4,564 56.9% | 3,106 43.7% | 1,700 38.0% | 499 34.3% | 121 34.8% | 20,895 58.5% |
| 脂質異常有病者 | 1,300 19.4% | 2,126 27.8% | 3,454 43.1% | 3,994 56.3% | 2,772 62.0% | 957 65.7% | 227 65.2% | 14,830 41.5% |
| 合計 | 6,687 100.0% | 7,644 100.0% | 8,018 100.0% | 7,100 100.0% | 4,472 100.0% | 1,456 100.0% | 348 100.0% | 35,725 100.0% |

コレステロールを下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 332 6.6% | 614 11.2% | 1,025 17.2% | 1,381 21.9% | 1,121 27.8% | 541 30.9% | 141 34.1% | 5,155 17.8% |
| 服用していない | 4,701 93.4% | 4,884 88.8% | 4,949 82.8% | 4,923 78.1% | 2,906 72.2% | 1,210 69.1% | 272 65.9% | 23,845 82.2% |
| 合計 | 5,033 100.0% | 5,498 100.0% | 5,974 100.0% | 6,304 100.0% | 4,027 100.0% | 1,751 100.0% | 413 100.0% | 29,000 100.0% |

共済組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 服用している | 140 2.1% | 351 4.5% | 819 10.1% | 1,435 20.1% | 1,337 29.7% | 534 36.6% | 152 43.4% | 4,768 13.2% |
| 服用していない | 6,631 97.9% | 7,374 95.5% | 7,256 89.9% | 5,706 79.9% | 3,163 70.3% | 925 63.4% | 198 56.6% | 31,253 86.8% |
| 合計 | 6,771 100.0% | 7,725 100.0% | 8,075 100.0% | 7,141 100.0% | 4,500 100.0% | 1,459 100.0% | 350 100.0% | 36,021 100.0% |

尿蛋白(+) 以上の割合

共済組合（男性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 4,766 | 5,149 | 5,565 | 5,921 | 3,734 | 1,590 | 360 | 27,085 |
| | 割合 | 98.8% | 98.7% | 98.1% | 98.1% | 97.8% | 97.7% | 94.2% | 98.2% |
| 尿蛋白(+) 以上 | 人数 | 60 | 69 | 108 | 117 | 83 | 37 | 22 | 496 |
| | 割合 | 1.2% | 1.3% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.3% | 5.8% | 1.8% |
| 合計 | 人数 | 4,826 | 5,218 | 5,673 | 6,038 | 3,817 | 1,627 | 382 | 27,581 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

共済組合（女性）

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 6,251 | 7,114 | 7,460 | 6,618 | 4,133 | 1,295 | 288 | 33,159 |
| | 割合 | 99.1% | 99.0% | 99.2% | 99.3% | 99.2% | 98.9% | 98.0% | 99.1% |
| 尿蛋白(+) 以上 | 人数 | 58 | 71 | 59 | 44 | 33 | 14 | 6 | 285 |
| | 割合 | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 1.1% | 2.0% | 0.9% |
| 合計 | 人数 | 6,309 | 7,185 | 7,519 | 6,662 | 4,166 | 1,309 | 294 | 33,444 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

習慣的喫煙者の割合

共済組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 1, 069 | 1, 217 | 1, 340 | 1, 309 | 762 | 261 | 53 | 6, 011 |
| | 21. 2% | 22. 1% | 22. 4% | 20. 8% | 18. 9% | 14. 9% | 12. 8% | 20. 7% |
| 非喫煙者 | 3, 964 | 4, 281 | 4, 634 | 4, 995 | 3, 265 | 1, 490 | 360 | 22, 989 |
| | 78. 8% | 77. 9% | 77. 6% | 79. 2% | 81. 1% | 85. 1% | 87. 2% | 79. 3% |
| 合計 | 5, 033 | 5, 498 | 5, 974 | 6, 304 | 4, 027 | 1, 751 | 413 | 29, 000 |
| | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 喫煙者 | 174 | 250 | 250 | 146 | 120 | 35 | 10 | 985 |
| | 2. 6% | 3. 2% | 3. 1% | 2. 0% | 2. 7% | 2. 4% | 2. 9% | 2. 7% |
| 非喫煙者 | 6, 598 | 7, 476 | 7, 825 | 6, 995 | 4, 380 | 1, 424 | 340 | 35, 038 |
| | 97. 4% | 96. 8% | 96. 9% | 98. 0% | 97. 3% | 97. 6% | 97. 1% | 97. 3% |
| 合計 | 6, 772 | 7, 726 | 8, 075 | 7, 141 | 4, 500 | 1, 459 | 350 | 36, 023 |
| | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

飲酒者の割合

共済組合（男性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 702 | 1, 014 | 1, 265 | 1, 594 | 1, 221 | 580 | 134 | 6, 510 |
| | 17. 2% | 21. 2% | 23. 6% | 28. 3% | 31. 7% | 35. 8% | 35. 1% | 25. 3% |
| 時々 | 1, 833 | 1, 996 | 2, 071 | 2, 062 | 1, 255 | 488 | 96 | 9, 801 |
| | 44. 9% | 41. 8% | 38. 7% | 36. 6% | 32. 6% | 30. 1% | 25. 1% | 38. 2% |
| ほとんど飲まない | 1, 544 | 1, 762 | 2, 019 | 1, 978 | 1, 370 | 552 | 152 | 9, 377 |
| | 37. 9% | 36. 9% | 37. 7% | 35. 1% | 35. 6% | 34. 1% | 39. 8% | 36. 5% |
| 合計 | 4, 079 | 4, 772 | 5, 355 | 5, 634 | 3, 846 | 1, 620 | 382 | 25, 688 |
| | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |

共済組合（女性）

| | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 毎日 | 418 | 630 | 724 | 541 | 353 | 128 | 24 | 2, 818 |
| | 6. 8% | 8. 8% | 9. 5% | 8. 0% | 8. 2% | 9. 3% | 7. 4% | 8. 4% |
| 時々 | 1, 969 | 2, 273 | 2, 311 | 1, 980 | 1, 177 | 320 | 66 | 10, 096 |
| | 32. 3% | 31. 8% | 30. 3% | 29. 2% | 27. 3% | 23. 4% | 20. 4% | 30. 0% |
| ほとんど飲まない | 3, 716 | 4, 246 | 4, 592 | 4, 253 | 2, 778 | 922 | 233 | 20, 740 |
| | 60. 9% | 59. 4% | 60. 2% | 62. 8% | 64. 5% | 67. 3% | 72. 1% | 61. 6% |
| 合計 | 6, 103 | 7, 149 | 7, 627 | 6, 774 | 4, 308 | 1, 370 | 323 | 33, 654 |
| | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% | 100. 0% |