

# チャノキイロアザミウマ発生時期予測

令和8年4月23日  
静岡県病害虫防除所

多くのかんきつ産地におけるチャノキイロアザミウマの発生時期は、以下のとおりと予想されます。


**第1世代成虫： 5月1日～15日**  
**第2世代成虫： 6月2日～16日**

(4月22日以降の気温が平年並で推移した場合)


(昨年より4～7日程度早い。産地ごとの発生時期は次頁参照)

- ・第1世代はかんきつへの被害はありませんが、かきでは防除が必要です。
- ・かんきつでは、第2世代以降の発生時期に防除を実施してください。
- ・今後の気温が平年より高く推移した場合、発生時期は数日早まります。
- ・防除対象園地の標高が、同地域のアメダス地点より100m高い(低い)場合、発生時期は数日遅く(早く)なります。

# チャノキイロアザミウマ第1世代 発生時期予測



# チャノキイロアザミウマ第2世代 発生時期予測



# 予測に用いるアメダス地点と標高

シミュレーションによる発生予察はアメダスの気象データを用いています。ほ場とアメダス地点の標高が異なる場合はチャノキイロアザミウマの発生時期にズレが生じることから、補正する必要があります。標高が100m高くなるごとに0.6℃低くなると仮定すると、発生時期は5～6日遅くなります(世代により異なる)。

