

IV 作物別主要病害虫の程度別発生面積と発生程度

1 普通作物

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,300ha (早期面積：2,260ha))														
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度			平年値	発生程度		
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値		平均	標準偏差	平年値
いもち病(稈いもち)	田	6月	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
	方	7月	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
	平	8月	0	0	0	0	9	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	平	9月	0	0	0	0	8	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
	部	7月	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	29	29	1	1.7	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	10	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	榎	8月	0	0	0	0	14	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	原	9月	0	0	43	43	14	1.7	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	10	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	18	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	西	8月	0	0	17	17	17	0.7	1.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
いもち病(穂いもち)	部	9月	0	0	0	0	19	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	26	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	早	8月	0	0	13	13	12	7.5	14.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	0	12	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	体	8月	0	0	3	12	11	2.2	7.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	9月	0	0	0	14	14	12	0.5	1.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	田	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	方	7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—
	平	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	平	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	東	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	部	7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—
いもち病(穂いもち)	高	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	冷	9月	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—
	志	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	太	7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—
	榎	8月	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—
	原	9月	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	—
	中	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	遠	7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—
	西	8月	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—
	部	9月	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	—
	中	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	遠	7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—
	早	8月	0	0	0	0	6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	—
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	全	7月	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—
	体	8月	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	—
	9月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—

(巡回調査結果)

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,300ha (早期面積：2,260ha))														
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度			平年値	発生程度		
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値		平均	標準偏差	平年値
白葉枯病	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	志	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	榎	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
紋枯病	部	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	体	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	田	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	方	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	冷	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
紋枯病	志	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	太	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	榎	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	原	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	西	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	部	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	遠	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	早	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	体	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15,300ha (早期面積: 2,260ha))														
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度						
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値				
葉枯病	田方平坦	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.1			
		8月	0	0	0	17	5		0.7	1.5	0.1			
		9月	0	0	0	0	8		0.0	0.0	0.7			
	東部高冷	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.1			
		8月	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.1			
		9月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0			
	志太榛原	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0			
	8月	0	0	0	14	3	0.6		1.4	0.5				
	9月	0	0	0	0	4	0.0		0.0	0.3				
中遠西部	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0				
	7月	0	0	0	0	6		0.0	0.0	0.4				
	8月	0	0	0	0	11		0.0	0.0	1.4				
	9月	0	0	0	0	10		0.0	0.0	1.8				
中遠早期	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0				
	7月	0	0	0	0	6		0.0	0.0	0.3				
	8月	0	0	0	0	9		0.0	0.0	0.5				
	9月	—	—	—	—	—		—	—	—				
もみ枯細菌病	県全体	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	3		0.0	0.0	0.2			
		8月	0	0	0	6	6		0.2	0.9	0.6			
		9月	0	0	0	0	6		0.0	0.0	0.7			
	田方平坦	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0			
		8月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0			
		9月	0	0	0	0	17		0.0	0.0	1.4			
	東部高冷	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0			
	8月	0	0	0	14	4	0.6		1.4	0.7				
	9月	0	0	0	0	3	0.0		0.0	0.3				
志太榛原	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0				
	7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0				
	8月	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.0				
	9月	0	0	0	0	26		0.0	0.0	2.6				
中遠西部	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0				
	7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0				
	8月	0	0	0	0	6		0.0	0.0	0.6				
	9月	0	0	0	0	17		0.0	0.0	1.8				
中遠早期	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0				
	7月	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.1				
	8月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.1				
	9月	—	—	—	—	—		—	—	—				
県全体	6月	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0				
	7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0				
	8月	0	0	0	3	3		0.1	0.7	0.3				
	9月	0	0	0	0	16		0.0	0.0	1.6				

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15,300ha (早期面積: 2,260ha))														
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度						
			甚	多	中	少		計	平年値	平均	標準偏差	平年値		
萎縮病	田方平坦	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
	東部高冷	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
	志太榛原	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1			
萎縮病		8月	0	0	0	14	14	4	0.6	1.4	0.2			
		9月	0	0	0	0	8	0	0.0	0.0	1.1			
	中遠西部	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
	中遠早期	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		8月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
びま葉枯病	県全体	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		8月	0	0	0	3	3	1	0.1	0.7	0.0			
		9月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.3			
	田方平坦	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.2			
		8月	0	0	0	17	17	16	0.7	1.5	1.2			
		9月	0	0	0	17	17	16	1.3	3.0	2.2			
	東部高冷	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1			
びま葉枯病		8月	0	0	0	14	14	17	0.6	1.4	1.4			
		9月	0	0	0	0	0	20	0.0	0.0	2.6			
	志太榛原	6月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
		7月	0	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.8			
		8月	0	0	0	57	57	44	4.6	4.0	8.0			
		9月	0	0	29	57	86	69	32.0	27.6	22.4			
	中遠西部	6月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1			
		7月	0	0	20	60	80	20	20.0	20.7	3.7			
		8月	0	50	0	50	100	61	68.0	32.3	22.2			
		9月	0	60	0	40	100	91	75.2	30.4	54.3			
びま葉枯病	中遠早期	6月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.2			
		7月	0	20	40	20	80	37	47.2	36.6	10.3			
		8月	0	88	0	13	100	86	88.5	23.2	42.4			
		9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	県全体	6月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1			
		7月	0	4	12	16	32	14	13.4	26.4	3.0			
		8月	0	29	0	29	59	45	34.0	42.7	14.6			
		9月	0	14	9	32	55	48	27.6	36.1	20.2			

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15,300ha (早期面積: 2,260ha))													
病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度			平均	標準偏差	平年値
			甚	多	中	少	計						
稲こうじ病	田方平	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	方平	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平	8月	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	坦	9月	0	0	0	0	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	東部	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	冷	9月	0	0	0	25	51	1.0	1.7	5.5	0.0	0.0	0.5
	志太	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	原	9月	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	0.4
	中遠	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	西部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ばか苗病	中部	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	部	9月	0	0	0	20	8	1.6	3.2	0.6	0.8	1.6	0.9
	中遠	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	早期	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	早	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
	期	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県全体	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3
		9月	0	0	0	9	20	0.5	1.8	2.1	0.4	1.1	0.5
	田方平	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	坦	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	0.9
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.2	1.5
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.7	1.2
稲こうじ病	東部	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.3
	高	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	0.3
	冷	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	志太	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	大	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.0
	榛	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.6	1.1
	原	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	0.9
	中遠	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	西部	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7
	部	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.7	1.7
	中遠	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	0.8
	早期	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7
	早	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.8
	期	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.8
稲こうじ病	県全体	9月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
		7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.7
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	1.1
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	0.8

※ ばか苗病の平年値は、過去7ヵ年 (H28～R4年度) の平均値

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15,300ha (早期面積: 2,260ha))													
病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率(%)				調査 項目	発生程度			平均	標準偏差	平年値
			甚	多	中	少	計						
ニカメイガ	田方平	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	方平	7月	0	0	0	0	2	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	平	8月	0	0	0	0	2	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	坦	9月	0	0	0	0	5	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	東部	6月	0	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	部	7月	0	0	0	0	1	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高	8月	0	0	0	0	7	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	冷	9月	0	0	0	0	8	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	志太	6月	0	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大	7月	0	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	榛	8月	0	0	0	0	2	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	原	9月	0	0	0	14	11	被害株率(%)	0.6	1.4	0.4	0.4	0.4
	中遠	6月	0	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	西部	7月	0	0	0	0	2	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ヒメトビウンカ	中部	8月	0	0	0	0	3	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	部	9月	0	0	0	20	12	被害株率(%)	0.8	1.6	0.9	0.9	0.9
	中遠	6月	0	0	0	0	2	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	早期	7月	0	0	0	0	3	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	早	8月	0	0	0	0	10	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
	期	9月	—	—	—	—	—	被害株率(%)	—	—	—	—	—
	県全体	6月	0	0	0	0	1	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		7月	0	0	0	0	2	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	0	5	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
		9月	0	0	0	9	9	被害株率(%)	0.4	1.1	0.5	0.5	0.5
	田方平	6月	0	0	0	0	8	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	坦	7月	0	0	0	80	37	最高寄生数/株	1.8	1.7	0.9	0.9	0.9
		8月	0	0	33	67	59	最高寄生数/株	3.5	2.2	1.5	1.5	1.5
		9月	0	0	100	100	58	最高寄生数/株	2.3	0.7	1.2	1.2	1.2
稲こうじ病	東部	6月	0	0	0	0	6	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	部	7月	0	0	0	40	24	最高寄生数/株	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3
	高	8月	0	0	0	86	24	最高寄生数/株	1.3	0.7	0.3	0.3	0.3
	冷	9月	0	0	0	0	22	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	志太	6月	0	0	0	0	6	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	大	7月	0	0	0	60	38	最高寄生数/株	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0
	榛	8月	0	0	0	86	54	最高寄生数/株	2.1	1.6	1.1	1.1	1.1
	原	9月	0	0	0	100	58	最高寄生数/株	1.6	1.0	0.9	0.9	0.9
	中遠	6月	0	0	0	0	15	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	西部	7月	0	0	0	20	36	最高寄生数/株	0.2	0.4	0.7	0.7	0.7
	部	8月	0	0	0	100	63	最高寄生数/株	1.7	0.7	1.7	1.7	1.7
	中遠	9月	0	0	0	80	48	最高寄生数/株	1.6	1.4	0.8	0.8	0.8
	早期	6月	0	0	0	20	27	最高寄生数/株	0.2	0.4	0.7	0.7	0.7
	早	7月	0	0	0	40	38	最高寄生数/株	0.4	0.5	0.8	0.8	0.8
	期	8月	0	0	0	63	44	最高寄生数/株	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
稲こうじ病	県全体	9月	—	—	—	—	—	最高寄生数/株	—	—	—	—	—
		6月	0	0	0	4	12	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3
		7月	0	0	0	48	34	最高寄生数/株	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7
		8月	0	0	6	79	49	最高寄生数/株	1.8	1.6	1.1	1.6	1.1
		9月	0	0	0	77	49	最高寄生数/株	1.5	1.2	0.8	1.2	0.8

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15,300ha (早期面積: 2,260ha))													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度					
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値			
ツマゲロコヨバイ	田方平坦	6月	0	0	0	0	2	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	24		0.0	0.0	0.6		
		8月	0	0	0	100	60		1.8	0.7	1.6		
		9月	0	0	0	100	71		2.3	1.2	2.2		
	東部高冷	6月	0	0	0	0	0	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.1		
		8月	0	0	0	14	4		0.1	0.3	0.1		
		9月	0	0	0	0	13		0.0	0.0	0.2		
	志太榛原	6月	0	0	0	25	12	最高寄生数/株	0.3	0.4	0.4		
		7月	0	0	0	20	40		0.4	0.8	1.3		
斑点米カメムシ類	中遠西部	8月	0	0	10	57	67	最高寄生数/株	0.6	0.5	0.9		
		9月	0	0	0	14	31		0.3	0.7	0.5		
	中遠中部	6月	0	0	0	0	3	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.1		
		7月	0	0	0	0	26		0.0	0.0	0.6		
		8月	0	0	0	17	37		0.3	0.7	0.9		
		9月	0	0	0	20	43		0.4	0.8	0.7		
	中遠早期	6月	0	0	0	0	5	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.1		
		7月	0	0	0	0	10		0.0	0.0	0.1		
		8月	0	0	0	0	12		0.0	0.0	0.3		
		9月	—	—	—	—	—		—	—	—		
田方平坦	県全体	6月	0	0	0	4	4	最高寄生数/株	0.0	0.2	0.1		
		7月	0	0	0	4	21		0.1	0.4	0.5		
		8月	0	0	0	35	30		0.5	0.8	0.8		
		9月	0	0	0	36	43		0.8	1.3	1.0		
	東部高冷	6月	—	—	—	—	—	すくい取り虫数30回/振	—	—	—		
		7月	—	—	—	—	—		—	—	—		
		8月	0	14	29	43	28		1.3	2.4	1.3		
		9月	0	0	50	50	35		0.5	0.5	0.7		
	志太榛原	6月	—	—	—	—	—	すくい取り虫数30回/振	—	—	—		
		7月	—	—	—	—	—		—	—	—		
中遠早期	県全体	8月	0	29	14	43	28	最高寄生数30回/振	2.3	3.3	0.8		
		9月	0	13	63	75	25		2.8	3.0	1.1		
	中遠西部	6月	—	—	—	—	—	すくい取り虫数30回/振	—	—	—		
		7月	—	—	—	—	—		—	—	—		
		8月	0	0	0	0	32		0.0	0.0	1.4		
		9月	0	20	60	80	46		4.8	5.8	2.1		
	中遠早期	6月	—	—	—	—	—	すくい取り虫数30回/振	—	—	—		
		7月	—	—	—	—	—		—	—	—		
		8月	0	0	33	33	49		0.3	0.5	1.5		
		9月	—	—	—	—	0		—	—	0.0		
田方平坦	県全体	6月	—	—	—	—	—	すくい取り虫数30回/振	—	—	—		
		7月	—	—	—	—	—		—	—	—		
		8月	0	9	26	34	33		1.0	2.1	1.5		
		9月	0	13	4	57	35		3.7	5.5	1.4		

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15,300ha (早期面積: 2,260ha))													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度					
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値			
トビイロウンカ	田方平坦	6月	0	0	0	0	0	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	5		0.0	0.0	0.1		
		9月	0	0	17	17	20		0.2	0.4	0.7		
	東部高冷	6月	0	0	0	0	0	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.0		
		9月	0	0	0	0	7		0.0	0.0	0.1		
	志太榛原	6月	0	0	0	0	0	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.0		
セジロウンカ	中遠西部	6月	0	0	0	0	0	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	7		0.0	0.0	0.1		
		9月	0	0	0	0	14		0.0	0.0	0.3		
	中遠早期	6月	0	0	0	0	0	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0		
		9月	—	—	—	—	—		—	—	—		
	県全体	6月	0	0	0	0	0	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
	8月	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.1			
	9月	0	0	5	5	16		0.0	0.2	0.7			
田方平坦	6月	0	0	0	0	1	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0			
	7月	0	0	20	20	38		0.4	0.8	0.9			
	8月	0	0	100	100	78		6.3	4.1	4.4			
	9月	0	0	83	83	61		1.7	1.1	1.3			
東部高冷	6月	0	0	0	0	2	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0			
	7月	0	0	0	0	19		0.0	0.0	0.2			
	8月	0	0	29	29	35		1.0	1.6	0.5			
	9月	0	0	0	0	15		0.0	0.0	0.2			
志太榛原	6月	0	0	0	0	3	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0			
	7月	0	0	0	0	56		0.0	0.0	1.2			
	8月	0	0	43	43	64		1.0	1.7	1.9			
	9月	0	0	14	14	54		0.1	0.3	1.2			
中遠西部	6月	0	0	0	0	2	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0			
	7月	0	0	0	0	46		0.0	0.0	1.1			
	8月	0	0	33	33	71		0.3	0.5	2.7			
	9月	0	0	60	60	63		2.2	3.0	2.7			
中遠早期	6月	0	0	0	0	2	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.1			
	7月	0	0	0	0	29		0.0	0.0	0.6			
	8月	0	0	0	0	43		0.0	0.0	0.8			
	9月	—	—	—	—	—		—	—	—			
県全体	6月	0	0	0	0	2	最高寄生数/株	0.0	0.0	0.0			
	7月	0	0	4	4	38		0.1	0.4	0.8			
	8月	0	0	38	38	58		1.6	3.0	2.1			
	9月	0	0	41	41	52		1.0	1.8	1.4			

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15,300ha (早期面積: 2,260ha))													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度					
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値			
コブノメイガ	田方平坦	6月	0	0	0	0	0	被害株率 (%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.2		
		8月	0	0	0	0	34		0.0	0.0	5.4		
		9月	0	0	0	0	31		0.0	0.0	9.5		
	東部高冷	6月	0	0	0	0	1	被害株率 (%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.5		
		9月	0	0	0	0	12		0.0	0.0	1.5		
	志太榛原	6月	0	0	0	0	0	被害株率 (%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.6		
イネミズゾウムシ	中遠西部	6月	0	0	0	14	25	被害株率 (%)	2.3	5.6	4.9		
		7月	0	0	0	0	24		0.0	0.0	5.9		
		8月	0	0	0	0	28		0.0	0.0	0.1		
		9月	0	0	0	40	7	被害株率 (%)	0.0	0.0	0.2		
	中遠早期	6月	0	0	0	0	0	被害株率 (%)	1.6	2.0	7.3		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.2		
		9月	0	0	0	0	7	被害株率 (%)	0.0	0.0	0.6		
	県全体	6月	0	0	0	0	1	被害株率 (%)	—	—	—		
		7月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0		
イネミズゾウムシ	田方平坦	6月	0	25	0	50	47	被害株率 (%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	19		0.0	0.0	0.2		
		8月	0	0	0	0	25		0.5	2.7	2.6		
		9月	0	0	0	9	9	被害株率 (%)	0.4	1.1	6.4		
	東部高冷	6月	0	40	0	0	5	被害株率 (%)	11.0	14.5	12.6		
		7月	0	0	0	0	40		0.0	0.0	5.3		
		8月	0	0	0	0	14		0.0	0.0	1.6		
		9月	0	0	0	0	5	被害株率 (%)	0.0	0.0	0.4		
	志太榛原	6月	0	0	0	0	91	被害株率 (%)	15.2	18.7	31.1		
		7月	0	0	40	0	45		9.6	12.0	4.6		

イネ (調査点数: 50点, 栽培面積: 15,300ha (早期面積: 2,260ha))													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度					
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値			
イチモンジセセリ	田方平坦	6月	0	0	0	0	1	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	28		0.0	0.0	0.8		
		9月	0	0	0	0	7		0.0	0.0	0.1		
	東部高冷	6月	0	0	0	0	3	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	5		0.0	0.0	0.1		
		8月	0	0	0	0	5		0.0	0.0	0.0		
		9月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
	志太榛原	6月	0	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.0		
アヲヨトウ	中遠西部	6月	0	0	0	0	14	被害株率(%)	0.3	0.7	0.7		
		7月	0	0	0	0	15		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.1		
		9月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
	中遠早期	6月	0	0	0	0	0	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0		
		9月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0		
	県全体	6月	0	0	0	0	1	被害株率(%)	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.0		
アヲヨトウ	田方平坦	6月	0	0	0	0	0	25株当り寄生数	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		9月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
	東部高冷	6月	0	0	0	0	0	25株当り寄生数	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		9月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
	志太榛原	6月	0	0	0	0	0	25株当り寄生数	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
アヲヨトウ	中遠西部	6月	0	0	0	0	0	25株当り寄生数	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		9月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
	中遠早期	6月	0	0	0	0	0	25株当り寄生数	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		8月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
		9月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
	県全体	6月	0	0	0	0	0	25株当り寄生数	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,300ha (早期面積：2,260ha))												
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値		
スクミリンゴガイ	田方平坦	6月					0	3	—			—
		7月					0	3	—			—
		8月					0	0	—			—
		9月					0	0	—			—
	東部高冷	6月					0	1	—			—
		7月					0	1	—			—
		8月					0	1	—			—
		9月					0	0	—			—
	志太榛原	6月					100	90	—			—
		7月					40	92	—			—
		8月					71	92	—			—
		9月					71	74	—			—
	中遠西部	6月					60	46	—			—
		7月					40	52	—			—
		8月					17	32	—			—
		9月					40	20	—			—
中遠早期	6月					20	42	—			—	
	7月					40	45	—			—	
	8月					38	37	—			—	
	9月					—	—	—			—	
県全体	6月					35	38	—			—	
	7月					24	39	—			—	
	8月					26	33	—			—	
	9月					32	24	—			—	
イネドロオイムシ	田方平坦	6月					—	—	被害株率(%)	—		—
		7月					—	—	—	—		—
		8月					—	—	—	—		—
		9月					—	—	—	—		—
	東部高冷	6月	0	0	20	0	20	13	被害株率(%)	5.6	11.2	1.8
		7月	0	0	0	0	—	29	被害株率(%)	0.0	0.0	6.3
		8月					—	—	—	—		—
		9月					—	—	—	—		—
	志太榛原	6月					—	—	被害株率(%)	—		—
		7月					—	—	—	—		—
		8月					—	—	被害株率(%)	—		—
		9月					—	—	—	—		—
	中遠西部	6月					—	—	被害株率(%)	—		—
		7月					—	—	—	—		—
		8月					—	—	被害株率(%)	—		—
		9月					—	—	—	—		—
中遠早期	6月					—	—	被害株率(%)	—		—	
	7月					—	—	—	—		—	
	8月					—	—	被害株率(%)	—		—	
	9月					—	—	—	—		—	
県全体	6月					—	—	被害株率(%)	—		—	
	7月					—	—	—	—		—	
	8月					—	—	被害株率(%)	—		—	
	9月					—	—	—	—		—	

イネ (調査点数：50点、栽培面積：15,300ha (早期面積：2,260ha))												
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値		
フタオビコヤガ	田方	6月	0	0	0	0	0	被害株率	0.0	0.0	0.0	
	平	7月	0	0	0	0	1.9	被害株率(%)	0.0	0.0	0.1	
	平	8月	0	0	0	0	32.6		0.0	0.0	4.7	
	平坦	9月	0	0	0	17	29.8		0.7	1.5	6.3	
	東部	6月	0	0	0	20	1.7	被害株率	0.8	1.6	0.1	
	中部	7月	0	0	0	60	11.7	被害株率(%)	7.2	8.9	0.7	
	高	8月	0	0	14	29	25.0		5.1	11.1	3.1	
	冷	9月	0	0	0	0	29.9		0.0	0.0	4.4	
	志太	6月	0	0	0	25	1.9	被害株率	1.0	1.7	0.1	
	榛	7月	0	0	0	0	0.0	被害株率(%)	0.0	0.0	0.3	
	原	8月	0	0	0	0	20.4		0.0	0.0	2.9	
	中遠	9月	0	0	0	14	16.3		1.7	4.2	4.6	
	中部	6月	0	0	0	20	1.7	被害株率	2.4	4.8	0.1	
	西部	7月	0	0	0	40	15.0	被害株率(%)	7.2	10.9	1.0	
	部	8月	0	0	17	33	50		6.7	11.5	5.3	
		9月	0	0	0	20	30.2		0.8	1.6	8.4	
※ フタオビコヤガの平年値は、過去7ヵ年 (H28～R4年度) の平均値	中遠	6月	0	0	0	20	3.3	被害株率	0.8	1.6	0.3	
	早期	7月	0	0	0	40	8.3	被害株率(%)	4.8	5.9	1.7	
	期	8月	0	0	0	25	10.0		4.5	9.3	1.5	
		9月	—	—	—	—	—		—	—	—	
	県	6月	0	0	0	17	1.9	被害株率	1.0	2.7	0.1	
	全	7月	0	0	0	28	7.4	被害株率(%)	3.8	7.5	0.8	
	体	8月	0	0	6	15	21.3		3.3	8.7	3.4	
		9月	0	0	0	14	26.2		0.9	2.7	6.1	

コムギ (調査点数: 10点, 栽培面積: 744ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率(%)				調査項目	発生程度		
			甚	多	中	少	計	平均	標準偏差	平年値
さび病	中遠	4月中	0	0	10	10	20	3.6	10.2	1.9
		5月中	0	0	10	60	70	13.8	17.7	15.5
うどんこ病	中遠	4月中	0	50	20	30	100	52.6	25.0	12.6
		5月中	0	0	60	20	80	26.6	17.4	19.1
び赤病	中遠	4月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		5月中	0	10	10	70	90	4.0	3.5	3.5
黒穂病	中遠	4月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		5月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
シラアブ類	中遠	4月中	0	0	0	70	70	3.4	3.8	11.8
		5月中	0	0	0	40	40	1.0	1.3	7.6
バグハエ	中遠	4月中	0	0	0	100	100	9.4	5.3	6.8
		5月中	0	0	0	20	20	0.6	1.3	0.7

2 野菜、花き

カンショ (調査点数(浜松市南部海岸地帯):10点、栽培面積:516ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差	平年値
ハスモンヨトウ	6月中 7月上 8月中	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
シロイチモジョトウ	6月中 7月上 8月中	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 6 0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.3 0.1 0.0
ナカジョシタバ	6月中 7月上 8月中	0 0 0	0 0 0	0 0 0	33 10 0	27 21 10	0.4 0.1 0.0	0.7 0.3 0.0	0.4 0.3 0.1
エビガラズメ	6月中 7月上 8月中	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 4 5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.1 0.0 0.1
イモキバガ	6月中 7月上 8月中	0 0 0	0 0 0	0 0 0	56 70 20	19 41 69	0.8 1.7 0.8	0.8 2.0 1.6	0.5 2.2 10.7
ヒルガオハモグリ	6月中 7月上 8月中	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

パレイショ (調査点数(三方原地帯):10点、栽培面積:467ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差	平年値
疫病	4月中旬 4月下旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬	0 0 0 0 0	0 0 0 0 25	0 0 0 0 0	0 0 67 0 0	0 0 0 0 25	0 0 0 0 20.0	0 0 0 0 34.6	0 12 17 41 -
ウイルス病	4月中旬 4月下旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 -	0 0 0 0 0.0	0 0 0 0 0.0	0 0 0 0 -
ニジュウヤホシテントウ	4月中旬 4月下旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	18 0 0 0 0	0 18 0 0 0	0 1.1 0.0 0.0 0.0	0 2.5 0.0 0.0 0.0	0 0 0 2 -
ジャガイモガ	4月中旬 4月下旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0.0	0 0 0 0 0.0	0 0 7 5 -
アブラムシ類	4月中旬 4月下旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬	0 0 8 11 0	0 0 0 0 0	0 0 17 11 0	36 73 67 78 25	0 81 92 100 25	3.3 6.2 23.0 20.9 2.0	5.3 6.2 25.0 28.8 3.5	12.8 15.6 15.6 22.1 -

冬キヤベツ (調査点数(湖西市): 10点, 栽培面積: 347ha)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)					調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値
黒腐病	10月中	0	0	0	0	0	発病	0.0	0.0	2.1
	11月下	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	2.0
	12月中	0	0	0	13	13	(%)	0.3	0.7	4.3
軟腐病	10月中	0	0	0	0	0	発病	0.0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
菌核病	10月中	0	0	0	0	0	発病	0.0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.2
	12月中	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.4
べと病	10月中	0	0	0	0	0	発病	0.0	0.0	0.2
	11月下	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
黒斑病	10月中	0	0	0	0	0	発病	0.0	0.0	0.1
	11月下	0	0	0	10	10	株率	1.2	3.6	0.1
	12月中	0	0	0	13	13	(%)	1.8	4.6	0.1
コナガ	10月中	0	0	0	0	0	寄生	0.0	0.0	0.2
	11月下	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.2
アブラ ムシ類	10月中	0	0	0	0	0	寄生	0.0	0.0	0.9
	11月下	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.7
	12月中	0	0	0	25	25	(%)	0.8	1.4	0.6
ハスモ シヨト ウ	10月中	0	0	10	10	20	寄生	1.4	3.1	0.4
	11月下	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
シロイ チモジ ヨトウ	10月中	0	0	20	20	40	寄生	2.2	3.3	0.3
	11月下	0	0	0	10	10	株率	0.2	0.6	0.1
	12月中	0	0	0	13	13	(%)	0.3	0.7	0.1
ヨトウ ガ	10月中	0	0	0	0	0	寄生	0.0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	0	株率	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
タマナ ギンウ ワバ	10月中	0	0	0	20	20	寄生	0.4	0.8	0.2
	11月下	0	0	0	10	10	株率	0.8	2.4	0.4
	12月中	0	0	0	13	13	(%)	0.3	0.7	0.4
オオタ バコガ	10月中	0	0	0	30	30	寄生	1.0	1.8	0.6
	11月下	0	0	0	10	10	株率	0.2	0.6	0.1
	12月中	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0

タマネギ (調査点数(浜松市南部海岸地帯): 10点、栽培面積: 321ha)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差	平年値
さび病	11月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	1月中旬	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.3
	2月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	3月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
白色疫 病	11月中	0	0	0	0	10	0.0	0.0	2.1
	12月中	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.1
	1月中旬	0	0	0	0	18	0.0	0.0	1.0
	2月上旬	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.2
	3月上旬	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1
べと病	11月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1
	1月中旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	2月上旬	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.2
	3月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ボトリ チス葉 枯病	11月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	30	6	1.4	2.5	0.3
	1月中旬	0	0	0	0	16	0.0	0.0	1.0
	2月上旬	0	0	0	0	17	0.0	0.0	1.1
	3月上旬	0	0	0	0	23	0.0	0.0	5.5
腐敗病	11月中	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	20	9	1.8	3.6	0.4
	1月中旬	0	0	0	63	24	3.5	4.3	1.4
	2月上旬	0	0	0	20	18	2.8	5.6	1.2
	3月上旬	0	0	0	100	40	9.0	7.0	4.7
灰色腐 敗病	11月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	1月中旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	2月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	3月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
シロイ チモジ ヨトウ	11月中	0	0	0	30	17	0.6	0.9	0.4
	12月中	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.1
	1月中旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	2月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	3月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ネギハ モグリ バエ	11月中	0	0	0	20	46	0.6	1.3	3.0
	12月中	0	0	0	20	5	0.4	0.8	0.1
	1月中旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	2月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	3月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ネギア ザミウ マ	11月中	0	0	0	90	65	13.6	13.7	18.4
	12月中	0	10	20	50	86	24.2	24.8	26.1
	1月中旬	0	0	38	38	81	25.3	24.6	29.3
	2月上旬	0	20	0	80	89	22.8	30.7	31.9
	3月上旬	0	0	50	50	93	27.0	19.0	39.8

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差	平年値
アブラ ムシ類	11月中	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	10	0	0.2	0.6	0.0
	1月中旬	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1
	2月上旬	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1
	3月上旬	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0

秋冬ネギ（シロネギ）（調査点数(天童川周辺地域):10点、栽培面積、:293ha)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率(%)					調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値
さび病	8月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	9月下	0	0	0	0	0	1 発病	0.0	0.0	0.0
	10月中	0	0	0	0	0	3 株率	0.0	0.0	0.1
	11月中	0	0	0	0	0	10 (%)	0.0	0.0	1.3
	12月中	0	0	0	0	0	20	0.0	0.0	3.5
	8月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	9月下	0	0	0	0	0	0 発病	0.0	0.0	0.0
	10月中	0	0	0	0	0	0 株率	0.0	0.0	0.0
萎縮病	11月中	0	0	0	0	0	1 (%)	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
黒斑病	8月下	0	0	0	0	0	36	0.0	0.0	3.6
	9月下	0	0	0	30	30	47 発病	0.8	1.3	4.7
	10月中	0	0	0	40	40	47 株率	2.0	3.1	3.6
	11月中	0	0	0	30	30	47 (%)	1.6	3.1	3.2
	12月中	0	0	0	44.4	44.4	23	3.1	4.0	1.5
疫病	8月下	0	0	0	0	0	0 発病	0.0	0.0	0.0
	9月下	0	0	0	0	0	2 株率	0.0	0.0	1.1
	10月中	0	0	0	0	0	10 (%)	0.0	0.0	0.8
	11月中	0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.2
べと病	12月中	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1
	8月下	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
	9月下	0	0	0	0	0	0 発病	0.0	0.0	0.0
	10月中	0	0	0	0	0	5 株率	0.0	0.0	0.3
アブラムシ類	11月中	0	0	0	0	0	4 (%)	0.0	0.0	0.1
	12月中	0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.5
ネギハモグリバエ	8月下	0	0	0	12.5	12.5	1	0.3	0.7	0.0
	9月下	0	0	0	0	0	3 寄生	0.0	0.0	0.0
	10月中	0	0	0	0	0	2 株率	0.0	0.0	0.0
	11月中	0	0	0	0	0	2 (%)	0.0	0.0	0.0
ネギハモグリバエ	12月中	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1
	8月下	0	0	0	12.5	12.5	79	0.3	0.7	32.0
	9月下	0	10	20	50	80	94 寄生	12.8	13.5	45.4
	10月中	10	20	10	40	80	92 株率	20.4	22.4	45.8
ヨトウガ	11月中	0	0	0	10	30	64 (%)	6.0	10.0	23.1
	12月中	0	0	0	22.2	22.2	21	0.7	1.3	1.4
	8月下	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	9月下	0	0	0	0	0	7 寄生	0.0	0.0	0.2
シロイチモウ	10月中	0	0	0	0	0	7 株率	0.0	0.0	0.3
	11月中	0	0	0	0	0	0 (%)	0.0	0.0	0.0
	12月中	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	8月下	0	0	0	0	0	26	1.0	1.4	1.7
ネギハモグリバエ	9月下	0	0	0	37.5	37.5	32 寄生	4.2	2.7	1.6
	10月中	0	0	0	90	90	27 株率	2.0	2.8	1.5
	11月中	0	0	0	40	40	8	0.2	0.6	0.2
	12月中	0	0	0	11.1	11.1	1.111	0.2	0.6	0.0

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率(%)					調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値
ハスモンヨトウ	8月下	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.2
	9月下	0	0	0	20	20	2 寄生	0.4	0.8	0.1
	10月中	0	0	0	10	10	1 株率	0.2	0.6	0.0
	11月中	0	0	0	0	0	2 (%)	0.0	0.0	0.0
ネギアザミ	12月中	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	8月下	0	0	0	0	0	74	0.0	0.0	26.7
	9月下	0	20	0	40	60	68 寄生	9.2	15.7	14.6
	10月中	20	0	0	40	60	70 株率	15.4	27.9	18.3
	11月中	0	10	10	50	70	67 (%)	8.0	11.2	14.6
	12月中	0	0	0	77.8	77.8	59	6.9	5.9	10.3

イチゴ (調査点数: 30点, 栽培面積: 293ha)													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少	計		平年値	平均	標準偏差	平年値	
炭疽病	東部	10月	0	0	0	30	30	30	発病株率 (%)	2.0	3.3	2.2	
		11月	0	0	0	20	20	25		1.0	2.4	1.8	
		12月	0	0	0	20	20	33		0.8	1.8	1.8	
		1月	0	0	0	20	20	36		0.4	0.8	1.9	
	中部	2月	0	0	0	40	40	27	1.6	2.9	1.3		
		3月	0	0	0	30	30	30	2.0	3.6	1.6		
		10月	0	0	0	30	30	18	0.6	0.9	1.5		
		11月	0	0	0	20	20	14	0.6	1.3	0.7		
	西部	12月	0	0	0	40	40	16	1.0	1.3	0.5		
		1月	0	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.5		
		2月	0	0	0	30	30	8	1.6	3.1	0.3		
		3月	0	0	0	50	50	12	2.4	3.1	0.5		
角斑細菌病	東部	10月	0	10	0	30	40	22	発病株率 (%)	4.2	8.3	1.5	
		11月	0	0	10	20	30	29		1.8	4.1	1.6	
		12月	0	0	0	30	30	23		1.2	2.4	1.1	
		1月	0	0	0	30	30	22		1.2	2.4	1.0	
	中部	2月	0	0	0	40	40	32	1.8	2.7	1.1		
		3月	0	0	10	30	40	26	2.0	3.6	1.3		
		10月	0	3	0	30	33	24	2.3	5.4	1.7		
		11月	0	0	3	20	23	23	1.1	1.9	1.4		
	西部	12月	0	0	0	30	30	24	1.0	1.9	1.1		
		1月	0	0	0	17	17	24	0.5	1.5	1.1		
		2月	0	0	0	37	37	22	1.7	2.9	0.9		
		3月	0	0	3	37	40	24	2.1	3.4	1.1		
炭疽病	東部	10月	0	0	0	0	0	12	発病株率 (%)	0.0	0.0	3.5	
		11月	0	0	0	0	0	11		0.0	0.0	1.4	
		12月	0	0	0	0	0	10		0.0	0.0	1.4	
		1月	0	0	0	0	0	10		0.0	0.0	1.1	
	中部	2月	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	1.0		
		3月	0	0	0	0	0	12	0.0	0.0	0.4		
		10月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.3		
		11月	0	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.5		
	西部	12月	0	0	0	0	0	8	0.0	0.0	0.5		
		1月	0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.9		
		2月	0	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.8		
		3月	0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.6		
炭疽病	東部	10月	0	0	0	0	0	0	発病株率 (%)	0.0	0.0	0.0	
		11月	0	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.1	
		12月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
		1月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
	中部	2月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
		3月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1		
		10月	0	0	0	0	0	5	0.0	0.0	1.1		
		11月	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.7		
	西部	12月	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.6		
		1月	0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.7		
		2月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.6		
		3月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.3		

イチゴ (調査点数: 30点, 栽培面積: 293ha)

イチゴ (調査点数: 30点, 栽培面積: 293ha)

イチゴ (調査点数: 30点, 栽培面積: 293ha)													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少	計		平年値	平均	標準偏差	平年値	
アブラムシ類	東 部	10月	0	0	0	0	30	23	寄生株率 (%)	0.8	1.3	2.7	
		11月	0	0	0	0	10	24		0.6	1.8	3.3	
		12月	0	0	0	0	20	18		0.6	1.3	1.6	
		1月	0	0	0	0	20	17		1.0	2.0	0.7	
	中 部	2月	0	0	10	30	40	13	4.6	8.0	0.7		
		3月	0	0	10	10	20	23	3.2	8.4	1.1		
		10月	0	0	10	60	70	48	10.2	9.4	5.5		
		11月	10	0	20	60	90	43	23.0	24.6	7.2		
	西 部	12月	0	0	0	30	30	33	寄生株率 (%)	2.0	3.2	2.8	
		1月	0	0	0	20	20	30	2.0	5.4	2.7		
		2月	0	0	10	30	40	28	3.8	7.6	3.1		
		3月	0	0	0	50	50	32	4.0	5.1	4.0		
ハダニ類	東 部	10月	0	0	0	50	50	29	4.2	5.1	2.9		
		11月	0	0	0	40	40	24	4.2	7.3	2.6		
		12月	0	0	0	30	30	15	3.8	6.9	3.4		
		1月	0	0	0	10	10	18	1.6	4.8	1.3		
	中 部	2月	0	0	0	20	20	17	0.4	0.8	0.9		
		3月	0	0	0	30	30	18	0.6	0.9	1.4		
		10月	0	0	3	47	50	35	5.1	7.3	3.9		
		11月	3	0	7	37	47	30	9.3	20.7	4.3		
	西 部	12月	0	0	0	27	27	22	寄生株率 (%)	2.1	4.6	2.6	
		1月	0	0	0	17	17	22	1.5	4.3	1.6		
		2月	0	0	7	27	33	20	2.9	6.6	1.6		
		3月	0	0	3	30	33	23	2.6	5.9	2.2		
ハダニ類	東 部	10月	0	0	0	0	0	34	0.0	0.0	4.5		
		11月	0	10	0	0	10	42	2.4	7.2	7.8		
		12月	10	0	0	10	20	44	3.4	9.6	10.2		
		1月	0	10	30	20	60	54	3.6	4.4	10.9		
	中 部	2月	0	0	20	0	20	51	1.4	2.8	7.6		
		3月	0	0	10	10	20	34	1.2	3.0	5.4		
		10月	0	20	10	0	30	59	4.4	7.3	12.4		
		11月	10	30	0	10	50	65	13.8	26.9	17.3		
	西 部	12月	20	40	20	0	80	73	寄生株率 (%)	22.2	28.2	23.1	
		1月	50	10	30	0	90	76	29.4	24.2	20.2		
		2月	20	40	10	0	70	72	25.4	31.0	22.1		
		3月	10	10	10	10	40	75	7.8	14.1	26.3		
ハダニ類	東 部	10月	50	0	0	10	60	60	28.4	30.2	20.2		
		11月	40	10	0	0	50	60	28.2	33.6	22.6		
		12月	80	0	0	10	90	69	52.4	30.6	17.5		
		1月	10	20	20	10	60	50	11.0	16.1	8.9		
	中 部	2月	20	10	30	10	70	45	18.2	27.6	8.3		
		3月	20	10	10	20	60	39	15.6	29.8	7.1		
		10月	17	7	3	3	30	52	10.9	21.9	12.5		
		11月	17	17	0	3	37	56	14.8	20.5	15.9		
	西 部	12月	37	13	7	7	63	62	26.0	31.9	16.9		
		1月	20	13	27	10	70	60	14.7	20.1	13.3		
		2月	13	17	20	3	53	56	15.0	26.0	12.7		
		3月	10	7	10	13	40	51	8.2	20.0	12.9		

イチゴ (調査点数: 30点, 栽培面積: 293ha)													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少	計		平年値	平均	標準偏差	平年値	
ハスモンヨトウ	東 部	10月	0	0	0	0	40	40	21	寄生株率 (%)	1.4	2.0	0.0
		11月	0	0	0	0	20	20	5		1.0	2.4	0.0
		12月	0	0	0	0	0	0	2		0.0	0.0	0.3
	中 部	1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.7
		2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	1.0
		3月	0	0	0	0	0	0	21	0.0	0.0	3.4	
	西 部	10月	0	0	0	0	60	60	14	寄生株率 (%)	3.6	4.2	0.6
		11月	0	0	0	0	50	50	12		1.2	1.3	0.2
		12月	0	0	0	0	30	30	6		0.8	1.3	0.0
	県	1月	0	0	0	0	10	10	3	0.2	0.6	0.0	
		2月	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	
		3月	0	0	0	0	10	10	0	0.2	0.6	0.0	
アザミウマ類	東 部	10月	0	0	0	0	30	30	15	寄生株率 (%)	1.8	3.6	0.4
		11月	0	0	0	0	0	0	12		0.0	0.0	0.4
		12月	0	0	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.2
	県	1月	0	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.1	
		2月	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		3月	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	東 部	10月	0	0	0	0	43	43	16	寄生株率 (%)	2.3	3.5	0.4
		11月	0	0	0	0	23	23	10		0.7	1.9	0.3
		12月	0	0	0	0	10	10	3		0.3	0.9	0.1
	中 部	1月	0	0	0	0	3	3	2	0.1	0.4	0.0	
		2月	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
		3月	0	0	0	0	3	3	0	0.1	0.4	0.0	
西 部	10月	0	0	0	0	0	0	4	寄生株率 (%)	0.0	0.0	0.1	
	11月	0	0	0	0	0	0	13		0.0	0.0	0.4	
	12月	0	0	0	0	0	0	15		0.0	0.0	0.8	
県	1月	0	0	0	0	20	20	22	0.4	0.8	1.7		
	2月	0	0	0	0	50	50	24	2.0	3.5	2.8		
	3月	0	0	0	10	30	40	4	6.2	12.9	9.9		
アザミウマ類	東 部	10月	0	0	0	0	0	0	2	寄生株率 (%)	0.0	0.0	0.1
		11月	0	0	0	0	30	30	28		2.8	7.1	3.9
		12月	0	10	0	0	50	60	39		12.6	16.5	4.9
	中 部	1月	0	0	0	10	30	40	33	7.6	14.9	4.3	
		2月	10	0	0	40	20	70	64	21.8	27.4	10.5	
		3月	0	10	10	60	80	47	15.8	21.7	17.3		
	西 部	10月	0	0	0	0	0	0	7	寄生株率 (%)	0.0	0.0	0.2
		11月	0	0	0	10	30	40	16		6.4	9.8	1.0
		12月	0	0	0	0	20	20	12		1.8	4.2	0.8
	県	1月	0	0	0	0	20	20	14	2.2	6.0	0.8	
		2月	0	0	0	0	50	50	23	4.8	6.6	2.3	
		3月	0	0	0	20	30	50	52	13.2	14.8	7.9	
県	10月	0	0	0	0	0	0	5	寄生株率 (%)	0.0	0.0	0.1	
	11月	0	0	0	3	20	23	19		3.1	5.2	1.7	
	12月	0	0	3	0	23	27	22		4.8	11.3	2.1	
県	1月	0	0	0	3	23	27	23	3.4	9.8	2.3		
	2月	3	0	13	40	57	31	31	9.5	18.6	5.2		
	3月	0	3	13	40	57	56	56	11.7	17.3	11.7		

イチゴ (調査点数：30点，栽培面積：293ha)											
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度		
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	
コナジラミ類	東 部	10月	0	0	0	30	30	40	3.2	6.7	3.1
		11月	0	0	0	40	40	32	1.8	3.5	2.3
		12月	0	0	0	20	20	34 寄生株	1.2	2.6	1.9
		1月	0	0	0	20	20	41 率 (%)	2.0	4.4	2.4
		2月	0	0	10	40	50	39	7.2	12.5	3.7
	中 部	3月	0	10	10	40	60	40	9.4	16.4	4.7
		10月	0	0	0	60	60	62	7.8	7.7	8.0
		11月	0	0	0	80	80	50	5.2	5.0	4.9
		12月	0	20	0	50	70	35 寄生株	15.0	21.6	2.9
		1月	0	0	10	30	40	29 率 (%)	6.2	14.7	2.4
	西 部	2月	0	10	0	40	50	21	10.8	22.2	3.3
		3月	10	0	0	10	20	19	11.0	28.1	5.1
		10月	0	0	0	50	50	67	5.6	7.3	8.6
		11月	0	0	0	60	60	62	4.8	5.2	11.1
		12月	0	0	0	70	70	74 寄生株	6.8	6.3	12.6
県	西 部	1月	0	0	0	70	70	69 率 (%)	5.8	5.8	13.8
		2月	0	0	0	50	50	65	5.6	7.4	15.8
		3月	0	10	20	40	70	75	15.0	20.5	19.6
	県	10月	0	0	0	47	47	58	5.5	7.5	6.9
		11月	0	0	0	60	60	48	3.9	4.9	6.1
		12月	0	7	0	47	53	48 寄生株	7.7	14.3	5.8
		1月	0	0	3	40	43	46 率 (%)	4.7	9.7	6.2
		2月	0	3	3	43	50	42	7.9	15.5	7.6
		3月	3	7	10	30	50	45	11.8	22.3	9.8

秋冬ダイコン (調査点数: 10点, 栽培面積: 460ha)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発 生 程 度		
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差	平年値
モザイク病	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.4
	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	1.8
	1月下	0	0	0	25	25	1.5	3.3	2.0
黒腐病	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.1
	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.5
	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.3
白さび病	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.1
	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	2.6
	1月下	0	0	0	25	25	0.8	1.4	7.5
黒斑細菌病	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.4
	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	3.5
	1月下	0	0	25	63	88	20.8	22.8	6.5
アブラムシ類	10月下	0	0	0	29	29	1.1	2.1	0.2
	11月下	0	0	0	13	13	1.0	2.6	0.9
	12月下	13	0	0	38	50	16.5	32.3	2.3
	1月下	0	13	0	75	88	29.0	24.0	3.7
コナガ	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.1
	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.2
	12月下	0	0	0	38	38	1.3	2.0	0.6
	1月下	0	0	0	13	13	1.0	2.6	0.4

冬レタス (調査点数: 20点、栽培面積: 896ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
灰色かび病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	森	2月下	—	—	—	—	12	—	0.5
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
菌核病	県全体	1月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	12	—	0.5
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	榛原	12月下	0	0	0	0	13	0.0	0.5
		1月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	8	—	0.2
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
すそ枯病	森	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	—	—	—
	県全体	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	7	0.0	0.3
		1月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
すそ枯病	榛原	2月下	—	—	—	—	8	—	0.2
		10月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	4	0.0	0.1
		12月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	森	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	5	—	0.4
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
すそ枯病	榛原	12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	森	11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	—	—	—
すそ枯病	榛原	10月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	3	0.0	0.1
		12月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	県全体	2月下	—	—	—	—	5	—	0.4
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0

冬レタス (調査点数: 20点, 栽培面積: 896ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
斑点細菌病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	8	0.0	0.0
	森	2月下	—	—	—	—	13	—	2.8
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	10	0.0	0.0
軟腐病	県全体	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	16	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0
	榛原	12月下	0	0	0	0	発病株率(%)	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	12	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	13	—	2.8
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
腐敗病	森	11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	2	—	0.0
	県全体	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	榛原	2月下	—	—	—	—	2	—	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	森	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	15	—	0.7
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	県全体	12月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	5	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	15	—	0.7
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	榛原	11月下	0	0	0	0	3	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	8	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	—	—	—
	森	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	7	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	4	0.0	0.0
	県全体	2月下	—	—	—	—	15	—	0.7
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	7	0.0	0.0

冬レタス (調査点数: 20点, 栽培面積: 896ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
べと病	榛原	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	4	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	12	0.0	0.0
	森	2月下	—	—	—	—	12	—	1.4
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	10	0.0	0.0
ハスモンヨトウ	県全体	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	12	—	1.4
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	榛原	12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	0	—	0.0
		10月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
アブラムシ類	森	11月下	0	0	0	0	3	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	—	—	—
	県全体	10月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	3	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	榛原	2月下	—	—	—	—	0	—	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	7	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	5	0.0	0.0
	森	1月下	0	0	0	0	33	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	33	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	11	0.0	0.0
	県全体	12月下	0	0	0	0	10	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	13	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	4	0.0	0.0
	榛原	11月下	0	0	0	0	—	—	—
		12月下	0	0	0	0	7	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	5	0.0	0.0
		2月下	—	—	—	—	—	—	—
	森	10月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	県全体	2月下	—	—	—	—	2	—	—
		10月下	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	5	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0

冬春トマト (調査点数：20点、栽培面積：164ha)										
病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度		
			甚	多	中	少		計		
疫 病	志 太	9月下	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		11月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		12月下	0	0	0	0	0	0	0	0
	中 遠	1月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		2月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		3月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		9月下	0	0	0	0	0	0	0	0
	東 部	10月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		11月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		12月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		1月下	0	0	11	0	1	0	1	1
県 全 体	2月下	10	11	0	0	1	0	1	1	
	3月下	4	0	0	0	0	0	0	0	
	9月下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10月下	0	0	0	0	0	0	0	0	
灰色かび病	志 太	11月下	0	0	0	0	0	0	11	1
		12月下	0	0	0	0	0	0	2	2
		1月下	0	0	0	0	0	0	3	3
		2月下	0	0	17	33	5	17	33	5
	中 遠	3月下	0	0	17	67	8	17	67	8
		9月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		10月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		11月下	0	0	0	0	0	0	0	0
	東 部	12月下	0	0	0	0	0	0	10	1
		1月下	0	0	0	0	0	0	10	1
		2月下	0	0	10	40	5	10	40	5
		3月下	0	10	10	20	4	10	20	4
県 全 体	9月下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10月下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11月下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12月下	0	0	0	0	0	0	0	0	
モザイク病	志 太	1月下	0	0	0	0	0	0	10	1
		2月下	0	0	0	0	0	0	10	1
		3月下	0	10	10	20	4	10	20	4
		9月下	0	0	0	0	0	0	0	0
	中 遠	10月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		11月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		12月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		1月下	0	0	0	0	0	0	0	0
	東 部	2月下	0	0	0	0	0	0	22	2
		3月下	0	10	20	70	10	10	20	10
		9月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		10月下	0	0	0	0	0	0	0	0
県 全 体	11月下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12月下	0	0	0	0	0	0	10	1	
	1月下	0	0	0	0	0	0	14	1	
	2月下	0	0	8	32	4	0	32	4	
モザイク病	志 太	3月下	0	4	8	28	4	8	28	4
		9月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		10月下	0	0	0	0	0	0	0	0
		11月下	0	0	0	0	0	0	4	4
モザイク病	中 遠	12月下	0	0	0	0	0	0	10	1
		1月下	0	0	0	0	0	0	14	1
		2月下	0	0	0	0	0	0	32	4
		3月下	0	4	8	28	4	8	28	4

冬春トマト (調査点数：20点、栽培面積：164ha)													
病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度					
			甚	多	中	少		計	平均	標準偏差	平年値		
モザイク病	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	中遠	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	東部	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
輪紋病	志太	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	中遠	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	東部	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
県全体	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

冬春トマト (調査点数:20点、栽培面積:164ha)										
病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度		
			甚	多	中	少		計	平均	標準偏差
斑点病	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	中遠	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	東部	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
萎凋病	県全体	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		9月下	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	志太	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	中遠	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	東部	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
県全体	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	11月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	12月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	

冬春トマト (調査点数:20点、栽培面積:164ha)													
病害 虫名	調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)					調査 項目	発生程度				
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値		
葉かび病及びすすかび病	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	17	50	67	27	発病 株率 (%)	6.0	8.3	4.1	
		11月下	0	0	0	22	22	23	3.8	2.7	5.7		
		12月下	0	0	10	0	10	25	3.0	11.4	8.4		
	中遠	1月下	0	0	0	30	30	29	3.0	5.6	8.4		
		2月下	0	17	0	0	17	19	8.0	17.9	4.8		
		3月下	0	0	0	33	33	11	2.7	5.1	4.0		
		9月下	0	13	0	50	63	6	10.0	21.3	6.4		
	東部	10月下	10	0	0	20	30	58	13.8	29.7	17.1		
		11月下	10	0	0	10	20	65	7.6	21.5	16.2		
		12月下	10	0	0	0	10	54	10.0	30.0	16.2		
		1月下	10	0	0	0	10	43	8.0	24.0	10.9		
県全体	2月下	10	0	0	30	40	30	12.0	28.5	7.2			
	3月下	10	10	0	20	30	28	8.6	19.0	7.0			
	9月下	0	0	0	44	44	—	1.1	1.4	—			
	10月下	0	0	0	11	11	—	0.2	0.6	—			
黄化葉巻病	志太	11月下	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—		
		12月下	0	0	0	11	11	—	0.2	0.6	—		
		1月下	11	0	11	44	67	—	13.8	24.5	—		
		2月下	0	22	11	22	56	—	18.0	23.8	—		
	中遠	3月下	10	30	0	60	100	—	21.6	28.5	—		
		9月下	0	6	0	47	53	31	5.3	15.3	6.4		
		10月下	4	0	4	24	32	46	7.0	20.1	12.6		
		11月下	4	0	0	11	14	45	3.1	13.4	11.3		
	東部	12月下	3	0	3	3	10	39	4.8	19.3	12.3		
		1月下	7	0	3	24	34	37	8.1	20.4	9.7		
		2月下	4	12	4	20	40	25	13.2	25.1	6.1		
		3月下	4	12	0	24	40	20	11.8	15.6	5.5		
県全体	9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	10月下	0	0	0	17	17	34	1.3	3.0	2.1			
	11月下	0	0	0	44	44	27	2.0	3.1	2.5			
	12月下	0	0	0	10	10	50	0.4	1.2	4.5			
黄化葉巻病	志太	1月下	0	0	0	10	10	41	0.4	1.2	2.6		
		2月下	0	0	0	17	17	40	1.3	3.0	2.7		
		3月下	0	0	0	17	17	37	0.3	0.7	2.6		
		9月下	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	1.0		
	中遠	10月下	0	0	0	10	10	21	0.2	0.6	1.8		
		11月下	0	0	0	20	20	20	0.4	0.8	2.1		
		12月下	0	0	0	10	10	31	0.2	0.6	2.4		
		1月下	0	0	0	10	10	30	0.4	1.2	2.9		
	東部	2月下	0	0	0	10	10	25	0.6	1.8	2.0		
		3月下	0	0	0	10	10	22	0.6	1.8	2.0		
		9月下	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—		
		10月下	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—		
県全体	11月下	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—			
	12月下	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—			
	1月下	0	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—			
	2月下	0	0	0	11	11	—	0.2	0.6	—			
黄化葉巻病	県全体	3月下	0	0	0	20	20	—	0.0	0.0	—		
		9月下	0	0	0	0	0	12	0.0	0.0	1.0		
		10月下	0	0	0	8	8	25	0.4	1.6	1.9		
		11月下	0	0	0	21	21	23	0.8	2.0	2.3		
黄化葉巻病	黄化葉巻病	12月下	0	0	0	7	7	41	0.2	0.8	3.4		
		1月下	0	0	0	12	12	36	0.3	1.0	2.7		
		2月下	0	0	0	7	7	33	0.6	2.3	2.4		
		3月下	0	0	0	8	8	30	0.3	1.5	2.4		

冬春トマト (調査点数：20点、栽培面積：164ha)												
病害 虫名	調査 地域	調査 時期	甚	多	中	少	計	発生率 (%)	調査 項目	平均	発生程度 標準偏差	平年値
うどんこ病	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11月下	0	0	0	0	0	0.0	発病 株率	0.0	0.0	2.6
	中 遠	12月下	10	0	0	0	10	18	(%)	10.0	30.0	1.7
		1月下	0	10	0	0	20	18	(%)	6.4	15.1	2.0
		2月下	17	0	0	0	17	17	(%)	14.3	32.1	3.4
	東 部	3月下	0	17	0	0	33	9	(%)	12.7	21.3	1.8
		9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	県 全 体	11月下	0	0	0	0	0	0	発病 株率	0.0	0.0	4.5
		12月下	0	0	0	0	10	28	(%)	0.6	1.8	6.7
		1月下	0	0	10	0	20	36	(%)	3.6	10.2	10.9
アブラムシ類	志太	2月下	0	0	0	0	0	0	30	0.0	0.0	7.2
		3月下	0	0	0	0	30	27	(%)	2.8	4.4	8.3
		9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中 遠	10月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11月下	0	0	0	0	0	19	発病 株率	0.0	0.0	4.5
		12月下	0	0	0	0	10	28	(%)	0.6	1.8	6.7
	東 部	1月下	0	0	10	0	20	36	(%)	3.6	10.2	10.9
		2月下	0	0	0	0	0	0	30	0.0	0.0	7.2
		3月下	0	0	0	0	30	27	(%)	2.8	4.4	8.3
	県 全 体	9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11月下	0	0	0	0	7	13	発病 株率	0.7	3.0	3.6
ハダニ類	志太	12月下	3	0	3	10	17	23	(%)	5.0	18.6	4.4
		1月下	3	3	3	14	24	27	(%)	7.1	20.7	6.5
		2月下	8	4	0	0	12	24	(%)	8.4	20.8	5.3
	中 遠	3月下	4	4	0	28	36	18	(%)	8.3	14.3	5.1
		9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0	寄生 株率	0.0	0.0	0.0
	東 部	11月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	2	(%)	0.0	0.0	0.3
	県 全 体	2月下	0	0	0	0	0	1	(%)	0.0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	4	(%)	0.0	0.0	0.1
		9月下	0	0	0	0	0	0	寄生 株率	0.0	0.0	0.0
コナジラミ類	志太	10月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
	中 遠	1月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
	東 部	9月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
	県 全 体	12月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0

冬春トマト (調査点数：20点、栽培面積：164ha)												
病害 虫名	調査 地域	調査 時期	甚	多	中	少	計	発生率 (%)	調査 項目	平均	発生程度 標準偏差	平年値
コナジラミ類	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	33	50	83	65	寄生 株率	26.3	23.2	18.8
		11月下	0	11	33	56	100	55	(%)	39.8	24.2	12.4
	中 遠	12月下	0	10	30	60	100	47	(%)	35.4	26.0	13.1
		1月下	10	10	10	70	100	36	(%)	33.4	33.8	9.7
		2月下	0	17	17	67	100	35	(%)	31.7	34.5	6.8
	東 部	3月下	0	17	17	50	83	36	(%)	32.0	28.3	7.7
		9月下	0	0	0	75	75	5	寄生 株率	8.8	12.0	5.3
		10月下	0	10	10	60	80	45	(%)	20.4	24.3	8.8
	県 全 体	11月下	0	10	10	60	80	57	(%)	27.2	27.1	11.7
		12月下	0	20	0	50	70	46	(%)	25.8	26.2	10.4
		1月下	0	10	10	50	70	47	(%)	21.2	25.3	9.7
ハダニ類	志太	2月下	0	10	0	60	70	38	(%)	15.6	23.2	8.3
		3月下	0	10	0	40	50	39	(%)	17.0	29.1	9.0
		9月下	0	0	0	44	44	—	—	1.3	1.9	—
	中 遠	10月下	0	0	0	56	56	—	—	2.9	3.0	—
		11月下	0	0	0	78	78	—	—	3.6	3.1	—
		12月下	0	0	0	33	33	—	—	2.0	3.3	—
	東 部	1月下	0	0	0	22	22	—	—	2.0	5.0	—
		2月下	0	0	0	22	22	—	—	2.0	4.4	—
		3月下	0	20	10	100	130	—	—	5.8	10.9	—
	県 全 体	9月下	0	0	0	59	59	40	寄生 株率	4.8	9.2	5.3
		10月下	0	4	8	60	72	53	(%)	15.5	21.6	11.9
		11月下	0	7	14	64	86	56	(%)	23.6	25.9	12.1
コナジラミ類	志太	12月下	0	10	10	48	69	47	寄生 株率	21.7	25.8	11.8
		1月下	3	7	7	48	66	41	(%)	19.4	28.0	9.8
		2月下	0	8	4	48	60	37	(%)	14.6	29.0	7.7
	中 遠	3月下	0	8	4	40	52	34	(%)	16.6	29.7	8.4
		9月下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	0	0	寄生 株率	0.0	0.0	0.0
	東 部	11月下	0	0	0	0	0	1	(%)	0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
	県 全 体	2月下	0	0	0	0	0	1	(%)	0.0	0.0	0.1
		3月下	0	0	0	0	0	1	(%)	0.0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
ハダニ類	志太	10月下	0	0	0	0	0	0	寄生 株率	0.0	0.0	0.1
		11月下	0	0	0	0	0	3	(%)	0.0	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	0	1	(%)	0.0	0.0	0.2
	中 遠	1月下	0	0	0	0	0	4	(%)	0.0	0.0	0.9
		2月下	0	0	0	0	0	1	(%)	0.0	0.0	0.4
		3月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
	東 部	9月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		11月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
	県 全 体	12月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0	0.0

冬季トマト (調査点数: 20点、栽培面積: 164ha)									
調査 地域	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度		
		甚	多	中	少		計	平均	平年値
ハスモンヨトウ	志太	9月下	—	—	—	—	—	—	—
		10月下	0	0	0	0	6	0.0	0.0
		11月下	0	0	11	11	1	0.2	0.2
		12月下	0	0	0	10	2	0.4	0.0
	中遠	1月下	0	0	0	10	0	0.2	0.0
		2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.2
	東部	10月下	0	0	0	10	6	0.2	0.2
		11月下	0	0	0	0	2	0.0	0.0
		12月下	0	0	0	0	1	0.0	0.1
		1月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
県全体	2月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	9月下	0	0	0	0	0	0.0	—	
	10月下	0	0	0	0	—	0.0	—	
ハモグリバエ類	志太	11月下	0	0	0	0	—	0.0	—
		12月下	0	0	0	0	—	0.0	—
		1月下	0	0	0	0	—	0.0	—
		2月下	0	0	0	0	—	0.0	—
	中遠	3月下	0	0	0	0	—	0.0	—
		9月下	0	0	0	0	0	0.0	0.2
		10月下	0	0	0	4	4	0.1	0.4
		11月下	0	0	0	4	6	0.1	0.2
	東部	12月下	0	0	0	4	2	0.1	0.1
		1月下	0	0	3	3	2	0.1	0.0
		2月下	0	0	0	3	0	0.1	0.4
		3月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
県全体	9月下	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
	10月下	0	0	0	0	7	0.0	0.0	
	11月下	0	0	0	4	4	0.1	0.4	
	12月下	0	0	0	4	6	0.1	0.2	
ハモグリバエ類	志太	1月下	0	0	0	20	24	5.0	3.3
		2月下	0	0	0	20	11	1.2	2.4
		3月下	0	0	0	33	5	3.3	6.6
		9月下	0	0	0	17	2	1.0	2.2
	中遠	10月下	0	0	0	0	0	0.0	0.1
		11月下	0	0	0	0	9	0.0	0.4
		12月下	0	0	0	0	3	0.0	0.0
		1月下	0	0	0	0	5	0.0	0.7
	東部	2月下	0	0	0	0	6	0.0	1.3
		3月下	0	0	0	0	7	0.0	0.6
		9月下	0	0	0	0	9	0.0	0.8
		10月下	0	0	0	0	0	0.0	1.6
県全体	11月下	0	0	0	0	—	0.0	—	
	12月下	0	0	0	0	—	0.0	—	
	1月下	0	0	0	0	—	0.0	—	
	2月下	0	0	0	0	—	0.0	—	
ハモグリバエ類	志太	3月下	0	0	0	10	10	0.0	0.0
		9月下	0	0	0	0	3	0.0	0.1
		10月下	0	0	0	4	12	0.2	0.8
		11月下	0	0	0	11	11	2.1	10.4
	中遠	12月下	0	0	0	7	14	1.7	8.8
		1月下	0	0	0	7	9	0.8	2.2
		2月下	0	0	0	8	6	0.4	1.5
		3月下	0	0	0	4	6	0.2	1.5
	東部	9月下	0	0	0	4	4	0.0	0.0
		10月下	0	0	0	4	12	0.2	0.8
		11月下	0	0	0	11	11	2.1	10.4
		12月下	0	0	0	7	14	1.7	8.8
県全体	1月下	0	0	0	7	9	0.8	2.2	
	2月下	0	0	0	8	6	0.4	1.5	
	3月下	0	0	0	4	6	0.2	1.5	
	9月下	0	0	0	4	4	0.0	0.0	

[illegible]

キク (調査点数(浜松市、湖西市): 10点、栽培面積: 151a)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度	
		甚	多	中	少		平均	標準偏差
白さび 病	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	発病 株率	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0
黒さび 病	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	発病 株率	0.0	0.0
黒斑病 褐斑病	7月下	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0
	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ウイルス 病	6月下	0	0	0	0	発病 株率	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	(%)	0.0	0.4
	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.4
葉枯 線虫病	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	発病 株率	0.0	0.0
軟腐病	8月中	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0
	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
半身 萎凋病	7月下	0	0	0	0	発病 株率	0.0	0.0
	8月中	0	0	0	0	(%)	0.0	0.0
	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
えそ病	6月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	発病 株率	0.0	0.0
	8月中	0	0	0	0	(%)	0.0	0.1

キク (調査点数(浜松市、湖西市): 10点、栽培面積: 151a)

病害 虫名	調査 時期	程度別発生面積率 (%)				調査 項目	発生程度	
		甚	多	中	少		平均	標準偏差
ハダニ 類	5月下	0	0	13	13	9	1.2	2.2
	6月下	0	11	11	0	43	2.1	4.5
	7月下	0	11	22	33	44	3.4	4.3
	8月中	50	0	25	25	100	5.0	2.0
アザミ ウマ類	5月下	0	0	25	50	56	7.5	10.3
	6月下	11	0	0	11	51	11.6	31.3
	7月下	11	0	11	11	33	13.6	30.9
	8月中	0	25	0	25	44	15.0	20.6
アブラ ムシ類	5月下	0	0	0	13	10	0.8	2.0
	6月下	0	0	0	0	13	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	3	0.0	0.0
	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0
マメハ モグリ バエ	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	11	11	0.2	0.6
	8月中	0	0	0	0	4	0.0	0.0
カスミ カメム シ類	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	4	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	8月中	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ハ翅目 食害	5月下	0	0	0	25	17	1.3	2.2
	6月下	0	0	0	0	20	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	22	0.0	0.0
	8月中	0	0	0	0	23	0.0	0.0
アワダ チソウ グンバ イ	5月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月下	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	8月中	0	0	0	0	4	0.0	0.0

※平年値は過去4ヵ年の平均値

3 チヤ

調査点数：50点、栽培面積：13,800ha

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目		発生程度	
			甚	多	中	少	計	平年値	平均	標準偏差	平年値
			調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査
輪斑病	富士山麓	3月	0	0	0	50	50	51	2.2	3.0	2.9
		5月	0	0	0	20	20	3	0.2	0.4	0.1
		6月	0	0	0	40	40	30	3.0	4.2	1.2
		7月	0	0	0	50	50	69	13.2	22.5	17.9
		8月	0	0	0	20	20	38	0.3	0.6	1.7
	静岡市北部	10月	0	0	0	60	60	30	3.1	5.8	2.1
		3月	0	0	0	90	90	72	9.7	12.5	6.0
		5月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
		6月	0	0	0	60	60	42	3.5	4.2	1.6
		7月	0	0	10	80	90	67	31.4	31.9	14.1
新梢枯死症	牧之原	8月	0	0	0	40	40	36	4.9	12.4	3.6
		10月	0	0	0	60	60	47	2.7	2.9	1.4
		3月	0	0	0	70	70	68	3.3	3.2	4.6
		5月	0	0	0	10	10	3	0.1	0.3	0.0
		6月	0	0	0	70	70	36	1.2	1.2	1.0
	磐小田笠原・川根	7月	0	0	10	70	80	80	15.8	26.5	17.7
		8月	0	0	10	60	70	58	20.9	46.1	4.8
		10月	0	0	0	40	40	43	1.5	2.1	5.4
		3月	0	0	0	70	70	50	2.6	3.3	3.3
		5月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0
県全体	川根	6月	0	0	0	50	50	37	1.7	1.8	1.3
		7月	0	0	0	70	70	72	3.8	6.6	17.6
		8月	0	0	0	50	50	49	2.7	5.0	7.2
		10月	0	0	0	100	100	43	1.7	0.9	2.3
		3月	0	0	0	80	80	77	11.9	13.1	11.2
	県全体	5月	0	0	0	20	20	0	0.2	0.4	0.0
		6月	0	0	0	50	50	41	2.5	3.1	2.5
		7月	0	0	0	60	60	77	12.1	12.0	27.7
		8月	0	0	0	60	60	43	5.1	10.2	5.0
		10月	0	0	0	60	60	41	1.8	2.6	2.8

調査点数：50点、栽培面積：13,800ha

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目		発生程度	
			甚	多	中	少	計	平年値	平均	標準偏差	平年値
			調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査
新梢枯死症	山富士麓	7月	0	0	0	0	0	36	0	0.0	1.3
		8月	0	0	20	30	50	45	8.7	16.8	4.7
		9月	0	0	20	60	80	81	16.0	20.3	15.0
		10月	0	0	20	60	80	53	10.0	11.6	5.2
	静岡市北部	7月	0	0	0	30	30	24	0.4	0.7	0.9
		8月	0	0	0	40	40	46	2.6	4.5	2.1
		9月	0	0	30	60	90	89	18.6	16.9	12.9
		10月	0	0	20	70	90	79	11.9	11.6	4.3
	牧之原	7月	0	0	0	10	10	35	0.2	0.6	3.1
		8月	0	0	10	70	80	76	10.3	10.6	8.7
		9月	0	0	20	70	90	72	15.1	17.4	8.6
		10月	0	0	0	100	100	57	5.8	3.9	3.5
	磐小田笠原・川根	7月	0	0	0	30	30	26	0.3	0.5	1.1
		8月	0	0	0	80	80	64	9.2	8.7	4.2
		9月	0	0	10	50	60	68	11.4	16.4	8.4
		10月	0	0	0	90	90	63	5.5	4.9	3.1
	川根	7月	0	0	0	40	40	50	2.1	3.1	3.9
		8月	0	0	0	90	90	74	7.4	5.3	8.3
		9月	0	0	30	60	90	81	19.9	16.6	8.7
		10月	0	0	0	90	90	70	5.7	5.3	3.5
	県全体	7月	0	0	0	22	22	34	0.6	1.7	2.2
		8月	0	0	6	62	68	61	7.6	10.5	5.6
		9月	0	0	22	60	82	78	16.2	17.8	10.7
		10月	0	0	8	82	90	64	7.8	8.6	3.9

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	甚	程度別発生面積率 (%)			調査項目	発生程度	
				多	中	少		平均	標準偏差
もち病	富士山麓	5月	0	0	0	20	24	8.6	18.8
		6月	0	0	0	70	70	12.0	16.9
		7月	0	0	0	10	10	0.1	0.3
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	静岡県北部市	10月	0	0	0	0	4	0.0	0.0
		5月	0	0	0	30	30	3.5	8.9
		6月	0	0	0	50	80	56.0	72.3
		7月	0	0	0	0	28	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
もち病	牧之原	9月	0	0	0	0	4	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	40	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		6月	0	0	0	0	5	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	9	0.0	0.0
	磐小田笠原・	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
		6月	0	0	0	0	3	0.0	0.0
もち病	川根	7月	0	0	0	0	5	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	川根	5月	0	0	0	40	40	5.8	8.1
		6月	0	0	0	60	60	4.8	9.1
		7月	0	0	0	30	30	5.9	12.0
		8月	0	0	0	0	10	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	10	0.0	0.0
もち病	川根	10月	0	0	0	10	16	0.2	0.6
	川根	5月	0	0	0	18	18	3.6	10.5
		6月	0	0	0	6	42	14.6	39.6
		7月	0	0	0	8	8	1.2	5.8
		8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
もち病	川根	9月	0	0	0	0	3	0.0	0.0
		10月	0	0	0	2	2	0.0	0.0
	川根	5月	0	0	0	2	12	0.0	0.3
		6月	0	0	0	2	12	0.0	0.3
		7月	0	0	0	2	12	0.0	0.3

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	甚	程度別発生面積率 (%)			調査項目	発生程度	
				多	中	少		平均	標準偏差
炭疽病	富士山麓	3月	0	0	10	80	80	21.5	27.1
		5月	0	0	0	80	29	8.0	13.9
		6月	0	0	0	80	38	6.6	6.6
		7月	0	0	0	20	68	2.0	5.7
		8月	0	0	0	40	61	2.6	6.2
	静岡県北部市	9月	0	0	0	70	71	9.0	15.8
		10月	0	0	0	60	78	3.7	6.1
		3月	0	0	0	100	100	20.8	14.1
		5月	0	0	0	90	28	7.4	7.8
		6月	0	0	0	100	48	7.0	8.1
炭疽病	牧之原	7月	0	0	0	80	61	3.1	2.5
		8月	0	0	0	50	56	0.9	0.9
		9月	0	0	0	70	64	3.2	4.3
		10月	0	0	0	70	78	6.7	6.4
	牧之原	3月	0	0	20	80	72	37.6	38.5
		5月	0	0	0	90	25	5.0	3.6
		6月	0	0	0	70	31	3.9	4.3
		7月	0	0	0	60	59	2.8	4.0
		8月	0	0	10	60	79	14.8	31.8
炭疽病	磐小田笠原・	9月	0	0	10	40	81	34.1	62.4
		10月	0	0	0	70	81	3.9	5.4
		3月	0	0	0	90	49	22.8	23.0
		5月	0	0	0	50	16	1.1	1.3
		6月	0	0	0	50	16	6.8	17.8
	磐小田笠原・	7月	0	0	0	70	43	10.3	12.5
		8月	0	0	10	50	67	20.0	35.3
		9月	0	0	0	80	59	6.8	7.6
		10月	0	0	0	70	67	5.3	5.0
		3月	0	0	20	80	83	57.5	67.7
炭疽病	川根	5月	0	0	10	70	80	20.7	39.4
		6月	0	0	0	100	100	13.2	12.2
		7月	0	0	0	90	67	18.3	15.2
		8月	0	10	0	70	80	49.8	133.2
		9月	0	0	20	80	87	39.9	58.8
	川根	10月	0	0	0	60	89	9.9	12.8
		3月	0	0	0	86	96	32.0	41.3
		5月	0	0	2	76	78	8.4	20.2
		6月	0	0	0	80	36	7.5	11.3
		7月	0	0	0	64	60	7.3	11.3
炭疽病	川根	8月	0	2	4	54	67	17.6	65.7
		9月	0	0	6	68	72	18.6	42.0
		10月	0	0	0	66	79	5.9	8.0
	川根	3月	0	0	0	86	96	32.0	41.3
		5月	0	0	2	76	78	8.4	20.2
		6月	0	0	0	80	36	7.5	11.3
		7月	0	0	0	64	60	7.3	11.3
		8月	0	2	4	54	67	17.6	65.7
		9月	0	0	6	68	72	18.6	42.0
		10月	0	0	0	66	79	5.9	8.0

チャ (調査点数：50点, 栽培面積：13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度			
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値	
赤 焼 病	山富 麓土	2月	0	0	0	0	0	3	病葉数 /1.25	0.0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	1	病葉数 /1.25	0.0	0.0	0.0
		4月	0	0	0	0	0	4	m ²	0.0	0.0	0.1
		10月	0	0	0	0	0	0	m ²	0.0	0.0	0.0
	静 北岡 部市	2月	0	0	0	0	0	11	病葉数	0.0	0.0	0.3
		3月	0	0	0	10	10	3	病葉数 /1.25	1.3	3.9	0.1
		4月	0	0	0	10	10	13	m ²	4.0	12.0	1.2
		10月	0	0	0	0	0	1	m ²	0.0	0.0	0.0
	牧 之 原	2月	0	0	0	0	0	10	病葉数	0.0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	7	病葉数 /1.25	0.0	0.0	0.2
		4月	0	0	0	0	0	9	m ²	0.0	0.0	0.4
		10月	0	0	0	0	0	2	m ²	0.0	0.0	0.1
磐小 田笠 原・	2月	0	0	0	0	0	7	病葉数	0.0	0.0	0.0	
	3月	0	0	0	0	0	7	病葉数 /1.25	0.0	0.0	0.1	
	4月	0	0	0	0	0	2	m ²	0.0	0.0	0.0	
	10月	0	0	0	0	0	1	m ²	0.0	0.0	0.0	
川 根	2月	0	0	0	20	20	5	病葉数	0.3	0.6	0.0	
	3月	0	0	0	0	0	1	病葉数 /1.25	0.0	0.0	0.0	
	4月	0	0	0	0	0	4	m ²	0.0	0.0	0.1	
	10月	0	0	0	0	0	1	m ²	0.0	0.0	0.0	
県全体	2月	0	0	0	4	4	7	病葉数	0.1	0.3	0.1	
	3月	0	0	0	2	2	4	病葉数 /1.25	0.3	1.8	0.1	
	4月	0	0	0	2	2	6	m ²	0.8	5.6	0.4	
	10月	0	0	0	0	0	1	m ²	0.0	0.0	0.0	

チャ (調査点数：50点, 栽培面積：13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度					
			甚	多	中	少		計	平均	標準偏差	平年値		
網もち病	富士山麓	3月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0		
		7月	0	0	0	0	0	3	病葉数	0.0	0.0	0.0	
		8月	0	0	0	0	0	0	/1.25	0.0	0.0	0.0	
		9月	0	0	0	0	0	0	m ²	0.0	0.0	0.0	
	静岡北部市	10月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.1		
		3月	0	0	0	20	20	4	0.8	1.8	0.6		
		7月	0	0	0	10	10	5	病葉数	0.2	0.6	0.2	
		8月	0	0	0	0	0	0	/1.25	0.0	0.0	0.0	
	牧之原	9月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		10月	0	0	0	0	0	5	m ²	0.0	0.0	0.2	
網もち病	牧之原	3月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		7月	0	0	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0	/1.25	0.0	0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0	m ²	0.0	0.0	0.0	0.0
	磐小田笠原・	10月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0	/1.25	0.0	0.0	0.0	0.0
	川根	9月	0	0	0	0	0	0	m ²	0.0	0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
褐色円星病	川根	3月	0	0	0	10	10	3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0	0	0	病葉数	0.0	0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0	/1.25	0.0	0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	0	m ²	0.0	0.0	0.0	0.0
	県全体	10月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3月	0	0	0	6	6	2	0.2	0.9	0.1	0.0	0.1
		7月	0	0	0	2	2	2	病葉数	0.0	0.3	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0	0	0	/1.25	0.0	0.0	0.0	0.0
	県全体	9月	0	0	0	0	0	0	m ²	0.0	0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
褐色円星病	山富麓土	3月	0	0	20	80	100	90	31.9	27.9	19.5	19.5	46.9
		4月	0	10	40	50	100	100	発病率%	57.1	18.6	46.9	13.7
		7月	0	0	30	40	70	69	23.4	28.5	13.7	10.3	33.2
		3月	0	0	80	80	74	74	発病率%	11.5	16.1	10.3	16.6
	静岡北部市	4月	0	10	30	60	100	99	43.2	28.4	33.2	60.0	12.0
		7月	0	0	0	100	100	76	27.8	13.6	16.6	34.2	22.5
		3月	0	0	10	60	70	94	14.4	19.3	34.2	52.1	16.1
		4月	0	10	20	70	100	100	51.1	24.5	60.0	8.0	21.5
	磐小田笠原・	7月	0	0	0	70	70	53	12.8	14.1	12.0	6.0	12.8
		3月	0	0	0	90	90	90	8.2	5.5	22.5	19.9	48.9
川根	4月	0	0	70	30	100	99	54.1	20.3	52.1	18.9	12.8	
	7月	0	0	0	80	80	68	14.4	14.9	16.1	42.7	19.0	
	3月	0	0	0	80	80	73	14.1	14.1	8.0	21.5	6.0	
	4月	0	10	20	70	100	98	43.5	23.7	21.5	7.5	6.0	
県全体	7月	0	0	0	50	50	54	4.8	7.5	6.0	19.9	48.9	
	3月	0	0	0	72	72	84	16.0	19.9	18.9	24.0	12.8	
	4月	0	8	36	56	100	99	49.8	24.0	42.7	19.0	12.8	
	7月	0	0	6	68	74	64	16.6	19.0	12.8	19.0	12.8	

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)															
病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)					発生程度						
				甚	多	中	少	計	平年値	平均	標準偏差	平年値			
チャ	富士山麓	3月	幼虫数 /1.25 ㎡	0	0	0	20	20	13	0.3	0.6	0.2			
		4月		0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.1			
		5月		0	0	0	10	10	9	0.1	0.3	0.3			
		6月		0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1			
		7月		0	0	0	10	10	22	0.1	0.3	0.8			
		8月		0	0	0	10	10	30	0.2	0.6	1.1			
		9月		0	0	0	10	10	18	0.1	0.3	0.9			
		10月		0	0	0	0	0	33	0.0	0.0	0.7			
		ヤ		静岡北部市	3月	幼虫数 /1.25 ㎡	0	0	0	0	0	9	0.0	0.0	0.2
					4月		0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0
5月	0		0		0		10	10	2	0.3	0.9	0.0			
6月	0		0		0		0	0	7	0.0	0.0	0.1			
7月	0		0		0		20	20	14	0.4	0.8	0.4			
8月	0		0		0		0	0	8	0.0	0.0	0.1			
9月	0		0		0		0	0	2	0.0	0.0	0.0			
10月	0		0		0		0	0	6	0.0	0.0	0.1			
ノ	牧之原		3月		幼虫数 /1.25 ㎡		0	0	0	50	50	18	1.1	1.5	0.5
			4月				0	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.2
		5月	0	0		0	10	10	6	0.1	0.3	0.1			
		6月	0	0		0	0	0	5	0.0	0.0	0.1			
		7月	0	0		0	20	20	13	0.2	0.4	0.7			
		8月	0	0		0	10	10	22	0.1	0.3	0.8			
		9月	0	0		0	20	20	18	0.4	0.9	0.7			
		10月	0	0		0	10	10	16	0.1	0.3	1.3			
		コ	磐小田笠原・	3月		幼虫数 /1.25 ㎡	0	0	0	10	10	18	0.1	0.3	0.3
				4月			0	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.2
5月	0			0	0		0	0	5	0.0	0.0	0.1			
6月	0			0	0		0	0	4	0.0	0.0	0.0			
7月	0			0	0		10	10	28	0.1	0.3	0.7			
8月	0			0	0		0	0	16	0.0	0.0	0.7			
9月	0			0	0		0	0	8	0.0	0.0	0.2			
10月	0			0	0		10	10	15	0.4	1.2	0.3			
カ	川根			3月	幼虫数 /1.25 ㎡		0	0	0	0	0	10	0.0	0.0	0.1
				4月			0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0
		5月	0	0		0	20	20	4	0.3	0.6	0.1			
		6月	0	0		0	0	0	6	0.0	0.0	0.1			
		7月	0	0		10	20	30	25	1.2	2.7	0.9			
		8月	0	0		0	20	20	21	0.7	1.8	0.7			
		9月	0	0		10	0	10	11	1.2	3.6	0.1			
		10月	0	0		0	10	10	14	0.2	0.6	0.6			
		ク	県全体	3月		幼虫数 /1.25 ㎡	0	0	0	16	16	14	0.3	0.9	0.3
				4月			0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.1
5月	0			0	0		10	10	7	0.2	0.5	0.1			
6月	0			0	0		0	0	6	0.0	0.0	0.1			
7月	0			0	2		16	18	21	0.4	1.3	0.7			
8月	0			0	0		8	8	20	0.2	0.9	0.7			
9月	0			0	2		6	8	11	0.3	1.7	0.4			
10月	0			0	0		6	6	17	0.1	0.6	0.6			

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)														
病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)					発生程度					
				甚	多	中	少	計	平年値	平均	標準偏差	平年値		
チャハマキ	富士山麓	3月	幼虫数 /1.25 m ²	0	0	0	50	50	10	2.0	2.3	0.2		
		4月		0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0		
		5月		0	0	10	40	50	13	1.7	2.2	0.6		
		6月		0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.1		
		7月		0	0	0	20	20	14	0.2	0.4	0.3		
		8月		0	0	0	10	10	16	0.2	0.6	0.7		
		9月		0	0	0	10	10	10	0.1	0.3	0.4		
		10月		0	0	0	10	10	25	0.1	0.3	0.7		
		静岡県北部市		3月	幼虫数 /1.25 m ²	0	0	0	30	30	18	0.3	0.5	0.3
				4月		0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.1
5月	0		0	0		40	40	15	0.9	1.8	0.5			
6月	0		0	0		0	0	12	0.0	0.0	0.4			
7月	0		0	0		10	10	24	0.1	0.3	1.0			
8月	0		0	0		0	0	12	0.0	0.0	0.8			
9月	0		0	0		0	0	3	0.0	0.0	0.1			
10月	0		0	0		10	10	10	0.1	0.3	0.5			
牧之原	3月		幼虫数 /1.25 m ²	0		0	0	40	40	17	0.5	0.7	0.6	
	4月			0		0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.0	
	5月	0		0	0	20	20	9	0.3	0.6	0.3			
	6月	0		0	0	20	20	6	0.4	0.9	0.2			
	7月	0		0	0	10	10	10	0.1	0.3	0.1			
	8月	0		0	0	0	0	8	0.0	0.0	0.1			
	9月	0		0	0	10	10	4	0.1	0.3	0.3			
	10月	0		0	0	20	20	11	0.4	0.9	0.2			
	磐小田笠原・	3月		幼虫数 /1.25 m ²	0	0	0	30	30	7	0.3	0.5	0.1	
		4月			0	0	0	30	30	2	0.3	0.5	0.1	
5月		0	0		0	10	10	6	0.1	0.3	0.1			
6月		0	0		0	0	0	7	0.0	0.0	0.1			
7月		0	0		0	20	20	18	0.3	0.6	0.4			
8月		0	0		0	0	0	6	0.0	0.0	0.2			
9月		0	0		0	0	0	3	0.0	0.0	0.1			
10月		0	0		0	0	0	16	0.0	0.0	0.4			
川根		3月	幼虫数 /1.25 m ²		0	0	0	30	30	12	0.6	1.0	0.2	
		4月			0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.2	
	5月	0		0	10	30	40	22	1.1	2.1	0.8			
	6月	0		0	0	0	0	19	0.0	0.0	0.5			
	7月	0		0	0	40	40	36	0.8	1.2	2.2			
	8月	0		0	0	10	10	22	0.5	1.5	1.8			
	9月	0		0	0	20	20	8	0.6	1.2	0.2			
	10月	0		0	0	20	20	15	0.3	0.6	0.9			
	県全体	3月		幼虫数 /1.25 m ²	0	0	0	36	36	13	0.7	1.4	0.3	
		4月			0	0	0	6	6	3	0.1	0.2	0.1	
5月		0	0		4	28	32	13	0.8	1.7	0.4			
6月		0	0		0	4	4	10	0.1	0.4	0.3			
7月		0	0		0	20	20	20	0.3	0.7	0.8			
8月		0	0		0	4	4	13	0.1	0.7	0.7			
9月		0	0		0	8	8	6	0.2	0.6	0.2			
10月		0	0		0	12	12	15	0.2	0.6	0.5			

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,800ha)												
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)			調査項目	発生程度					
			甚	多	中		少	計	平年値	平均	標準偏差	平年値
チャノナガサビダニ	山富麓土	5月 6月					10 0	3 0	3.0 0.0	3.0 0.0	0.3 0.0	
	静岡県北	5月 6月					10 10	0 0	1.0 1.0	3.0 3.0	0.0 0.0	
	牧原之	5月 6月					30 0	2 2	5.0 0.0	9.2 0.0	0.3 0.5	
	小笠原・磐田	5月 6月					0 0	5 2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.2	
	川根	5月 6月					0 0	2 0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.2 0.0	
	県全体	5月 6月					10 2	2 1	1.8 0.2	6.2 1.4	0.3 0.1	
	山富麓土	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 0	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.0	
	静岡県北	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 0	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.0	
	牧原之	8月 9月 10月					0 0 0	0 2 5	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.7	
	磐田原・	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 0	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.8	
チャノホコリダニ	山富麓土	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 0	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.0	
	静岡県北	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 0	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.0	
	牧原之	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 0	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.0	
	磐田原・	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 0	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.0	
	川根	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 0	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.0	
	県全体	8月 9月 10月					0 0 0	0 0 1	被害面積率 (%)		0.0 0.0 0.0	

チャ (調査点数：50点，栽培面積：13,800ha)												
病害虫名	調査地域	調査時期	甚	程度別発生面積率 (%)			調査項目	発生程度				
				多	中	少		平均	標準偏差			
チャノホコリダニ	富士山麓	5月	0	0	0	20	17	0.7	1.6	0.4		
		6月	0	0	0	70	55	3.4	5.1	4.2		
		7月	0	0	0	40	34	0.7	1.2	2.2		
		8月	0	0	0	10	25	0.1	0.3	1.9		
		9月	0	0	0	10	31	0.1	0.3	1.7		
	静岡北部市	10月	0	0	0	20	24	0.2	0.4	0.8		
		5月	0	0	0	60	29	1.0	1.1	1.0		
		6月	0	0	0	90	59	5.7	4.5	5.2		
		7月	0	0	0	10	21	0.1	0.3	0.8		
		8月	0	0	0	0	18	0.0	0.0	0.5		
チャノホコリダニ	牧之原	9月	0	0	0	0	28	0.0	0.0	1.2		
		10月	0	0	0	30	40	0.4	0.7	3.7		
		5月	0	0	0	20	18	0.2	0.4	0.4		
		6月	0	0	0	60	31	0.9	0.9	1.4		
		7月	0	0	0	0	31	0.0	0.0	1.5		
	磐小田笠原・	8月	0	0	0	50	48	0.6	0.7	2.1		
		9月	0	0	0	20	48	0.4	0.9	1.7		
		10月	0	0	0	10	20	0.1	0.3	0.6		
		5月	0	0	0	10	12	1.0	0.3	0.2		
		6月	0	0	0	30	21	0.4	0.7	0.5		
チャノホコリダニ	川根	7月	0	0	0	10	23	0.1	0.3	1.2		
		8月	0	0	0	50	27	1.0	1.3	0.5		
		9月	0	0	0	0	19	0.0	0.0	0.8		
		10月	0	0	0	20	14	0.3	0.6	0.2		
		5月	0	0	0	40	14	0.7	1.0	0.3		
	県全体	6月	0	0	0	60	31	3.3	4.8	0.8		
		7月	0	0	0	40	15	0.5	0.7	0.2		
		8月	0	0	0	0	20	0.0	0.0	0.4		
		9月	0	0	0	20	24	0.5	1.2	0.5		
		10月	0	0	0	30	10	0.4	0.7	0.2		
チャノホコリダニ	県全体	5月	0	0	0	30	18	0.5	1.0	0.4		
		6月	0	0	0	62	39	2.7	4.2	2.4		
		7月	0	0	0	20	25	0.3	0.7	1.2		
		8月	0	0	0	22	28	0.3	0.8	1.1		
		9月	0	0	0	10	30	0.2	0.7	1.2		
	チャノホコリダニ	10月	0	0	0	22	22	0.3	0.6	1.1		

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	甚	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
				多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値
カンザワハダニ 摘採面	県全体	2月	0	0	2	14	16	16	0.5	1.9	0.3
		3月	0	0	4	34	38	25	1.3	3.3	0.8
		4月	0	2	10	44	56	42	3.3	7.5	1.9
		5月	0	0	10	34	44	46	2.7	5.9	2.5
		6月	0	0	0	2	2	25	0.0	0.1	1.2
		7月	0	0	0	12	12	16	0.4	1.5	0.4
		8月	0	10	24	34	68	29	10.3	14.8	2.3
		9月	0	0	0	24	24	43	0.3	0.6	3.0
		10月	0	0	0	16	16	28	0.4	1.5	1.3
		カンザワハダニ裾部	山富士麓	2月	0	0	0	20	20	37	0.5
3月	0			0	0	30	30	24	0.7	1.5	1.2
4月	0			0	0	30	30	39	0.7	1.3	2.0
静岡県北部市	2月		0	0	0	10	10	26	1.0	3.0	0.5
	3月		0	0	0	30	30	27	0.9	2.1	0.5
	4月		0	0	0	20	20	43	0.7	1.6	1.7
牧之原	2月		0	0	0	30	30	52	1.1	1.8	1.7
	3月		0	0	0	30	30	43	1.0	2.1	1.3
磐小田笠原・川根	2月		0	0	0	90	90	54	4.4	6.0	2.5
	3月		0	0	0	10	10	31	0.2	0.4	1.1
カンザワハダニ裾部	磐小田笠原・川根	4月	0	0	0	60	60	42	0.1	0.3	1.0
		2月	0	0	0	30	30	31	1.8	2.3	1.4
		3月	0	0	0	50	50	35	1.9	3.4	1.6
	川根	4月	0	0	0	50	50	43	3.0	5.9	1.5
		2月	0	0	0	22	22	38	8.0	13.0	1.7
	県全体	3月	0	0	0	30	30	32	0.9	2.3	1.2
		4月	0	0	0	50	50	44	1.1	3.2	1.1
		2月	0	0	0	50	50	44	3.1	7.1	1.9

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少		計	平年値	平均	標準偏差	平年値
カシノザワハダニ摘採面	富士山麓	2月	0	0	0	20	20	17	0.2	0.4	0.3	
		3月	0	0	0	60	60	22	1.3	1.7	1.3	
		4月	0	0	0	40	40	43	0.5	0.7	2.3	
		5月	0	0	0	10	10	37	1.8	5.1	1.9	
		6月	0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.5	
		7月	0	0	0	30	30	15	1.2	3.0	0.4	
		8月	0	10	20	40	70	28	11.7	16.9	2.6	
		9月	0	0	0	10	10	51	0.1	0.3	4.0	
		10月	0	0	0	10	10	32	0.1	0.3	1.2	
		カシノザワハダニ摘採面	静岡県北部市	2月	0	0	0	10	10	19	1.5	3.9
3月	0			0	0	10	40	50	27	2.1	4.4	0.7
4月	0			0	0	20	40	60	50	3.5	5.9	2.4
5月	0			0	0	30	30	43	0.6	0.9	2.9	
6月	0			0	0	0	0	32	0.0	0.0	1.0	
7月	0			0	0	10	10	13	0.2	0.6	0.2	
8月	0			20	30	30	80	29	14.8	12.9	2.2	
9月	0			0	0	40	40	54	0.6	0.8	3.2	
10月	0			0	0	20	20	41	0.5	1.2	2.5	
カシノザワハダニ摘採面	牧之原			2月	0	0	0	0	0	14	0.0	0.0
		3月	0	0	0	20	20	19	0.2	0.4	0.4	
		4月	0	0	0	70	70	43	1.9	2.0	1.5	
		5月	0	0	0	80	80	52	2.2	2.0	3.8	
		6月	0	0	0	10	10	25	0.1	0.3	1.8	
		7月	0	0	0	10	10	17	0.3	0.9	0.7	
		8月	0	0	0	30	40	37	2.5	4.0	3.9	
		9月	0	0	0	10	10	32	0.2	0.6	2.8	
		10月	0	0	0	10	10	21	0.1	0.3	0.7	
		カシノザワハダニ摘採面	磐小田笠原・川根	2月	0	0	0	10	10	17	0.1	0.3
3月	0			0	0	0	0	29	0.0	0.0	0.7	
4月	0			0	0	30	40	30	1.9	3.7	1.1	
5月	0			0	0	20	30	56	3.7	8.9	1.9	
6月	0			0	0	0	0	36	0.0	0.0	1.1	
7月	0			0	0	0	0	20	0.0	0.0	0.6	
8月	0			10	20	40	70	33	11.1	20.3	2.2	
9月	0			0	0	40	40	41	0.4	0.5	3.3	
10月	0			0	0	30	30	24	1.3	3.0	0.8	
カシノザワハダニ摘採面	川根			2月	0	0	0	30	30	14	0.7	1.3
		3月	0	0	0	10	50	29	2.9	5.2	1.1	
		4月	0	10	20	40	70	43	8.7	13.6	2.2	
		5月	0	0	30	30	60	41	5.1	7.0	1.9	
		6月	0	0	0	0	0	27	0.0	0.0	1.4	
		7月	0	0	0	10	10	16	0.1	0.3	0.3	
		8月	0	10	40	30	80	20	11.5	11.5	0.7	
		9月	0	0	0	20	20	35	0.3	0.6	1.5	
		10月	0	0	0	10	10	25	0.1	0.3	1.2	

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度					
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値			
チャノキイロアザミウマ	富士山麓	4月	0	0	0	50	15	叩き落とし 虫数/4カ所	0.9	1.2	0.2		
		5月	0	0	10	50	60		64	7.2	12.6	3.0	
	静岡北都市	6月	0	0	10	70	80	82	叩き落とし 虫数/4カ所	17.2	25.6	7.4	
		7月	0	0	10	90	100	90		20.3	16.2	12.0	
	牧之原	8月	0	0	10	80	90	92	叩き落とし 虫数/4カ所	14.9	15.4	15.0	
		9月	0	0	0	70	70	63		4.6	7.0	4.5	
	磐小田笠原・	10月	0	0	0	70	31	叩き落とし 虫数/4カ所	2.1	2.2	1.2		
		4月	0	0	0	60	60		18	1.0	1.0	0.3	
	川根	5月	0	0	0	90	64	叩き落とし 虫数/4カ所	4.3	2.4	3.1		
		6月	0	0	0	100	84		90	6.2	4.8	7.0	
県全体	県全体	7月	0	0	0	100	90	叩き落とし 虫数/4カ所	13.5	8.5	6.7		
		8月	0	0	0	60	60		75	6.1	7.4	5.1	
		9月	0	0	0	90	90		67	2.5	1.8	2.9	
チャノキイロアザミウマ	富士山麓	10月	0	0	0	60	58	叩き落とし 虫数/4カ所	1.1	1.2	1.5		
		4月	0	0	0	60	60		34	1.6	1.6	1.0	
	静岡北都市	5月	0	0	0	60	87	叩き落とし 虫数/4カ所	1.7	2.7	8.5		
		6月	0	0	10	80	90		99	14.6	18.2	20.8	
	牧之原	7月	0	0	0	90	90	88	叩き落とし 虫数/4カ所	8.0	4.7	17.2	
		8月	0	0	0	90	90	92		4.9	4.2	15.8	
	磐小田笠原・	9月	0	0	0	100	77	叩き落とし 虫数/4カ所	8.3	9.6	5.5		
		10月	0	0	0	90	90		57	6.3	8.6	2.6	
	川根	4月	0	0	0	80	27	叩き落とし 虫数/4カ所	1.5	1.4	0.7		
		5月	0	0	0	60	60		91	2.5	2.6	8.6	
県全体	県全体	6月	0	0	0	90	94	叩き落とし 虫数/4カ所	5.7	4.4	15.8		
		7月	0	0	0	70	86		5.5	5.0	10.7		
		8月	0	0	0	70	88		1.8	1.7	13.1		
チャノキイロアザミウマ	富士山麓	9月	0	0	0	90	77	叩き落とし 虫数/4カ所	4.1	2.9	8.4		
		10月	0	0	10	90	68		10.1	14.9	2.8		
	静岡北都市	4月	0	0	0	30	13	叩き落とし 虫数/4カ所	0.8	1.4	0.2		
		5月	0	0	0	20	40		0.7	1.6	1.5		
	牧之原	6月	0	0	0	90	92	叩き落とし 虫数/4カ所	8.2	6.8	7.3		
		7月	0	0	0	100	93		17.6	7.9	6.3		
	磐小田笠原・	8月	0	0	10	80	77	叩き落とし 虫数/4カ所	13.8	14.4	6.1		
		9月	0	0	0	70	65		2.0	2.2	3.2		
	川根	10月	0	0	0	60	34	叩き落とし 虫数/4カ所	2.4	2.3	0.7		
		4月	0	0	0	56	22		1.2	1.4	0.5		
県全体	県全体	5月	0	0	2	56	69	叩き落とし 虫数/4カ所	3.3	6.4	4.9		
		6月	0	0	4	86	90		10.4	15.4	11.7		
		7月	0	0	2	90	92		13.0	11.0	10.6		
チャノキイロアザミウマ	富士山麓	8月	0	0	4	76	85	叩き落とし 虫数/4カ所	8.3	11.4	11.0		
		9月	0	0	0	84	70		4.3	6.0	4.9		
	静岡北都市	10月	0	0	2	74	50	叩き落とし 虫数/4カ所	4.4	8.5	1.7		
		4月	0	0	0	60	18		1.0	1.0	0.3		
	牧之原	5月	0	0	0	90	64	叩き落とし 虫数/4カ所	4.3	2.4	3.1		
		6月	0	0	0	100	84		90	6.2	4.8	7.0	
	磐小田笠原・	7月	0	0	0	100	90	叩き落とし 虫数/4カ所	13.5	8.5	6.7		
		8月	0	0	0	60	60		75	6.1	7.4	5.1	
	川根	9月	0	0	0	90	90	叩き落とし 虫数/4カ所	2.5	1.8	2.9		
		10月	0	0	0	60	60		58	1.1	1.2	1.5	

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)				発生程度	
				甚	多	中	少	平均	標準偏差
クワシロカイガラムシ	富士山麓	4月	雄繭寄生株率%	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
		8月		0	0	0	0	0.0	0.0
	静岡北岡部市	9月		0	0	0	0	0.0	0.0
		10月		0	0	0	0	0.0	0.0
		4月	雄繭寄生株率%	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
		8月		0	0	0	0	0.0	0.0
	牧之原	9月		0	0	0	0	0.0	0.0
		10月		0	0	0	0	0.0	0.0
		4月	雄繭寄生株率%	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
		8月		0	0	0	0	0.0	0.0
	磐小田笠原・	9月		0	0	0	0	0.0	0.0
		10月		0	0	0	0	0.0	0.0
		4月	雄繭寄生株率%	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
		8月		0	0	0	0	0.0	0.0
	川根	9月		0	0	0	0	0.0	0.0
		10月		0	0	0	0	0.0	0.0
		4月	雄繭寄生株率%	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
		8月		0	0	0	0	0.0	0.0
	県全体	9月		0	0	0	0	0.0	0.0
		10月		0	0	0	0	0.0	0.0
		4月	雄繭寄生株率%	0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
		8月		0	0	0	0	0.0	0.0

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)				発生程度	
				甚	多	中	少	平均	標準偏差
ソマグロアオカスミカメ	山富麓	4月	被害芽数/m ²	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
	静岡北岡部市	4月		0	0	0	0	0.0	0.0
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
	牧之原	4月	被害芽数/m ²	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
コシカンアブラムシ	磐小田笠原・	4月	被害芽数/m ²	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
	川根	4月	被害芽数/m ²	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0
	県全体	4月	被害芽数/m ²	0	0	0	0	0.0	0.0
		5月		0	0	0	0	0.0	0.0
		6月		0	0	0	0	0.0	0.0
		7月		0	0	0	0	0.0	0.0

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)													
病害虫名	調査地域	調査時期	甚	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度				
				甚	多	中	少		計	平年値	平均	標準偏差	平年値
マダラカサハラハムシ	富士山麓	4月						0	1	0.0	0.0	0.0	
		5月						0	2	0.0	0.0	0.0	
		6月						0	2	0.0	0.0	0.1	
		7月						0	0	0.0	0.0	0.0	
		8月						0	6	0.0	0.0	0.0	
	静岡市北部	9月						20	11	0.2	0.4	0.2	
		10月						0	2	0.0	0.0	0.0	
		4月						0	0	0.0	0.0	0.0	
		5月						0	2	0.0	0.0	0.0	
		6月						0	0	0.0	0.0	0.0	
牧之原	7月						0	0	0.0	0.0	0.0		
	8月						20	4	0.4	0.9	0.1		
	9月						10	5	0.1	0.3	0.1		
	10月						10	1	0.1	0.3	0.0		
	4月						0	1	0.0	0.0	0.0		
小笠・磐田原	5月						0	2	0.0	0.0	0.0		
	6月						0	1	0.0	0.0	0.0		
	7月						0	0	0.0	0.0	0.0		
	8月						0	1	0.0	0.0	0.0		
	9月						0	6	0.0	0.0	0.1		
川根地域	10月						0	6	0.0	0.0	0.1		
	4月						0	1	0.0	0.0	0.0		
	5月						0	3	0.0	0.0	0.0		
	6月						0	0	0.0	0.0	0.0		
	7月						0	0	0.0	0.0	0.0		
県全体	8月						0	4	0.0	0.0	0.0		
	9月						30	5	0.3	0.5	0.1		
	10月						0	2	0.0	0.0	0.0		
	4月						0	1	0.0	0.0	0.0		
	5月						0	2	0.0	0.0	0.0		
	6月						0	1	0.0	0.0	0.0		
	7月						0	0	0.0	0.0	0.0		
	8月						0	0	0.0	0.0	0.0		
	9月						4	5	0.1	0.4	0.1		
	10月						18	8	0.2	0.4	0.1		
							6	4	0.1	0.2	0.0		

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13,800ha)													
病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少	計		平年値	平均	標準偏差	平年値	
ヨモギエダシヤク	富士山麓	4月	0	0	0	0	0	0	叩き落とし 虫数 /4か所	0.0	0.0	0.0	
		5月	0	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.0	
		6月	0	0	0	20	20	6		0.2	0.4	0.2	
		7月	0	0	0	10	10	8		0.1	0.3	0.1	
		8月	0	0	0	20	20	5		0.2	0.4	0.1	
	静岡北部市	9月	0	0	0	20	20	6	0.2	0.4	0.1		
		10月	0	0	0	10	10	2	0.1	0.3	0.0		
		4月	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0		
		5月	0	0	0	0	0	5	0.0	0.0	0.1		
		6月	0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0		
牧之原	7月	0	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.1			
	8月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0	0.0			
	9月	0	0	0	20	20	10	0.2	0.4	0.1			
	10月	0	0	0	30	30	1	0.3	0.5	0.0			
	4月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
磐小田笠原・	5月	0	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0			
	6月	0	0	0	10	10	15	0.1	0.3	0.2			
	7月	0	0	0	10	10	9	0.1	0.3	0.1			
	8月	0	0	0	0	0	6	0.0	0.0	0.1			
	9月	0	0	0	10	10	17	0.1	0.3	0.2			
10月	0	10	0	20	30	9	0.8	1.8	0.1				
川根	4月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
	5月	0	0	0	20	20	4	0.2	0.4	0.0			
	6月	0	0	0	20	20	8	0.2	0.4	0.1			
	7月	0	0	0	20	20	14	0.2	0.4	0.2			
	8月	0	0	0	0	0	8	0.0	0.0	0.1			
県全体	9月	0	0	0	0	0	9	0.1	0.3	0.1			
	10月	0	0	0	10	10	8	0.1	0.3	0.1			
	4月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
	5月	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0			
	6月	0	0	0	20	20	10	0.2	0.4	0.1			
磐小田笠原・	7月	0	0	10	10	20	5	0.4	0.9	0.1			
	8月	0	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.1			
	9月	0	0	0	30	30	3	0.3	0.5	0.0			
	10月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
	4月	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0			
川根	5月	0	0	0	0	0	3	0.0	0.2	0.0			
	6月	0	0	0	4	4	9	0.1	0.3	0.1			
	7月	0	0	0	14	14	9	0.2	0.5	0.1			
	8月	0	0	2	10	12	7	0.0	0.2	0.1			
	9月	0	0	0	4	4	9	0.2	0.4	0.1			
10月	0	2	0	14	16	4	0.3	0.9	0.0				

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13, 800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目		発生程度	
			甚	多	中	少	計	平年値	平均	標準偏差
チャトゲコナジラミ摘採面	富士山麓	3月	0	0	0	80	80	91	2.2	2.0
		4月	0	0	0	70	70	86	3.6	4.5
		5月	0	0	0	10	10	48	0.2	0.6
		6月	0	0	0	0	0	46	0.0	0.0
		7月	0	0	0	80	80	54	6.4	6.6
	静岡北部市	8月	0	0	0	20	20	12	0.2	0.4
		9月	0	0	0	0	0	24	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0	0	51	0.0	0.0
		3月	0	0	0	70	70	87	1.6	1.6
		4月	0	0	0	70	70	90	3.0	2.9
チャトゲコナジラミ摘採面	牧之原	5月	0	0	0	20	20	36	0.2	0.4
		6月	0	0	0	10	10	33	0.1	0.3
		7月	0	0	20	50	70	73	7.2	9.2
		8月	0	0	0	10	10	14	0.2	0.6
		9月	0	0	0	0	0	26	0.0	0.0
	磐小田笠原・	10月	0	0	0	40	40	56	2.4	5.9
		3月	0	0	0	40	40	87	1.4	2.9
		4月	0	0	0	80	80	93	3.5	5.5
		5月	0	0	0	0	0	28	0.0	0.0
		6月	0	0	0	0	0	40	0.0	0.0
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	7月	0	0	0	30	30	43	0.4	0.7
		8月	0	0	0	0	0	26	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	17	0.0	0.0
		10月	0	0	0	60	60	59	1.0	1.4
	県全体	3月	0	0	0	60	60	89	2.3	2.5
		4月	0	0	10	70	80	86	4.8	6.4
		5月	0	0	0	20	20	38	0.2	0.4
		6月	0	0	0	20	20	47	0.2	0.4
		7月	0	0	0	50	50	64	1.6	2.3
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	8月	0	0	0	10	10	26	0.2	0.6
		9月	0	0	0	0	0	30	0.0	0.0
		10月	0	0	0	50	50	53	3.1	4.6
	県全体	3月	0	0	0	40	40	94	0.5	0.7
		4月	0	0	0	50	50	86	1.8	2.4
		5月	0	0	0	0	0	41	0.0	0.0
		6月	0	0	0	0	0	44	0.0	0.0
		7月	0	0	0	20	20	68	1.1	3.0
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	8月	0	0	0	0	0	18	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0	0	18	0.0	0.0
		10月	0	0	0	40	40	63	0.9	1.3
	県全体	3月	0	0	0	58	58	90	1.6	2.2
		4月	0	0	2	68	70	88	3.3	4.7
		5月	0	0	0	10	10	38	0.1	0.4
		6月	0	0	0	6	6	42	0.1	0.2
		7月	0	0	4	46	50	61	3.3	6.1
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	8月	0	0	0	8	8	19	0.1	0.4
		9月	0	0	0	0	0	23	0.0	0.0
		10月	0	0	0	38	38	56	1.5	3.6
	県全体	3月	0	0	0	58	58	90	1.6	2.2
		4月	0	0	2	68	70	88	3.3	4.7
		5月	0	0	0	10	10	38	0.1	0.4
		6月	0	0	0	6	6	42	0.1	0.2
		7月	0	0	4	46	50	61	3.3	6.1
チャトゲコナジラミ摘採面	川根	8月	0	0	0	8	8	19	0.1	0.4
		9月	0	0	0	0	0	23	0.0	0.0
		10月	0	0	0	38	38	56	1.5	3.6
	県全体	3月	0	0	0	58	58	90	1.6	2.2
		4月	0	0	2	68	70	88	3.3	4.7
		5月	0	0	0	10	10	38	0.1	0.4
		6月	0	0	0	6	6	42	0.1	0.2
		7月	0	0	4	46	50	61	3.3	6.1

チャ (調査点数: 50点, 栽培面積: 13, 800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
			甚	多	中	少		平均	標準偏差
チャトゲコナジラミ裾部	富士山麓	3月	0	0	10	80	90	7.9	7.7
		4月	0	0	0	100	100	8.3	5.5
		5月	0	0	0	40	40	0.9	1.2
		6月	0	0	0	40	40	1.4	1.9
		7月	0	0	20	70	90	8.6	9.2
	静岡北部市	8月	0	0	0	70	70	3.1	2.7
		9月	0	0	0	50	50	1.3	2.1
		10月	0	0	0	80	80	2.5	2.2
		3月	0	0	20	50	70	8.4	12.0
		4月	0	0	20	80	100	10.5	10.0
チャトゲコナジラミ裾部	牧之原	5月	0	0	0	30	30	0.8	1.5
		6月	0	0	0	20	20	0.4	0.8
		7月	0	0	0	100	100	7.8	6.4
		8月	0	0	0	80	80	3.4	2.8
		9月	0	0	0	50	50	1.7	2.9
	磐小田笠原・	10月	0	0	10	80	90	10.3	15.6
		3月	0	0	0	90	90	5.2	4.7
		4月	0	0	10	80	90	11.1	7.4
		5月	0	0	0	10	10	0.1	0.3
		6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
チャトゲコナジラミ裾部	川根	7月	0	0	0	80	80	3.9	4.1
		8月	0	0	0	60	60	1.3	1.5
		9月	0	0	0	50	50	1.6	2.1
		10月	0	0	0	90	90	4.9	3.8
	県全体	3月	0	0	20	60	80	8.8	10.1
		4月	0	0	20	80	100	12.4	11.4
		5月	0	0	0	40	40	1.2	2.4
		6月	0	0	0	70	70	1.6	1.5
		7月	0	0	0	70	70	4.8	4.4
チャトゲコナジラミ裾部	川根	8月	0	0	0	60	60	2.5	3.0
		9月	0	0	0	40	40	1.4	2.5
		10月	0	0	10	60	70	6.3	10.9
	県全体	3月	0	0	0	90	90	7.5	5.7
		4月	0	0	20	70	90	11.6	8.3
		5月	0	0	0	40	40	0.5	0.7
		6月	0	0	0	40	40	0.9	1.3
		7月	0	0	0	60	60	5.4	5.3
チャトゲコナジラミ裾部	川根	8月	0	0	0	50	50	1.8	2.2
		9月	0	0	0	50	50	1.2	1.4
		10月	0	0	0	80	80	7.0	7.0
	県全体	3月	0	0	10	74	84	7.6	8.6
		4月	0	0	14	82	96	10.8	8.9
		5月	0	0	0	32	32	0.7	1.5
		6月	0	0	0	34	34	0.9	1.4
		7月	0	0	4	76	80	6.1	6.4
		8月	0	0	0	64	64	2.4	2.6
チャトゲコナジラミ裾部	川根	9月	0	0	0	48	48	1.4	2.3
		10月	0	0	6	78	84	6.2	9.6
	県全体	3月	0	0	10	74	84	7.6	8.6
		4月	0	0	14	82	96	10.8	8.9
		5月	0	0	0	32	32	0.7	1.5

チャ (調査点数：50点, 栽培面積：13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	
(カブリンザワハダニ天敵)	県全体	3月					2	3	0.0	0.1
		4月					2	8	0.0	0.1
		5月					24	33	0.5	1.1
		6月					68	56	2.1	3.5
		7月					48	45	1.0	1.4
		8月					34	24	0.7	1.2
		9月					32	26	0.5	1.0
		10月					20	16	0.3	0.6

チャ (調査点数：50点, 栽培面積：13,800ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				平年値	調査項目	発生程度				
			甚	多	中	少			計	平均	標準偏差		
カブリンザワハダニ天敵	山富士麓	3月					0	1	叩き落とし虫数/4か所	0.0	0.0		
		4月					0	8		0.0	0.2		
		5月					40	37		1.1	1.6		
		6月					80	43		2.2	1.7		
		7月					30	34		0.7	1.1		
		8月					40	24		0.8	1.0		
		9月					20	25		0.3	0.6		
		10月					20	12		0.3	0.2		
		静岡北都市	3月							4	叩き落とし虫数/4か所	0.1	0.3
			4月					0		10		0.0	0.0
5月						50	29	1.1	1.3				
6月						50	50	1.3	1.7				
7月						50	55	1.2	1.8				
8月						40	20	1.0	1.8				
9月						30	16	0.9	1.8				
10月						30	17	0.4	0.7				
牧之原	3月							0	叩き落とし虫数/4か所	0.0		0.0	
	4月						0	9		0.0		0.0	
	5月					0	40	0.0		0.0			
	6月					70	72	3.1		6.7			
	7月					20	43	0.2		0.4			
	8月					10	26	0.1		0.3			
	9月					50	32	0.7		0.9			
	10月					10	15	0.2		0.6			
	磐小田笠原	3月						5		叩き落とし虫数/4か所	0.0	0.0	
		4月					10	4			0.1	0.3	
5月						30	42	0.5	0.8				
6月						80	67	2.0	1.5				
7月						60	34	1.3	1.5				
8月						0	20	0.0	0.0				
9月						0	29	0.0	0.0				
10月						10	25	0.1	0.3				
川根		3月						4	叩き落とし虫数/4か所		0.0	0.0	
		4月					0	7			0.0	0.0	
	5月					0	19	0.0		0.0			
	6月					60	49	1.9		2.5			
	7月					80	58	1.6		1.3			
	8月					80	32	1.6		1.2			
	9月					60	26	0.7		0.6			
	10月					30	12	0.3		0.5			

4 果樹

かんきつ (調査点数：30点，栽培面積：5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目	発生程度			
			甚	多	中	少	計		平均	標準偏差	平年値	
黒点病	東部	6月	0	0	0	0	0	5	果実の 発病度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	60	60	5		0.6	0.7	0.3
		8月	0	0	0	67	67	39		1.4	2.0	0.8
		9月	0	0	0	60	60	47		1.4	1.4	0.8
		10月	0	0	0	80	80	52		1.2	1.1	1.0
	中部	6月	0	0	0	0	0	2	果実の 発病度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	30	30	26		0.2	0.4	0.2
		8月	0	0	0	60	60	47		0.7	1.2	1.2
		9月	0	0	0	50	50	56		0.5	0.7	1.4
		10月	0	0	0	100	100	68		2.2	2.3	2.1
西部	6月	0	0	0	0	0	3	果実の 発病度	0.0	0.0	0.0	
	7月	0	0	0	80	80	18		0.9	1.1	0.1	
	8月	0	0	0	90	90	36		2.1	2.2	0.4	
	9月	0	0	0	100	100	37		1.4	1.7	0.5	
	10月	0	0	0	80	80	56		0.7	0.5	1.0	
県全体	6月	0	0	0	0	0	3	果実の 発病度	0.0	0.0	0.0	
	7月	0	0	0	57	57	24		0.6	0.8	0.2	
	8月	0	0	0	72	72	41		1.4	2.0	0.8	
	9月	0	0	0	70	70	56		1.1	1.4	0.9	
	10月	0	0	0	87	87	59		1.3	1.6	1.3	
そうか病	東部	3月	0	0	0	0	0	-	葉の 発病度	0.0	0.0	-
		5月	0	0	0	0	0	-		0.0	0.0	-
		6月	0	0	0	10	10	-		0.1	0.4	-
		6月	0	0	0	10	10	-		0.0	0.1	-
		7月	0	0	0	40	40	-		0.4	1.0	-
	中部	8月	0	0	0	22	22	-	葉の 発病度	0.2	0.6	-
		3月	0	0	0	0	0	-		0.0	0.0	-
		5月	0	0	0	0	0	-		0.0	0.0	-
		6月	0	0	0	10	10	-		0.0	0.1	-
		6月	0	0	0	0	0	-		0.0	0.0	-
西部	7月	0	0	0	0	0	-	果実の 発病度	0.0	0.0	-	
	8月	0	0	0	20	20	-		0.1	0.2	-	
	3月	0	0	0	0	0	-		0.0	0.0	-	
	5月	0	0	0	10	10	-		0.0	0.1	-	
	6月	0	0	0	30	30	-		0.2	0.3	-	
県全体	6月	0	0	0	30	30	-	果実の 発病度	0.4	0.8	-	
	7月	0	0	0	30	30	-		0.5	1.0	-	
	8月	0	0	0	20	20	-		0.3	0.7	-	
	3月	0	0	0	0	0	12		0.0	0.0	0.1	
	5月	0	0	0	3	3	10		0.0	0.0	0.0	
	6月	0	0	0	17	17	19	0.1	0.3	0.1		
	6月	0	0	0	13	13	8	0.1	0.5	0.1		
	7月	0	0	0	23	23	15	0.3	0.8	0.2		
	8月	0	0	0	21	21	17	0.2	0.6	0.3		

かんきつ (調査点数：30点，栽培面積：5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査箇所 (調査面積 : 500a、500a以上 : 2,250a)	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度				
				甚	多	中	少		計	平年値	平均	標準偏差	平年値
かいよう病	東 部	3月	0	0	0	60	60	29	葉の発病度	0.6	0.8	0.2	
		5月	0	0	0	10	10	7		0.0	0.1	0.0	
		6月	0	0	0	0	0	27		0.0	0.0	0.2	
		6月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	
		7月	0	0	0	10	10	5		0.1	0.4	0.0	
		8月	0	0	0	11	11	8	果実の発病度	0.0	0.1	0.0	
		9月	0	0	0	10	10	8		0.1	0.2	0.0	
		10月	0	0	0	0	0	10		0.0	0.0	0.1	
		3月	0	0	0	0	0	4	葉の発病度	0.0	0.0	0.0	
		5月	0	0	0	0	0	10		0.0	0.0	0.0	
	6月	0	0	0	0	0	12		0.0	0.0	0.1		
	6月	0	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.0		
	7月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
	8月	0	0	0	0	0	2	果実の発病度	0.0	0.0	0.0		
	9月	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.0		
	10月	0	0	0	10	10	2		0.0	0.1	0.0		
	3月	0	0	0	0	0	12	葉の発病度	0.0	0.0	0.1		
	5月	0	0	0	0	0	12		0.0	0.0	0.0		
	6月	0	0	0	20	20	11		0.1	0.2	0.1		
	6月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0		
7月	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.0			
8月	0	0	0	0	0	2	果実の発病度	0.0	0.0	0.0			
9月	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0			
10月	0	0	0	0	0	4		0.0	0.0	0.0			
3月	0	0	0	21	21	15	葉の発病度	0.2	0.6	0.1			
5月	0	0	0	3	3	10		0.0	0.0	0.0			
6月	0	0	0	7	7	17		0.0	0.1	0.2			
6月	0	0	0	0	0	1		0.0	0.0	0.0			
7月	0	0	0	3	3	3		0.0	0.3	0.0			
8月	0	0	0	3	3	4	果実の発病度	0.0	0.0	0.0			
9月	0	0	0	3	3	4		0.0	0.1	0.0			
10月	0	0	0	3	3	5		0.0	0.0	0.0			
10月	—	—	0	0	0	—	発病果数／樹	0.0	0.0	—			
11月	—	—	0	33	33	—		0.3	0.5	—			
10月	—	—	0	0	0	—	発病果数／樹	0.0	0.0	—			
11月	—	—	0	10	10	—		0.3	0.9	—			
10月	—	—	0	0	0	—	発病果数／樹	0.0	0.0	—			
11月	—	—	0	10	10	—		0.1	0.3	—			
10月	—	—	0	0	0	13	発病果数／樹	0.0	0.0	0.3			
11月	—	—	0	17	17	37		0.2	0.6	0.8			

かんきつ (調査点数：30点，栽培面積：5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)					調査項目		発生程度		
			甚	多	中	少	計	平年値	平均	標準偏差	平年値	
ミカンハダニ	東 部	3月	0	0	0	0	0	30	寄生葉率 (%)	0.0	0.0	1.4
		4月	0	0	0	20	20	24		1.3	3.3	2.5
		5月	0	0	0	40	40	19		0.9	1.5	0.8
		6月	0	0	0	0	0	27		0.0	0.0	1.8
		7月	0	0	0	40	40	26		3.8	6.3	3.5
	8月	0	0	22	67	89	28	18.2	19.1	2.9		
	9月	0	0	0	0	0	16	0.0	0.0	0.7		
	10月	0	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.8		
	11月	0	0	0	11	11	8	1.4	4.1	1.3		
	中 部	3月	0	0	11	78	89	53	寄生葉率 (%)	15.1	11.3	4.2
		4月	10	10	20	50	90	51		38.4	27.0	6.6
5月		0	10	0	60	70	40	10.7		17.6	4.5	
6月		0	0	10	10	20	52	3.3		9.6	11.5	
7月		10	0	20	30	60	48	18.9		31.6	8.3	
8月	0	10	10	40	60	53	15.5	25.4	7.9			
9月	0	0	0	0	0	41	0.0	0.0	5.5			
10月	0	0	0	20	20	37	1.6	4.2	2.8			
11月	0	0	0	10	10	38	1.9	5.7	3.0			
西部		3月	0	0	10	30	40	38	寄生葉率 (%)	9.1	15.5	1.5
		4月	0	10	0	40	50	49		9.6	17.8	3.9
		5月	0	0	10	40	50	20		5.9	9.8	1.0
		6月	0	10	0	40	50	60		10.2	23.4	7.1
		7月	0	0	0	60	60	61		4.0	5.2	13.6
	8月	0	0	10	40	50	39	7.1	17.4	3.9		
	9月	0	0	0	40	40	33	2.2	4.7	1.9		
	10月	0	0	0	30	30	31	1.5	2.5	1.9		
	11月	0	0	0	40	40	42	4.6	6.6	2.9		
	県全体	3月	0	0	7	34	41	40	寄生葉率 (%)	7.8	12.7	2.4
		4月	3	7	7	37	53	40		16.4	24.6	4.5
5月		0	3	3	47	53	25	5.8		12.4	2.4	
6月		0	3	3	17	23	45	4.5		15.2	6.2	
7月		3	0	7	43	53	44	8.9		20.1	8.8	
8月		0	3	14	48	66	38	13.4		21.5	4.6	
9月	0	0	0	13	13	29	0.7	2.9	2.5			
10月	0	0	0	17	17	23	1.0	2.9	1.6			
11月	0	0	0	21	21	26	2.7	5.8	2.1			

かんきつ (調査点数: 30点, 栽培面積: 5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値
チャノキイロアザミウマ	東 部	6月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.2
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		6月	0	0	0	0	果梗部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.5
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.2
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.3
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.0
	中 部	6月	0	0	0	0	果頂部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.3
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.2
		6月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.2
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	10		0.1	0.2	0.1
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
チャノキイロアザミウマ	中 部	6月	0	0	0	0	果梗部被害度	0.0	0.0	0.1
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.3
		9月	0	0	0	10		0.1	0.2	1.9
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.9
		6月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.1	0.1
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.3
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.9
	西 部	6月	0	0	0	0	果頂部被害度	0.0	0.0	0.5
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.2
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		6月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.6
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.6
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.2
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.0

かんきつ (調査点数: 30点, 栽培面積: 5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度		
			甚	多	中	少		平均	標準偏差	平年値
チャノキイロアザミウマ	県 全 体	6月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.3
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		9月	0	0	0	3		0.0	0.1	0.1
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.1
		6月	0	0	0	0	果梗部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.7
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	1.3
		9月	0	0	0	3		0.0	0.1	1.5
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.9
	東 部	6月	0	0	0	3	果頂部被害度	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	3		0.0	0.0	0.1
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.3
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.9
		3月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
ナシマルカイガラムシ	中 部	3月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
	西 部	3月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	—
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	—
	県 全 体	3月	0	0	0	0	寄生果率 (%)	0.0	0.0	0.0
		7月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		8月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		9月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0
		10月	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0

かんきつ (調査点数：30点，栽培面積：5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				発生程度		
			甚	多	中	少	計	平年値	調査項目
ルビローラムシ	東 部	3月	0	0	0	30	30	—	寄生枝率 (%)
		7月	0	0	0	0	0	—	
		8月	0	0	0	11	11	—	
		9月	0	0	0	0	0	—	
	中 部	10月	0	0	0	10	10	—	
		3月	0	0	0	30	30	—	寄生枝率 (%)
		7月	0	0	0	0	0	—	
		8月	0	0	0	0	0	—	
	西 部	9月	0	0	0	0	0	—	
		10月	0	0	0	10	10	—	
ツノロウムシ	県全体	3月	0	0	0	30	30	13	寄生枝率 (%)
		7月	0	0	0	0	0	3	
		8月	0	0	0	3	3	5	
		9月	0	0	0	0	0	8	
	東 部	10月	0	0	0	10	10	10	
		3月	0	0	0	10	10	—	寄生枝率 (%)
		7月	0	0	0	0	0	—	
		8月	0	0	0	0	0	—	
	中 部	9月	0	0	0	0	0	—	寄生枝率 (%)
		10月	0	0	0	0	0	—	
かんきつ (調査点数：30点，栽培面積：5,290ha)	西 部	3月	0	0	0	0	0	—	寄生枝率 (%)
		7月	0	0	0	0	0	—	
		8月	0	0	0	0	0	—	
		9月	0	0	0	0	0	—	
	県全体	10月	0	0	0	0	0	—	寄生枝率 (%)
		3月	0	0	0	3	3	3	
		7月	0	0	0	0	0	1	
		8月	0	0	0	0	0	3	
	東 部	9月	0	0	0	0	0	5	
		10月	0	0	0	0	0	7	

かんきつ (調査点数：30点，栽培面積：5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	程度別発生面積率 (%)				発生程度		
			甚	多	中	少	計	平年値	調査項目
イセリヤカイガラムシ	東 部	3月	0	0	0	30	30	—	寄生枝率 (%)
		5月	0	0	0	0	0	—	
		6月	0	0	0	0	0	—	
		7月	0	0	0	0	0	—	
	中 部	8月	0	0	0	0	0	—	寄生枝率 (%)
		9月	0	0	0	0	0	—	
		10月	0	0	0	0	0	—	
	西 部	3月	0	0	0	10	10	—	寄生枝率 (%)
		5月	0	0	0	0	0	—	
		6月	0	0	0	0	0	—	
		7月	0	0	0	0	0	—	
かんきつ (調査点数：30点，栽培面積：5,290ha)	県全体	8月	0	0	0	0	0	—	寄生枝率 (%)
		9月	0	0	0	0	0	—	
		10月	0	0	0	0	0	—	
	東 部	3月	0	0	0	14	14	6	寄生枝率 (%)
		5月	0	0	0	0	0	1	
		6月	0	0	0	0	0	3	
		7月	0	0	0	0	0	2	
	中 部	8月	0	0	0	0	0	8	寄生枝率 (%)
		9月	0	0	0	0	0	9	
		10月	0	0	0	0	0	5	

かんきつ (調査点数：30点, 栽培面積：5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)			発生程度		
				甚	多	中	少	計	平均
カメムシ類	東 部	5月	叩き落	—	—	0	0	0	0.0
		6月	とし虫	—	—	0	0	0	0.0
		7月	数／5	—	—	0	0	0	0.0
		8月	枝	—	—	0	0	0	0.0
		9月		—	—	0	0	0	0.0
	中 部	10月		—	—	0	70	70	1.2
		5月	叩き落	—	—	0	0	0	0.0
		6月	とし虫	—	—	0	0	0	0.0
		7月	数／5	—	—	0	0	0	0.0
		8月	枝	—	—	0	0	0	0.0
アブラムシ類	西 部	9月		—	—	0	0	0	0.0
		10月		—	—	0	10	10	0.2
		5月	叩き落	—	—	0	0	0	0.0
		6月	とし虫	—	—	0	0	0	0.0
		7月	数／5	—	—	0	0	0	0.0
	県全体	8月	枝	—	—	0	0	0	0.0
		9月		—	—	0	0	0	0.0
		10月		—	—	0	40	40	1.1
		5月	叩き落	—	—	0	0	0	0.0
		6月	とし虫	—	—	0	0	0	0.0

かんきつ (調査点数：30点, 栽培面積：5,290ha)

病害虫名	調査地域	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)			発生程度		
				甚	多	中	少	計	平均
アブラムシ類	東 部	4月	寄生	0	0	0	0	0	0.0
		5月	新梢率	0	0	0	0	0	0.0
		6月	(%)	0	0	0	20	20	0.4
		7月		0	0	10	10	3	0.1
		8月		0	0	0	22	22	0.3
	中 部	9月		0	0	0	20	20	0.6
		4月	寄生	0	0	0	30	30	0.5
		5月	新梢率	0	0	0	0	0	0.0
		6月	(%)	0	0	0	0	0	0.0
		7月		0	0	0	0	0	0.0
アブラムシ類	西 部	8月		0	0	0	10	10	0.1
		9月		0	0	20	10	30	1.4
		4月	寄生	0	0	0	20	20	0.3
		5月	新梢率	0	0	0	10	10	0.1
		6月	(%)	0	0	0	40	40	0.5
	県全体	7月		0	0	0	0	0	0.0
		8月		0	0	0	10	10	0.2
		9月		0	0	0	0	0	0.0
		4月	寄生	0	0	0	17	17	0.3
		5月	新梢率	0	0	0	3	3	0.0

中晩柑 (調査点数：10点, 栽培面積：451ha)

病害虫名	調査時期	調査項目	程度別発生面積率 (%)			発生程度		
			甚	多	中	少	計	平均
かいよう病	3月	葉の発	0	0	0	40	40	1.9
	4月	病度	0	0	0	0	0	0.0
	5月		0	0	0	0	0	0.0
	6月		0	0	0	50	50	0.4
	10月		0	0	0	10	10	0.2
	3月	果実の	0	0	0	20	20	0.1
	4月	発病度	0	0	0	30	30	0.3
	5月		0	0	0	67	67	1.0
	6月		0	0	0	44	44	1.5
	10月		0	0	0	40	40	0.3

中晩柑の栽培面積は、なつみかん、はっさく、いよかん、ネーブルの合計値

なし (調査点数：10点, 栽培面積：116 ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
赤星病	5月	0	0	0	20	10	0.2	0.4
	5月	0	0	0	0	4	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	5	0.0	0.0
黒星病	5月	0	0	0	10	7	0.1	0.3
	7月	0	0	0	0	6	0.0	0.0
アブラムシ類	5月	0	0	10	0	10	1.1	3.3
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
カメムシ類	5月	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	5月	0	0	0	0	1	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
ツタムシ類	7月	0	0	0	0	2	0.0	0.0
	5月	0	0	0	0	2	0.0	0.0
ハダニ類	7月	0	0	0	0	30	0.0	0.0
	5月	0	0	0	0	3	0.0	0.0
ハダニ類	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0

かき (調査点数：10点, 栽培面積：382ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
炭疽病	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	9月	10	10	40	30	90	23.4	27.2
	5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
うどんこ病	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
カメムシ類	5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	10	10	0.1	0.3
	9月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
カキハダムシ類	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	9月	0	0	0	30	30	0.4	0.7
カキハダムシ類	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
チャノキイロアザミヤカ	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
カキハダムシ類	5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
チャノキイロアザミヤカ	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	8月	0	0	0	10	10	0.1	0.3
カキハダムシ類	5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
チャノキイロアザミヤカ	5月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	6月	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	7月	0	0	0	0	0	0.0	0.0

キウイフルーツ (調査点数：10点, 栽培面積：101ha)

病害虫名	調査時期	程度別発生面積率 (%)				調査項目	発生程度	
		甚	多	中	少	計	平均	標準偏差
かいよう病	4月	0	0	20	20	40	2.4	4.5
	5月	10	0	30	30	70	11.5	23.3
	6月	10	0	30	30	70	12.4	26.2