

イ 一発処理剤（ジャンボ剤）

除草剤名	成分数	普通期			早期			使用時期	無人航空機散布	適用雑草													表層はく離	SU抵抗性ホタルイ	薬害症状	注意事項
		挿土	挿土	砂挿土	挿土	挿土	砂挿土			1年生雑草																
										多年生雑草																
アールタイプジャンボ	3							移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		ノビエ	広葉雑草	マツバユイ	ホタルイ	ウリカワ	シロカササギ	オモダカ	ハナカササギ	クログワイ	セリ	ヒルムシロ	コキチカサ	シスイ		○	生育抑制、退色、白化	
シュナイデンジャンボ	3							移植後3日～ノビエ3葉期 但し、収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	分げつ抑制、生育抑制、葉身細化	
アカツキ豆つづ250	3							移植後3日～ノビエ3葉期 但し、収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	分げつ抑制、生育抑制、葉身細化	
アカツキジャンボ	3							移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、白化、葉身細化	
アクシズMXジャンボ	3							移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、白化、葉身細化	
アクシズMXエア一粒剤	3							移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	生育抑制、白化、葉身細化	
アシュラジャンボ	3							移植直後～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
アシュラ400FG	3							移植直後～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
アップレZジャンボ	3							移植後3日～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
アピログロウMXジャンボ	4							移植後3日～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
イネキングジャンボ	3							移植後1日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
エンペラージャンボ	3							移植直後～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	
エンペラー豆つづ250	3							移植直後～ノビエ3葉期 但し収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制	水口処理は田面露出のない状態で行う
カイリキZジャンボ	3							移植後3日～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化	
カウシルコンプリートジャンボ ポデーガードプロジャンボ	2							移植後5日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	ホバ・ヒメミソギの発生が多いほ場では使用しない。キョウカスノノビエに効果あり
カウントダウンジャンボ カウシルエナジージャンボ	3							移植直後～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	発芽・生育抑制	
カクシン楽粒	3							移植直後～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化	
カチドキZ楽粒	2							移植後3日～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉身細化、分げつ抑制、ロール葉	
カチボシLジャンボ	3							移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
カラットジャンボ	3							移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
カラット400FG	3							移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	
ガンガンジャンボ	2							移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
キマリテジャンボ	2							移植直後～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
銀河ジャンボ	3							移植後5日～ノビエ3葉期 但し収穫60日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
クサウェボンジャンボ ジャスタジャンボ	3							移植後1日～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化	
クサトリーBSXジャンボL	3							移植後1日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
コメットジャンボ	3							移植後5日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
サキガケ楽粒	3							移植直後～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化、ロール葉	ナガエウレノゲイリに効果有り
サスケーラジカルジャンボ	4							移植後3日～ノビエ2葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
忍ジャンボ	3							移植直後～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制	
ジャンダルムMXジャンボ	3							移植後3日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化	
ジャンダルムMX豆つづ250	3							移植後3日～ノビエ3.5葉期 但し移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化	
ジェイソウルジャンボ	3							移植後1日～ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	生育抑制、白化	
ジェイフレンドジャンボ	3							移植後5日～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	葉鞘褐変、生育抑制、白化	

