

＜麦類＞ 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ラウンドアップマックスロード	H:9	収穫前日まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
ゴーゴーサン細粒剤F	H:3	は種後出芽前(雑草発生前)	1回	全面土壌散布

＜麦類＞ 一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
トレファノサイド粒剤2.5	H:3	は種後出芽前～3葉期(雑草発生前～雑草発始期)	2回以内	雑草茎葉散布又は全面土壌散布
トレファノサイド粒剤2.5	H:3	生育期雑草発生前(但し、収穫45日前まで)	2回以内	全面土壌散布

＜麦類＞ 一年生広葉雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
アクチノールB乳剤	H:6	穂ばらみ期まで(雑草生育初期)	2回以内	雑草茎葉散布又は全面散布

＜麦類＞ 一年生雑草及び多年生イネ科雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ラウンドアップマックスロード	H:9	は種後出芽前(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
ラウンドアップマックスロード	H:9	耕起前又はは種前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布

＜麦類(小麦を除く)＞ 一年生雑草

1. 覆土は2～3cmとし均一に散布する。
 2. 雑草発生前、又は作物の発芽前に散布する。
 3. 砂土では使用しない。
 4. 重複散布をすると薬害が出やすいため、まきムラのないように均一に散布する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ゴーゴーサン乳剤	H:3	は種後出芽前(雑草発生前)	1回	全面土壌散布

＜麦類(小麦を除く)＞ 一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)

1. 覆土は2～3cmとし均一に散布する。
 2. 雑草発生前、又は作物の発芽前に散布する。
 3. 砂土では使用しない。
 4. 重複散布をすると薬害が出やすいため、まきムラのないように均一に散布する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
トレファノサイド乳剤	H:3	は種後出芽前～生育期(雑草発生前～雑草発始期)但し、収穫45日前まで	2回以内	雑草茎葉散布又は全面土壌散布

＜麦類(大麦、小麦(秋播)を除く)＞ 一年生雑草

1. 使用時期が「収穫7日前まで(雑草生育期)」は、適用場所が圃場内の周縁部となっているため、適用を順守する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
タッチダウンiQ	H:9	耕起又はは種前(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
タッチダウンiQ	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布

＜小麦＞ 一年生雑草

1. 覆土は2～3cmとし均一に散布する。
 2. 雑草発生前、又は作物の発芽前に散布する。
 3. 砂土では使用しない。
 4. 重複散布をすると薬害が出やすいため、まきムラのないように均一に散布する。
 5. 展着剤を加用して雑草に均一に散布する。
 6. 原液が直接皮膚に触れたり目に飛散しないように十分注意する。
 7. 麦類の一年生雑草の項も参照する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
バスタ液剤	H:10	は種後出芽前(雑草生育期)	1回	雑草茎葉散布
バスタ液剤	H:10	収穫7日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
バスタ液剤	H:10	耕起前・は種前(雑草生育期)	1回	雑草茎葉散布
ゴーゴーサン乳剤	H:3	は種後(雑草発生前)～小麦2葉期(イネ科雑草1葉期まで)	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布
ボクサー	H:15	秋播栽培の麦2～4葉期(雑草発生前～発始期)	2回以内	雑草茎葉散布又は全面土壌散布
リベレーターフロアブル	H:12・H:15	は種後～麦3葉期(雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで)	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布

クリアターン乳剤	H:3・H:5・H:15	は種直後(雑草発生前)	1回	全面土壌散布
----------	--------------	-------------	----	--------

＜小麦＞ 一年生雑草(ツクサ科、カヤツクサ科、キク科、アブラナ科を除く)

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
トレファノサイド乳剤	H:3	は種後出芽前～生育期(雑草発生前～雑草発始期)但し、収穫45日前まで	2回以内	雑草茎葉散布又は全面土壌散布

＜小麦＞ 一年生雑草(ツクサ科、カヤツクサ科、キク科を除く)

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
シナジオ乳剤	H:3・H:23	は種後出芽前(雑草発生前)	1回	全面土壌散布

＜小麦＞ 一年生雑草(イネ科を除く)

1. 砂質土では薬害がやすい。
2. 降雨前後に使用すると薬害が生じやすいので、降雨直前や露のある時は散布を避ける。
3. 広葉の農作物の茎葉に散布液が飛散しないように注意する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
バサグラン液剤(ナトリウム塩)	H:6	生育期(但し、収穫45日前まで)	1回	雑草茎葉散布又は全面散布

＜小麦(秋播)＞ 一年生雑草

1. 覆土は2～3cmとし均一に散布する。
2. 雑草発生前、又は作物の発芽前に散布する。
3. 砂土では使用しない。ガリルは砂壤土でも使用しない。
4. 重複散布をすると薬害が出やすいので、まきムラのないように均一に散布する。
5. ガリル水和剤は小麦2葉期までに散布すると薬害を生ずる場合があるので、散布時期を厳守する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
タッチダウンiQ	H:9	は種後出芽前(雑草生育期)	1回	雑草茎葉散布
タッチダウンiQ	H:9	耕起又はは種前(雑草生育期)	1回	雑草茎葉散布
ガリル水和剤	H:12・H:23	小麦2～3葉期	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布
ダイロン	H:5	は種直後	1回	全面土壌散布

＜小麦(秋播)＞ 多年生イネ科雑草

1. 覆土は2～3cmとし均一に散布する。
2. 雑草発生前、又は作物の発芽前に散布する。
3. 砂土では使用しない。
4. 重複散布をすると薬害が出やすいので、まきムラのないように均一に散布する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
タッチダウンiQ	H:9	耕起3日以前(雑草生育期)	1回	雑草茎葉散布

＜小麦(秋播栽培)＞ 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
リベレーターG	H:12・H:15	は種後～麦2葉期(雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで)	1回	全面土壌散布

＜大麦＞ 一年生雑草

1. 使用時期が「収穫7日前まで(雑草生育期)」は、適用場所が圃場内の周縁部となっているため、適用を順守する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
タッチダウンiQ	H:9	は種後出芽前(雑草生育期)	1回	雑草茎葉散布
タッチダウンiQ	H:9	耕起又はは種前(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
タッチダウンiQ	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布

＜大麦＞ 一年生雑草(ツクサ科、カヤツクサ科、キク科を除く)

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
シナジオ乳剤	H:3・H:23	は種後出芽前(雑草発生前)	1回	全面土壌散布

＜大麦(秋播栽培)＞ 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
リベレーターフロアブル	H:12・H:15	は種後～麦3葉期(雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで)	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布
リベレーターG	H:12・H:15	は種後～麦2葉期(雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで)	1回	全面土壌散布