

〈かんきつ〉 一年生雑草

1. タッチダウンiQは、各種の雑草に対して効果が高いが遅効性である。薬剤の接触害が強いため散布に当たっては果樹や周辺の作物に飛散しないように十分注意する。少量散布の場合は専用ノズルを使用する。雑草が大きくなり過ぎる（30cm以上）と効果が劣るので時期を逸しないようにする。
2. バスタ液剤は土壌処理効果がないので、春先には雑草が生えそろうってから散布する。雑草が大きくなり過ぎる（30cm以上）と効果が劣るので時期を逸しないようにする。植物体に対する接触害が出るので散布には注意する。
3. ダイロンゾルは、樹の根が分布している所に散布しない。散布薬剤の飛散、流出に十分注意する。
4. ダイロンゾルは、以下の条件で薬害が生じる危険性があるため、十分注意する。ア) 砂質で水はけの良い土壌、イ) 雨の多い時期
5. ラウンドアップマックスロードは、各種の雑草に対して効果が高いが遅効性である。薬剤の接触害が強いため散布に当たっては果樹や周辺の作物に飛散しないように十分注意する。少量散布の場合は専用ノズルを使用する。雑草が大きくなり過ぎる（30cm以上）と効果が劣るので時期を逸しないようにする。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
カルナクス	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下)	3回以内	雑草茎葉散布
ザクサ液剤	H:10	収穫21日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
タッチダウンiQ	H:9	収穫5日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
バスタ液剤	H:10	収穫21日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
ラウンドアップマックスロード	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期)	5回以内	雑草茎葉散布
草枯らし	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
ダイロンゾル	H:5	雑草発生前～雑草生育期(但し、収穫60日前まで)	1回	雑草茎葉散布又は土壌散布
ゾーパー	H:5	雑草発生前(但し、収穫60日前まで)	1回	全面土壌散布
ゾーパー	H:5	雑草発生前(但し、収穫60日前まで)	1回	雑草茎葉散布

〈かんきつ〉 マルハツユクサ

1. ラウンドアップマックスロードの使用上の注意事項はかんきつの一年生雑草の項を参照。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ラウンドアップマックスロード	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期)	5回以内	雑草茎葉散布

〈かんきつ〉 多年生雑草

1. タッチダウンiQ、バスタ液剤の使用上の注意事項は、かんきつの一年生雑草の項を参照。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
カルナクス	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下)	3回以内	雑草茎葉散布
ザクサ液剤	H:10	収穫21日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
タッチダウンiQ	H:9	収穫5日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
バスタ液剤	H:10	収穫21日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
ラウンドアップマックスロード	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期)	5回以内	雑草茎葉散布
草枯らし	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布

〈かんきつ〉 スギナ

1. タッチダウンiQ、ラウンドアップマックスロードの使用上の注意事項はかんきつの一年生雑草の項を参照。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
タッチダウンiQ	H:9	収穫5日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
ラウンドアップマックスロード	H:9	収穫7日前まで(雑草生育期)	5回以内	雑草茎葉散布

〈かんきつ〉 一年生及び多年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
サンダーボルト007	H:9・H:14	収穫7日前まで(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布