

〈いちご〉 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ザクサ液剤	H:10	収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	3回以内	雑草茎葉散布
バスタ液剤	H:10	収穫前日まで(雑草生育期:耕起前・定植前又は畦間処理)	3回以内	雑草茎葉散布
キルパー	I:8F	は種又は定植の15日前まで	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
ガスタード微粒剤	I:8F	仮植又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
バスアミド微粒剤	I:8F	仮植又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
ソイリーン	I:8A・I:8B	作付の10～15日前まで	1回	耕起整地後、30cm間隔のホリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。
キルパー	I:8F	は種又は定植の15日前まで	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆または覆土・鎮圧する。

〈いちご(施設栽培)〉 一年生雑草

1. 雑草発生前に均一に散布する。
2. イチゴに直接散布液がかからないようにする。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ラッソー乳剤	H:15	植付後又は定植後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)	2回以内	全面土壌散布又は株間土壌散布

〈いちご(子苗床)〉 一年生雑草

1. 雑草発生前に均一に散布する。
2. イチゴに直接散布液がかからないようにする。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ラッソー乳剤	H:15	植付後又は定植後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)	2回以内	全面土壌散布又は株間土壌散布

〈いちご(本圃)〉 一年生雑草

1. 雑草発生前に均一に散布する。
2. イチゴに直接散布液がかからないようにする。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ラッソー乳剤	H:15	植付後又は定植後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)	2回以内	全面土壌散布又は株間土壌散布

〈いちご(親株床)〉 一年生雑草

1. 雑草発生前に均一に散布する。
2. イチゴに直接散布液がかからないようにする。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ラッソー乳剤	H:15	植付後又は定植後(雑草発生前)(但し、収穫60日前まで)	2回以内	全面土壌散布又は株間土壌散布