

〈たまねぎ〉 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
タッチダウンIQ	H:9	耕起7日以前(雑草生育期)	3回以内	雑草茎葉散布
バスタ液剤	H:10	収穫前日まで(雑草生育期:耕起前・定植前又は畦間処理)	2回以内	雑草茎葉散布
グラメックス水和剤	H:5	定植活着後(雑草発生前)(但し、収穫30日前まで)	1回	全面土壌散布
モーティブ乳剤	H:3・H:15	定植後(雑草発生前)(但し、定植45日後まで)	1回	全面土壌散布
キルパー	I:8F	は種又は定植の10日前まで	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
ガスタード微粒剤	I:8F	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
ガスタード微粒剤	I:8F	秋期(翌春は種)	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
バスアミド微粒剤	I:8F	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
バスアミド微粒剤	I:8F	秋期(翌春は種)	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する

〈たまねぎ〉 一年生雑草(イネ科を除く)

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
バサグラン液剤(ナトリウム塩)	H:6	秋播栽培の移植後生葉4葉期まで(但し、収穫30日前まで)	1回	雑草茎葉散布又は全面散布

〈たまねぎ〉 一年生イネ科雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
セレクト乳剤	H:1	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)(但し、収穫21日前まで)	3回以内	雑草茎葉散布又は全面散布

〈たまねぎ〉 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)

1. イネ科以外の雑草が多発する畑地では他剤と組み合わせて使用する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ナブ乳剤	H:1	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)(但し、収穫14日前まで)	2回以内	雑草茎葉散布又は全面散布
ポルトフロアブル	H:1	雑草生育期(イネ科雑草3～8葉期)(但し、収穫30日前まで)	2回以内	雑草茎葉散布又は全面散布

〈たまねぎ(秋播栽培)〉 一年生雑草

1. ゴーゴーサン細粒剤Fは砂土では使用しない。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ゴーゴーサン細粒剤F	H:3	定植後又は生育期(雑草発生前)(但し、収穫30日前まで)	1回	全面土壌散布

〈たまねぎ(本畑)〉 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
トレファノサイド乳剤	H:3	定植後(但し、収穫75日前まで)	2回以内	全面土壌散布

〈たまねぎ(移植栽培)〉 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ゴーゴーサン乳剤	H:3	定植前(雑草発生前)	1回	全面土壌散布

〈たまねぎ(移植栽培)〉 一年生広葉雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
アクチノールB乳剤	H:6	秋播栽培の早春期(但し、収穫30日前まで)(雑草生育初期)	2回以内	雑草茎葉散布又は全面散布