

<トマト> 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
サンダーボルト007	H:9・H:14	耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期)	1回	雑草茎葉散布
キルパー	I:8F	は種又は定植の15日前まで	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
ガスタード微粒剤	I:8F	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
バスアミド微粒剤	I:8F	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
ソイリーン	I:8A・I:8B	作付の10～15日前まで	1回	耕起整地後、30cm間隔のフタリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。
キルパー	I:8F	は種又は定植の15日前まで	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆または覆土・鎮圧する。

<ミニトマト> 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
キルパー	I:8F	は種又は定植の15日前まで	1回	所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。
ガスタード微粒剤	I:8F	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
バスアミド微粒剤	I:8F	は種又は定植21日前まで	1回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する
ソイリーン	I:8A・I:8B	作付の10～15日前まで	1回	耕起整地後、30cm間隔のフタリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。