

<かんしよ> 一年生雑草

1. ラウンドアップマックスロードを畦間処理する場合は、散布時に飛散防止ノズルを使用する。

| 商品名 | RACコード | 時期 | 回数 | 使用方法 |
|----------------|-----------|-------------------------------|------|--|
| サンダーボルト007 | H:9・H:14 | 耕起又は挿苗7日前まで (雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 |
| タッチダウンiQ | H:9 | 耕起7日以前(雑草生育期) | 1回 | 雑草茎葉散布 |
| バスタ液剤 | H:10 | 収穫14日前まで(雑草生育期:耕起前・挿苗前又は畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 |
| ラウンドアップマックスロード | H:9 | 収穫60日前まで(雑草生育期:畦間処理) | 2回以内 | 雑草茎葉散布 |
| デュアルゴールド | H:15 | 挿苗後(但し、収穫90日前まで)(雑草発生前) | 1回 | 全面土壌散布 |
| ゴーゴーサン乳剤 | H:3 | 挿苗10日後まで(雑草発生前) | 1回 | 畦間土壌散布 |
| ソイリーン | I:8A・I:8B | 作付の10～15日前まで | 1回 | 耕起整地後、30cm間隔のトリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| キルパー | I:8F | は種又は定植の15日前まで | 1回 | 所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆または覆土・鎮圧する。 |

<かんしよ> 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)

1. トレファノサイド粒剤2.5、トレファノサイド乳剤はナズナ、タネツケバナ、ツユクサ、カヤツリグサ、ノボロギクには効果が劣る。

| 商品名 | RACコード | 時期 | 回数 | 使用方法 |
|---------------|--------|-----------------------|------|----------------|
| トレファノサイド乳剤 | H:3 | 挿苗前雑草発生前 | 1回 | 全面土壌散布 |
| トレファノサイド粒剤2.5 | H:3 | 挿苗前雑草発生前 | 1回 | 全面土壌散布 |
| トレファノサイド乳剤 | H:3 | 挿苗後雑草発生前(但し、収穫60日前まで) | 2回以内 | 全面土壌散布又は畦間土壌散布 |
| トレファノサイド粒剤2.5 | H:3 | 挿苗後雑草発生前(但し、収穫60日前まで) | 2回以内 | 全面土壌散布又は畦間土壌散布 |