

<トマト> 育苗期の伸長抑制

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
スミセブンP液剤		定植前子葉展開期～本葉2葉期	1回	茎葉散布

<トマト> 空どう果防止

1. ジベレリン液剤は着果促進剤と混用して使用する。本剤は着果促進剤を散布した後の使用では効果が若干劣る。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ジベレリン液剤		開花時	1花房あたり1回	花房散布(トマト落果防止剤と併用)

<トマト> 着果促進、果実の肥大促進、熟期の促進

1. トマトトーンは、3～5花が開花した頃(開花盛期)に、1花房当たり約1リットルを午後の温度下降時に散布する。ただし同一花房への2度散布や蕾への散布はしない。処理濃度が時期により異なるため注意する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
トマトトーン		開花前3日～開花後3日位(1花房で3～5花位開花した時期)	1花房あたり1回	散布
トマトトーン		開花前3日～開花後3日位(1花房で3～5花位開花した時期)	1花房あたり1回	散布

<トマト(生食用)> 熟期促進

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
エスレル10		各果房毎の白熟期	1果房につき1回	果房散布

<ミニトマト> 熟期促進

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
エスレル10		各果房毎の白熟期	1果房につき1回	果房散布

<ミニトマト> 着果促進、果実の肥大促進、熟期の促進

1. トマトトーンは、午後の温度下降時に散布する。ただし同一花房への2度散布や蕾への散布はしない。処理濃度が時期により異なるため注意する。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
トマトトーン		開花前3日～開花後3日位	1花につき1回	散布
トマトトーン		開花前3日～開花後3日位	1花につき1回	散布