

クビアカツヤカミキリにご注意ください！

クビアカツヤカミキリは、主にバラ科の樹木（サクラ・モモ・ウメなど）に被害を及ぼす外来の害虫です。静岡県内では未確認（令和8年9月時点）ですが、今後の侵入が懸念され、繁殖力が強く、分布の拡散が早いいため、早期発見・防除が重要です。

クビアカツヤカミキリとは？

- 体長：約 30～40mm の大きなカミキリムシ。
- 背中に赤い帯があるのが特徴。
- 幼虫が幹や枝の内部を食害し木の枯死や生育不良を引き起こします。



オス

メス

（提供：環境省）

注意すべき被害のサイン

- 木の幹や枝に丸い穴が開いている。
- 木くず（フラス）が地面や幹の根元にたまっている。（5月～9月頃）
- 葉や枝が急に枯れる。

拡散を防ぐために、発見情報が非常に重要になります。

サインを発見したらすぐにご連絡ください！

発見情報提供のお願い

クビアカツヤカミキリや被害のサインを見かけたら、以下の情報を添えて県の担当窓口までお知らせください。生きたままの個体の移動は法律で禁止されています。可能であれば、その場での殺虫（踏み潰しや殺虫剤による）にご協力ください。

- 発見場所（できるだけ詳しく・可能であれば地図情報の提供等）
- 発見日時
- 発見個体や木くず（フラス）の写真や動画（可能な場合）
- 個体の特徴やフラスの状況（大きさ、色など）



クビアカツヤカミキリのフラス

（提供：埼玉県環境科学国際センター）

問い合わせ・発見情報連絡先

静岡県くらし・環境部 自然保護課

電話：054-221-3332

メール：shizenhogo@pref.shizuoka.lg.jp

関連ホームページ

【基本情報】

- クビアカツヤカミキリに関する情報（農林水産省HP）

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/kubiaka/kubiaka.html

- クビアカツヤカミキリの関連情報のリンク集（環境省HP）

https://www.env.go.jp/nature/gairai/info_kubiaka.html

【確認方法・防除対策等】

- クビアカツヤカミキリの防除法（国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所）

<https://www.ffpri.go.jp/pubs/chukiseika/5th-chuukiseika12.html>

- クビアカツヤカミキリ対策のポイント-分布拡大をどう防ぐか（国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所）

https://www.ffpri.go.jp/research/2forest/09for-entom/documents/shinrinken_report_p6_03013.pdf

- 日本の果樹と樹木を守る外来カミキリムシ総合対策マニュアル（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/175662.html